



TRIGONOMETRY

TOMO VIII

3rd
SECONDARY

Feedback



 **SACO OLIVEROS**



1) Calcule $\text{sen}75^\circ$

Recordar

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}\alpha \cos\beta + \cos\alpha \text{sen}\beta$$

Resolución:

$$\text{sen}(45^\circ + 30^\circ) = \text{sen}45^\circ \cos30^\circ + \cos45^\circ \text{sen}30^\circ$$

$$\text{sen}15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{sen}15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$





HELICO-PRACTICE

2) Determine el valor de:

$$P = \frac{\text{sen}50^\circ \cdot \text{cos}12^\circ - \text{cos}50^\circ \cdot \text{sen}12^\circ}{\text{cos}27^\circ \cdot \text{cos}25^\circ - \text{sen}27^\circ \cdot \text{sen}25^\circ}$$

Recordar

$$\begin{aligned}\text{sen}\alpha \text{cos}\beta - \text{cos}\alpha \text{sen}\beta &= \text{sen}(\alpha - \beta) \\ \text{cos}\alpha \text{cos}\beta - \text{sen}\alpha \text{sen}\beta &= \text{cos}(\alpha + \beta)\end{aligned}$$



Resolución:

$$\Rightarrow P = \frac{\text{sen}(50^\circ - 12^\circ)}{\text{cos}(27^\circ + 25^\circ)} = \frac{\text{sen}38^\circ}{\text{cos}52^\circ} = \frac{\cancel{\text{sen}38^\circ}}{\cancel{\text{sen}38^\circ}}$$

$$\therefore P = 1$$



3) Si $\tan x = \frac{1}{5}$ y $\tan y = 2$; calcule $\tan(x + y)$

Resolución:

$$\tan(x + y) = \frac{\frac{1}{5} + 2}{1 - (\frac{1}{5})(2)}$$

$$\tan(x + y) = \frac{\frac{11}{5}}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{\frac{11}{5}}{\frac{3}{5}} \Bigg]$$

Recordar

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y}$$

$$\therefore \tan(x + y) = \frac{11}{3}$$





HELICO-PRACTICE

4) Calcule M si : $M = 10.\text{sen}18^\circ30'\text{cos}18^\circ30'$

Resolución:

$$M = 5.2\text{sen}18^\circ30'\text{cos}18^\circ30'$$

$$M = 5.\text{sen}2(18^\circ30')$$

$$M = 5.\text{sen}37^\circ$$

$$M = 5\left(\frac{3}{5}\right)$$

$$\therefore M = 3$$

Recordar

$$\text{sen}(2\alpha) = 2\text{sen}\alpha \cos\alpha$$





5) Si θ es un ángulo agudo, tal que $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$;
calcule $\cos 2\theta$.

Resolución:

$$\cos 2\theta = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \right)^2 - 1$$

$$\cos 2\theta = \cancel{2} \left(\frac{1}{\cancel{\sqrt{10}}} \right) - 1$$

$$\cos 2\theta = \frac{1}{5} - 1$$

$$\therefore \cos 2\theta = -\frac{4}{5}$$

Recordar

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$$





6) Siendo β un ángulo agudo, tal que $\tan\beta = \frac{1}{5}$;
calcule $\tan 2\beta$.

Resolución:

$$\tan 2\beta = \frac{2\left(\frac{1}{5}\right)}{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2}$$

$$\tan 2\beta = \frac{\frac{2}{5}}{1 - \frac{1}{25}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{24}{25}} \quad \Bigg]$$

Recordar

$$\tan 2\beta = \frac{2\tan\beta}{1 - \tan^2\beta}$$



$$\therefore \tan 2\beta = \frac{5}{12}$$



7) Reduzca $E = \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$

Resolución:

$$E = \frac{\cancel{2}\sin^{\cancel{2}}\alpha}{\cancel{2}\sin\alpha.\cos\alpha}$$

$$E = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\therefore E = \tan\alpha$$

Recordar

$$2\sin^2\alpha = 1 - \cos 2\alpha$$





8) Efectúe $T = (\cot 18^\circ - \tan 18^\circ) \tan 36^\circ$

Resolución:

$$T = 2 \cot 2(18^\circ) \cdot \tan 36^\circ$$

$$T = 2 \underbrace{\cot 36^\circ \cdot \tan 36^\circ}$$


$$\Rightarrow T = 2(1)$$

$$\therefore T = 2$$

Recordar

$$\cot \alpha - \tan \alpha = 2 \cot 2\alpha$$

$$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$$





9) Siendo $\text{sen} x + \cos x = \sqrt{\frac{3}{7}}$; calcule $\text{sen} 2x$.

Resolución:

$$\underbrace{(\text{sen} x + \cos x)^2}_{\text{green}} = \left(\sqrt{\frac{3}{7}} \right)^2$$

$$1 + \text{sen} 2x = \frac{3}{7}$$

$$\text{sen} 2x = \frac{3}{7} - 1$$

Recordar

$$(\text{sen} \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \text{sen} 2\alpha$$



$$\therefore \text{sen} 2x = -\frac{4}{7}$$



- 10) Al copiar de la pizarra la expresión $1 + \tan^2 8^\circ$, Luis cometió un error y escribió $1 - \tan^2 8^\circ$. Determine la razón entre lo que estaba escrito en la pizarra y lo que escribió Luis.

Resolución:

$$E = \frac{1 + \tan^2 8^\circ}{1 - \tan^2 8^\circ}$$


$$E = \sec 2(8^\circ)$$

$$E = \sec(16^\circ)$$

$$\therefore E = \frac{25}{24}$$

Recordar

$$\sec 2x = \frac{1 + \tan^2 x}{1 - \tan^2 x}$$



COLEGIOS

 **SACO OLIVEROS**  **APEIRON**
SISTEMA HELICOIDAL

**MUCHAS GRACIAS POR
TU ATENCIÓN**

Tu curso amigo
TRIGONOMETRÍA