Uredio L.B.

PSIHOATKIVNE GLJIVE U HRVATSKOJ

Vodič za rod Psilocybe i Panaeolus

Prosinac 2022.

SADRŽAJ

1. UVOD.....2

2. VRSTE U EUROPI.....3

3. KATEGORIJE PRI PROUČAVANJU.....7

4. PSILOCYBE.....8

a. PSILOCYBE SEMILANCEATA.....10

i. slične vrste.....19

b. PSILOCYBE FIMETARIA.....37

i. slične vrste.....46

c. PSILOCYBE SERBICA.....50

i. Psilocybe bohemica.....55

ii. Psilocybe arcana.....59

iii. Psilocybe moravica.....63

iv. slične vrste.....66

d. PSILOCYBE CYANESCENS.....74

i. slične vrste.....84

5. PANAEOLUS.....87

a. PANAEOLUS CINCTULUS (SUBBALTEATUS) 88

b. PANAEOLUS FIMICOLA (ATER) 96

c. PANAEOLUS (PANAEOLINA) FOENISECII 102

d. PANAEOLUS OLIVACEUS (CASTANEIFOLIUS) 108

e. PANAEOLUS CYANESCENS.....116

6. LITERATURA.....125

1. UVOD

Proučavajući gljive i literaturu vezanu uz gljive u Hrvatskoj nalazi se jako malo informacija o psihoaktivnim gljivama. Romano Božac u svojim knjigama napomene tu i tamo psihoaktivnost određene gljive, no i on se ne osvrće posebno na tu kategoriju, te i raspolaže netočnim ili nedostatnim podatcima. Vjerojatno jer to nije bio njegov predmet interesa. Koje točno gljive psihoaktivnih svojstava u Hrvatskoj rastu nije predmet neke rasprave jer te rasprave i nema. Novije informacije se mogu pronaći na forumima i u anegdotalnim podatcima, ali uzdati se u takve podatke i nije neka sreća. Paul Stamets u svojoj knjizi govori o rasprostranjenosti određenih gljiva po svijetu, te Guzman u svojem članku, ali se Hrvatska zbog svoje male površine te nebitnog geopolitičkog položaja i ne spominje. Dodatni razlog je i nezainteresiranosti struke. Mogu reći nažalost budući da na našim područjima JI Europe pronalazimo jako zanimljivu gljivu Psilocybe serbica koja je stavila naše susjede na mikološku kartu, te varijacije te gljive Psilocybe bohemica i moravica (koja je malo daljnje susjede stavila na kartu) koje su mikroskopskom analizom utvrđene i poslije prebačene u varijacije Psilocybe serbice.

Osoba koja želi tim putem upoznati gljive je stoga zakinuta, a i život joj može biti u opasnosti ako joj je motivacija za probom veća od znanstvene znatiželje i opreza. Cilj ovog priručnika je proći psihoaktivne gljive koje su mogu pronaći na našim područjima kao i one koje se mogu proširiti na naše područje budući da se nalaze u susjednim državama.

Dodatnoj zbrci pri pronalasku gljiva u prirodi Hrvatske pridonosi i mijenjanje i prebacivanje određenih gljiva u druge rodove i pod varijacije što otežava pregledavanje starije literature. Npr. Božac u svojim knjigama (Enciklopedija) od Psilocybe roda spominje samo Psilocybe semilanceata, Psilocybe merdaria i usputno spominje Psilocybe coprophilia koja je kasnije prebačena u rod Deconica jer ne sadrži psilocibin (kao i merdaria) kako se ranije mislilo. Istraživanja psihoaktivnost ovisi i području, jedni autori mogu reći da je kod jedne gljive pronađena ta i ta razina psihoaktivnih sredstva, dok će drugi pronaći drugu razinu. Istraživanja tog tipa je nažalost malo. Također kad već često spominjem Božca on za gljivu Panaeolus sphincterus navodi da je psihoaktivna dok to kod slične gljive Panaeolus papilonaceus isto ne navodi makar neki autori ih spajaju u istu vrstu ili navode da je papilonaceus aktivna. Također Panaeolus rickenii, danas Panaeolus acuminatus, naziva halucinogenom iako to nije dovoljno istraženo. Navodno sadrži male doze serotonina, 5-HTP-a i triptofana (psilocibin djeluje na serotoninske receptore u mozgu).

U ovom priručniku neće biti govora o načinu konzumiranja i uzgajanja psihoaktivnih gljiva budući da to izlazi van zakonskih okvira, već je cilj proučavanje u prirodi. Ako ćete priručnik koristiti u druge svrhe to je na osobnoj odgovornosti pojedinca. Osobna želja je da se psilocibinske gljive počnu dodatno proučavati jer pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju ovisnosti, depresije, anksioznosti, te i drugih psiholoških problema. Prema listi toksičnih supstanci Centra za kontrolu bolesti SAD-a (Center for Disease Control) psilocibin je manje toksičan od aspirina. Ako sam gdje pogriješio ili sam nejasan pozivam članove mikološke zajednice da me isprave.

VRSTE U EUROPI

Budući je kako sam i ranije naveo informacije o tome koje se točno vrste nalaze u Hrvatskoj su rijetke i nedostatne, prvo treba proširiti pogled i pogledati koje vrste možemo naći u Europi. Neću se osvrtati na cijelu Europu (osim Europe kao cjeline) već na bliže i dalje susjede od kojih bi spore mogle doći do Hrvatske. Kao izvor o rasprostranjenosti vrsta u Europi uzimam Paula Stametsa i njegovu knjigu i Guzmana i njegov članak, te Internet stranicu shroomery.org. U priručniku ću se usmjeriti na rodove Psilocybe i Panaeolus kao najčešće spominjane predstavnike psihoaktivnih gljiva, dok ću druge iz rodova poput Gymnopilus, Inocybe, Pluteus samo spomenuti. Neću se ni usmjeravati na poznate gljive poput Amanita Muscaria (muhara) koja je također psihoaktivna, ali i opasnija od onih iz rodova Psilocybe i Panaeolus. Rod Inocybe neću spominjati jer sadrže i slične smrtno opasne vrste unutar roda, te ne želim nepotrebno širiti priručnik čiji okviri u mojoj glavi nadilaze moje slobodno vrijeme, a posebno ne želim dovoditi amatera u iskušenje koje bi mogao skupo platiti.

Slijedeće je preuzeto iz Guzmana koji je pobrojao neurotropne vrste (uz prijevod i pročišćavanja za ovaj okvir nebitnog). Guzman ne spominje Hrvatsku posebno no spominje Jugoslaviju. Usporedno s anegdotalnim podacima sa stranice shroomery.org. Stijve i Kuyperm su pronašli da u Europi na istraživanju na više od 100 vrsta gljiva da psilocibina, psilocina i/ili baeocistina ima u 3 gljive roda Psilocybe, 1 gljivi roda Panaeolus, 5 gljiva roda Inocybe i jednoj gljivi roda Pluteus, a da su središnjoj i sjevernoj Europi Psilocybe semilanceata i Panaeolus subbalteatus jedini tolike razine psihoaktivnih sredstava da je moguća „zlouporaba“. Ali to je bilo 1985.g. i od tada se mnogo toga promijenilo.

Guzman

Široko rasprostranjeni po Europi

Amanita Muscaria
Amanita Panterina
Amanita Regalis

Claviceps nigricans
Claviceps purpurea
Claviceps paspali

Cordyceps capitata
Cordyceps ophioglossoides

Conocybe cynapous

Copelandia (Panaeolus) cyanescens

Gerronema fibula

Gymnopilus aeruginosus
Gymnopilus liquiritiae
Gymnoplius prupuratus
Gymnopilus sapineus
Gymnopilus spectabilis

Inocybe auriginascens
Inocybe coelestium
Inocybe corydalina
Inocybe haemata
Inocybe tricolor

Mycena cyanorrhiza

Panaeolina foenisecci
Panaeolus ater
Panaeolus fimicola
Panaeolus olivaceus
Panaeolus papilonaceus

Panaeolus retirugis
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus subbalteatus

Pluteus atricapilus
Pluteus cyanopus
Pluteus glaucus
Pluteus nigroviridis
Pluteus salicinus
Pluteus vilosus

Psilocybe bohemica
Psilocybe coprinifacies
Psilocybe cyanescens
Psilocybe fimetaria
Psilocybe liniformans var. Liniformans
Psilocybe mairei
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica
Psilocybe silvatica
Psilocybe strictipes
Psilocybe peliculosa

Vascellum pratense

Austria
Claviceps purpurea
Copelandia (Panaeolus) cyanescens

Inocybe coelestium
Inocybe corydalina
Inocybe haemata
Inocybe tricolor

Psilocybe bohemica
Psilocybe cyanescens
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica

Panaeolina foenisecci
Panaeolus ater
Panaeolus fimicola

Njemačka
Amanita Muscaria
Amanita Panterina

Claviceps purpurea

Cordyceps capitata
Cordyceps ophioglossoides

Gymnopilus aeruginosus
Gymnoplius prupuratus
Gymnopilus sapineus
Gymnopilus spectabilis

Inocybe auriginascens
Inocybe coelestium
Inocybe corydalina
Inocybe haemata

Panaeolina foenisecci
Panaeolus ater
Panaeolus fimicola
Panaeolus papilonaceus
Panaeolus retirugis
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus subbalteatus

Pluteus atricapilus
Pluteus cyanopus
Pluteus salicinus
Pluteus vilosus

Psilocybe bohemica
Psilocybe cyanescens
Psilocybe mairei
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica
Psilocybe strictipes

Mađarska
Claviceps purpurea

Inocybe auriginascens

Pluteus nigroviridis

Psilocybe semilanceata

Italija
Amanita Muscaria
Amanita Panterina

Claviceps purpurea
Claviceps paspali

Copelandia anomala
Copelandia (Panaeolus) cyanescens

Gerronema fibula

Gymnopilus liquiritiae
Gymnoplius prupuratus
Gymnopilus spectabilis

Inocybe corydalina
Inocybe haemata
Inocybe tricolor

Mycena cyanorrhiza

Panaeolina foenisecci
Panaeolus fimicola
Panaeolus papilonaceus
Panaeolus retirugis
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus subbalteatus
Panaeolus cyanescens

Pluteus cyanopus
Pluteus salicinus

Psilocybe cyanescens
Psilocybe fimetaria
Psilocybe semilanceata
Psilocybe strictipes

Yugoslavia
Claviceps purpurea
Psilocybe semilanceata

Vidno je da i Guzman spominje određene vrste koje danas se ne smatraju više psihoaktivne, te ne spominje Psilocybe serbica pod Jugoslavija, dok ćemo je mi proučavati.

Shroomery.org

Europa
Gymnopilus aeruginosus
Gymnopilus purpuratus
Gymnopilus sp.
Inocybe aeruginascens (ne preporučuje se tražiti, zbog velikog broja sličnih otrovnih (i smrtno))
Inocybe corydalina
Inocybe corydalina var. erinaceomorpha
Inocybe haemacta
Inocybe tricolor
Panaeolus bisporus
Panaeolus cinctulus
Panaeolus fimicola
Panaeolus olivaceus
Panaeolus sp.
Pluteus cyanopus
Pluteus glaucus
Pluteus nigroviridis
Pluteus salicinus
Pluteus villosus
Psilocybe cyanescens
Psilocybe fimetaria
Psilocybe liniformans var. liniformans
Psilocybe mairei
Psilocybe medullosa
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica
Psilocybe serbica var. Bohemica

Austria
Gymnopilus sp.
Inocybe coelestium
Inocybe corydalina var. corydalina
Inocybe haemacta
Inocybe tricolor
Panaeolus cinctulus
Panaeolus cyanescens
Panaeolus fimicola
Pholiotina cyanopus (link)
Psilocybe cyanescens
Psilocybe medullosa
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica
Psilocybe serbica var. bohemica

Croatia

Gymnopilus sp.
Panaeolus cinctulus
Psilocybe fimetaria
Psilocybe serbica
Psilocybe semilanceata

Serbia

Gymnopilus sp.
Panaeolus cinctulus
Psilocybe serbica
Psilocybe semilanceata
Psilocybe cyanescens
Psilocybe bohemica

Slovenia

Gymnopilus sp.
Panaeolus cinctulus
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica

Bosnia

Gymnopilus sp.
Panaeolus cinctulus
Psilocybe serbica

Hungary

Gymnopilus sp.
Inocybe aeruginascens
Panaeolus cinctulus
Pholiotina cyanopus
Pluteus nigroviridis
Psilocybe sp. (možda P. serbica ili P. bohemica?)

Italy

Gymnopilus sp.
Inocybe corydalina
Panaeolus cinctulus
Pholiotina cyanopus
Panaeolus cyanescens
Psilocybe cyanescens (Guzman 2002)
Psilocybe liniformans var. liniformans
Psilocybe medullosa
Psilocybe puberula
Psilocybe semilanceata
Psilocybe serbica var. bohemica

KATEGORIJE PRI PROUČAVANJU

- Stanište – kako bi pronašli ove gljive prvenstveno treba znati gdje tražiti, tako da će ovo biti prva kategorija. Ako nam neka gljiva izgleda kao psihoaktivna, a nalazi se na različitom staništu od navedenog, istu gljivu pri identifikaciji treba odbaciti ili pobliže obratiti pozornost. Također je bitno znati dali gljiva raste samostalno ili u grupi jer je to dodatna informacija pri identifikaciji.
- Klobuk – Glavnu karakteristiku pri proučavanju gljiva vidimo klobuk, no to nikako nije jedina. Šira javnost je oprezna pri branju gljiva prvenstveno jer ima veliki broj gljiva sličnih klobuka, a različite jestivosti/otrovnosti. Pri proučavanju određenih karakteristika poput klobuka treba paziti i u kakvo vrijeme zatičemo određenu gljivu budući da vlažnost utječe na boju klobuka, a to je pogotovo vidljivo kod Psilocybe Semilanceata.
- Listići /Otrusina – Nećemo se baviti mikroskopskim karakteristikama spora već samo bojom, budući da je ovo vodič za amatere za koje pretpostavljam da nemaju mikroskop, a ako imaju dovoljno su vješti i sami potražiti opis mikroskopskih karakteristika. Spore tj. otrusina se uzimaju tako da se klobuk gljive sa listićima dolje stavi na bijeli papir, te se ostavi bar sat vremena. Ostavljeni trag se zove otrusina i može nam pomoći u određivanju pripadnosti rodu.
- Stručak – boja, oblik, dužina, moguća zadebljanja, povezanost s micelijem su karakteristike pomoću kojih možemo dobiti dodatnu potvrdu da je to ono što tražimo ili odbaciti gljivu kao nepoželjnu.
- Plavljenje/Pelikl – bitno kod roda Psilocybe, dok kod ostalih nije, te nije ni nešto važno za šire proučavanje gljiva. Kod razgradnje ranije spominjanih spojeva psilocibin u psilocin događa se plavljenje na klobuku i stručku gljive. Pelikl je gusta želatinozna ovojnica na gornjoj strani klobuka.
- Psihoaktivnost – ako postoje podatci o razini biti će navedeni, ako ne neće.
- Slične vrste – kako bi mogli točno identificirati određenu gljivu moramo znati koje joj gljive sliče kako se ne bi vodili mišlju, a ima 3/5 nabrojenih karakteristike sigurno je ta, dok slična vrsta ima 5/5, te da slična vrsta može biti smrtno opasna kao kod roda Inocybe.
- Komentar – ako su potrebni dodatni komentari biti će u ovom odjeljku.

Uz kategorije pri proučavanju u ovom priručniku će biti pokazan veći broj slika, ali je bitno ne voditi se samo slikama, već proučiti i navedene kategorije, jer samo na temelju slike nije sigurno vršiti identifikacije. Nije dobar gljivar onaj koji nabere najviše gljiva već onaj koji ne ubere nijednu koju ne želi.

PSILOCYBE

OPĆENITE KARAKTERISTIKE

Samo da napomenem da se neću posebno usmjeravati na to što čini određene gljive psihoaktivnim, niti ću posebno pojašnjavati spojeve i kemijske termine psilocibin, psilocin i baeocistin koji su zaslužni za subjektivni osjećaj psihoaktivnosti, već ću se prvenstveno usmjeriti na glavni rod psihoaktivnih gljiva Psilocybe i ono što ih obilježava i odvaja od drugih gljiva.

Stanište

Općeniti i djelomično neupućeni stav govori da psilocibinske gljive rastu samo na izmetu i stoga su nehigijenske i opasne. Iako je djelomično točno da određene psilocibinske gljive vole izmet kao podlogu, to nije isključivo tako. Psilocybe semilanceata (po našem Šiljata klobučica) raste i na izmetu raznih životinja (goveda, konja...) ali raste i u parkovima, pognojenim livadama, pašnjacima, te takve gljive vole neodržavane ljudske površine. Neke gljive npr, Psilocybe serbica iako je narodni naziv Balegarka ne rastu na izmetu već kao saprofit (razgrađivač) na granama i to se može reći da su Psilocybe zapravo gljive češće razgrađivači. I druge gljive Psilocybe su saprofiti te razgrađuju lišče, kore, malč, šipražje. Mogu se pronaći kraj puteva gdje se prevozi stoka i trupci, te je tu uvijek dobro započeti potragu. Također je bitno znati i u koje vrijeme rastu, jer ako gljivu je pronalazite za vrijeme sušnih ljetnih vremena, a ona raste na jesen i proljeće za vrijeme kiša možete biti sigurni da ste u krivu.

Spore

Svaki rod gljiva ima određenu boju spora (većinski prisutno u rodu), te je isto i kod gljiva Psilocybe. Gljive iz tog roda imaju ljubičaste, ljubičasto-crne i ljubičasto-smeđe spore. Potrebno je uzeti otisak. Postupak će biti prikazan kod Psilocybe semilanceate.

Plavljenje

Određene vrste jače plave (Serbica var. Bohemica), a druge slabije (Semilanceata), te je moguće da na određenoj gljivi uopće nema plavljenja iako pripada rodu Psilocybe. Plavljenje se javlja kada sa gljivom manipuliramo, stišćemo je ili na sličan način utječemo na meso gljive, tada se psilocibin pretvara u psilocin i smanjujemo psihoaktivnost gljive. No što je plavljenje jače prisutno znači da je u gljivi bilo više psihoaktivnih tvari.

Pelikl

Gljive iz roda Psilocybe obično imaju odvojivi pelikl tj. prozirni želatinozni sloj na gornjoj strani klobuka koji se kod nekih vrsta lakše skida, a kod nekih teže, dok ih neke ni nemaju, tako da primjećena odsutnost pelikla ne znači da gljiva nije Psilocybe. Naziv gljive (psilós) "ogoljen" / "gol" i κύβη (kúbe) "glava" /

"oteklina", daje značenje "gologlav" ili „ćelav“ što se odnosi na izgled klobuka ćelave glave i sjajnog pelikla koji na to podsjeća.

Koje postoje u Hrvatskoj? Koje ćemo proučavati?

Anegdotalni podatci govore da u Hrvatskoj ima Psilocybe fimetaria, serbica i semilanceata. Božac posebno navodi semilanceatu te ćemo se prvo na nju i osvrnuti za koju je najvjerojatnije da ćete nabasati, onda na ostale navedene (proučiti ćemo i varijacije Psilocybe serbice), a zatim i na vrstu Psilocybe cyanescens koja je prisutna kod susjeda te se ne bi iznenadio da ju je moguće pronaći i u Hrvatskoj, te je u svijetu među najraširenijima. Usput ću se i u kraćim crtama osvrnuti na ostale vrste roda Psilocybe koje je moguće naći u Europi kako bi potaknuo moguću konfirmaciju da su i te gljive prisutne na prostoru RH.

PSILOCYBE SEMILANCEATA

Stanište

Dok Božac spominje da raste na izmetu raznih životinja (goveda, konja) to nije točno, semilanceata raste pojedinačno ili grupno na bogatim i kiselim tlima, u dolinama, u parkovima, pognojenim livadama i pašnjacima (posebno ako su pognojeni kravljim ili ovčjim gnojivom) i u jesen. Saprofit koji se hrani razgrađivanjem korijena trave. Voli područja gdje ima ili je bilo ljudi.

Usporedba na staništu, mokro i suho, osim klobuka boju mijenja i stručak (Slika autora Purenature sa stranice iNaturalist)

Klobuk

Širok 1-3,5cm; u početku polukuglasto konveksan, poslije raširen, smeđomaslinast, po vlažnom zelenkasto-smeđ, mazav, po suhom vremenu slamnato žut, malo mazav, u početku na rubu ima bijele ostatke ovoja. Klobuci variraju u obliku od koničnog do zvonastog. Po suhom vremenu suši se od vrha prema rubu klobuka. Vidljiv tamni rub. Najbitnija karakteristika koja odvaja od sličnih vrsta je prisutnost „sisice“ tj. bradavice na vrhu, koja za vrijeme vlažnog vremena može izgledati prozirno. Kada je mokro vide se radijalne linije (što su zapravo listići ispod). Meso je tanko, žućkasto, miris i okus nisu određeni, moguće blago na brašno. Kad je gljiva mlada moguć veo koji brzo nestaje, te ga ne treba ni tražiti. Rub klobuka je prvo uvijen prema unutra, dok se sa starosti izravnava, a moguće je i izvijanje prema van.

Slika petemella s iNaturalist, veličina, boja oblik, suho vrijeme

Slika laughingjims s iNaturalist veličina, boja, oblik, varijacije

Slika major_bombylius s iNaturalist – uvijanje klobuka kod mlade gljive

Slika laughingjims s iNaturalist lijevo radijalne crte, desno zvonasti oblik u starenju, mokro

Listići/Otrusina

Prirasli ili se malo spuštaju po stručku između 15 do 27 listića, umjereno zgusnuti, prvo su žučkasti, blijedo smeđi, poslije tamno sivi ili ljubičasto-smeđi sa svjetlijim rubom oštricom kada spore postaju zrelije. Otrusina crvenkasta, smeđa ili ljubičasto-smeđa.

Slika alan_rockerfeller gore lijevo - listići svijetlije boje prvo dok je gljiva mlada, blago prisutan veo, gore desno, shane_marshall – taman rub, listići polako tamne, dolje alan_rockerfeller , ljubičasti listići sa svjetlijim rubom, oštricom (slike preuzete s iNaturalist)

Slika gore anzactive – postupak uzimanja otrusine, u sredini lijevo – mali ostatak otrusine na papiru budući da je gljiva zatvorena, sredina desno mohuamice– svjetlija otrusina, potrebno duže ostaviti gljivu, dolje lijevo jeb10 – uspješno uzeta otrusina ljubičasto-sive boje, dolje desno listići (slike s iNaturalist)

Stručak

Visok 1,5-4cm, osnova zadebljana, no blago, blijed ili žućkast, vrlo sitno maljav, u početku pun, zatim šupalj. Stručak nije krut i nije lako lomljiv, sličan slami. Gol. Mogući crnkasti trag oko stručka zbog spora(slika na prethodnoj stranici, dolje desno) Moguće vijugav.

Slika tusee s iNaturalist, gore stručak cijelom dužinom i dolje malo zadebljanje pri dnu, makar ga ne treba ni tražiti ni očekivati jer je teže primjetiti

Lijevo coooperj, tamniji stručak, desno joeholt – vijugavost stručka (iNaturalist)

Slika alan_rockerfeller vijugavost stručka iNaturalist

Plavljenje/ Pelikl da?/da

Svi dijelovi gljive mogu potamniti (poplaviti) ako se dira i stišće, a može i sa starosti. Nije sklona pretjeranom plavljenju budući da ima malo psilocina, te ga ne treba očekivati. Moguće da se plavljenje ni ne javi. Mazavost klobuka dolazi od priustnosti pelikla, koji je posebno vidljiv ako se dio klobuka lomi prema van.

Slika lijevo tyson_ehlers – pelikl, desno - doublebind.com pelikl pri odvajanju prema van

Slika amamalian – plavljenje, rijetko se javlja kako je vidljivo iz ranijih slika

Psihoaktivnost

Psihoaktivna i jedna od najpoznatiji i najrašireniji psilocibinskih gljiva. Božac navodi da može dovesti do teških maničnih stanja, no ne treba ga pretjerano uzimati u obzir, ali oprez je uvijek potreban. Umjereno da iznimno potentna vrsta. Sadrži puno psilocibina (oko 1%), a malo psilocina (zato ne plavi baš). Kod ove vrste jačina plavljenja ne odražava njezinu potentnost kao kod drugih vrsta.

Slične vrste

Protostopharia semiglobata

Ranije se mislilo da je semiglobata stariji i zreliji oblik semilanceate, razlika je što semiglobata ima oblik polukugle, raste na izmetu, moguće da ima vidljiv prsten, a takav semilanceata nema, zaobljenija na dnu stručka (ne uvijek), ne varira s obzirom na vrijeme, te nije psihoaktivna, usmjeriti se na oblik klobuka, stanište i pelikl.

Slika gore lijevo asdfmaster – semiglobata (reddit), gore desno semiglobata dolje lijevo, sergio angulo – inaturalist semiglobata, dolje lijevo anglerfishnwy - semilanceata

Psilocybe peliculosa

Također psihoaktivna gljiva, iako slabije, nepotvrđena u Hrvatskoj, ali Guzman navodi da je ima u Europi. Moguće da je peliculosa krivo identificirana kao semilanceata u pojednim slučajevima, ali možda je to samo moja želja. Između dvije gljive postoji razlika u staništu, semilanceata raste na travnatim područjima, dok peliculosa raste na ostatcima četinara, na mahovini, raste grupno i u klasterima, semilanceata ima veće spore (potreban mikroskop) i čunjasta na papilatnoj kapici, peliculosa kasnije raširena, a stručak peliculose je smeđkast sa bijelim mrljama.

Slika Alan Rockefeller iNaturalist obje slike peliculose, gore vidljive bijele mrlje na stručku, rastu u klasterima na četinarima, dolje – kao mlade dosta različite, boja klobuka drugačija, na stručku bijele mrlje, opasnosti nema, osim što je slabije potentnosti

Psilocybe strictipes

Također psihoaktivna gljiva, nepotvrđena u Hrvatskoj, ali Guzman navodi da je ima u Italiji. Jednakog staništa, a moguće da je strictipes kao i peliculosa, krivo identificirana kao semilanceata, ali možda je to samo moja želja. Razlika između semilanceate i strictipes je što strictipes nema bradavicu na vrhu klobuka, i ima konveksniji izvijeni klobuk. Po meni izgledom ponekad sličnija Protostropharii semiglobati koja raste na izmetu. Postoji velika sličnost i moguće je i prebacivanje ove gljive pod varijacije semilanceate.

Slike Caleb Brown sa https://mushroomobserver.org/

Panaeolus papilionaceus / Panaeolus sphinctrinus / Panaelous semiovatus

Kao što semilanceata ima slične gljive u svome rodu, ima slične gljive i u drugim rodovima poput roda Panaeolus. Papilonaceus ima sličan oblik klobuka, boju tijekom mokrog vremena, ali bez bradavice, kao što ni nema pelikl, a rub klobuka je bijel (što je ostatak veluma) i ima crnu otrusina. Raste u grupama i klasterima, na kravljem izmetu, ali i na pašnjacima. Posebno obratiti pozornost na rub klobuka, ali što je gljiva starija manje je vidljiv bijeli rub, ali je rebrast. U ranijim izvorima sphinctrinus je bio odvojena vrsta, ali je spojen u papilonaceus. Božac navodi da je sphinctrinus halucinogen, dok za papilonacues to posebno ne navodi. Svi imaju crnu otrusinu. Nisu psihoaktivni.

Slika Kenton Kwok - papilacenous

Slika gore timendez, dolje lijevo gordon walker, dolje desno morpheus, sve papilnonaceus, nekad vidljiva kao bradavica vrh, ali i bijeli rebrasti rub, kad je mokro ne vide se radijalne linije na klobuku, boja stručka je presiva, kao i klobuka

Slika Amadej Trnkoczy papilonaceus

Panaeolus Semiovatus je malko drugačiji, no ni on nema pelikl, bradavicu, te ima prsten koji je često crn od spora, te je boja malko drugačija.

Slika Alan Rockefeller s iNaturalist – semiovatus

Panaeolina foenisecii

Razlike od semilanceate je što klobuk nije ušiljen i veće su nego semilanceata, nemaju bradavice, pelikl i ima tamno smeđu otrusinu. Ponekad navedena kao psihoaktivna, no ne posjeduje psihoaktivnih tvari. Stanište joj je na travi. Mijenja se za Panaeolus cinctulus ili Panaeolus olivaceus s kojima dijeli stanište, te koje jesu psihoaktivne. Panaeolusi imaju sjajno crne spore, a Panaolina ima smeđe-crne (kao Nutela).

Panaeolus acuminatus / Panaeolus Rickenii

Neki bi mogli reći najsličnija semilanceati. Božac je drži za psihoatkivnu, dok drugi tvrde da nije. Bitne razlike su bradavica i pelikl. Može rasti i u travi, ali raste i na izmetu. Kasnije klobuk izvijen prema van.

Slike sličnosti Panaeolusa acuminatusa i semilanceate po mokrom vremenu; izvor Youtube; korisnik The Forest, velika sličnost, ali vidljiva bradavica i veća mazavost (od pelikla) kod semilanceate koja je gornja. Navodi se da acuminatus u sebi sadrži serotonin i neke slične tvari.

Conocybe apala

Neupućenom oku može biti sličan izgled, ali apala ima crveno-smeđu otrusinu, jako lomljiva za razliku od semilanceata, bez pelikla.

Slika mycowalt s iNaturalist– conocybe apala

Mycena

Gljive iz roda Mycena su manje i lomljivijeg stručka, imaju bijele spore, bez pelikla, kod nekih vrsta se vide kao radijalne linije, no to je više naboranost klobuka nego odraz listića ispod, saprofiti su, obično ih možemo naći na drveću, koničnih klobuka, ali sličnije šljemu. Najbitnija razlika je veličina i boja spora.

Slika Etisergieva s iNaturalist – Mycena stipata, kao radijalne linije, no rastu na drvetu, bijeli obrub

Slika Иван Матершев iNaturalist – Mycena stipata – bijeli obrub, rastu na drvetu

Slika lijevo Mike Lusk mycena subviscosa, stručak drugačiji, raste na drvetu, bijeli obrub slika desno Steeve Reekie – mycena ura, vidljiva bradavica, no skroz kriva boja; slike s iNaturalista

Slika lijevo Tatiana Bulyonkova s iNaturalist – Mycena haematopus, razlike očite, desno Troutfly s iNaturalist, Mycena inclinata; razlike očite

Slika gore, Mycena, razlike vidljive, dolje lijevo Slika Richard Sullivan – Mushroom Observer Mycena galopus dolje desno Mycena polygramma James Lindsey at Ecology of Commanster

Slika korisnika faffa sa ohuobach.cz - Mycena polygramma

Slika s fungoceva.it/ Mycena callopoda (Mycena galericulata var. callopoda)

Psathyrella

Sličnost su spore koje izgledaju ljubičasto smeđe i mogu ličiti na spore roda Psilocybe, no neobično lomljive, bez pelikla i bradavice, te ne bi trebalo biti većih poteškoća sa razlikovanjem.

Slika Psathyrella corrugis - Joanne and Robert Solem

Psathyrella bipellis Alan Rockefeller iNaturalist

Slike – piše na njima

Slike Jelle Bakker s waarneming.nl Psathyrella prona

Slike Lice Zibarova - Psathyrella prona

Slika gore lijevo Hamilton s Mushroom Observera, gore desno masadler, a dolje Cesar Andres Castillo iNaturalist Psathyrella velutina (Lacrymaria lacrymabunda), može doći do zamjene dok su mlade, ali vidan je čehast stručak i klobuk, kasnije je klobuk raširen kao kišobran, pa ne liči, više liči semiglobati. Ima slično stanište sa semilanceatom. Raste ljeti i u jesen, busenasto ili pojedinačno uz putove, po svijetlim šumama i uz panjeve. Semilanceata ne raste busenasto.

Slika gore Christian Schwarz s iNaturalist , dolje David Greenberger isto s iNaturalist - Candolleomyces candolleanus (ranije Psathyrella candolleana) – raste busenasto za razliku od semilanceate, nema bradavicu, ni pelikl, bijeli čehavi rub, do sada već trebate znati da nisu ni blizu.

Komentar:

Postoje i sterilni oblici gljive Psilocybe semilanceata kod kojih se ne izbacuju spore, tako da se od njih neće dobiti otrusina, niti će listići poprimiti tamniju boju, već će ostati žućkasti. Možda je najbolje da amater ne bere ovu varijaciju zbog teže identifikacije.

PSILOCYBE FIMETARIA

Možda našim krajevima bliža Psilocybe serbica, no ona će biti obrađena tek slijedeća zbog komplikacija vezanih uz mnoge varijacije unutar vrste. Psilocybe fimetaria je za prosječnog gljivoljupca nepoznata, ali hajmo potaknuti da se i ona nalazi i upoznaje.

Slika Brandon Vidrine iNaturalist, posebnu pažnju obratiti na listiće i kako se spajaju na vrhu

Stanište

Raste pojedinačno i grupno na izmetu životinja (krava i konja) na travnatim područjima. Široko je rasprostranjena, ali rijetka. Raste od rujna do studenog.

Slika johnnyvanbatman iNaturalist

Slika 42DH wikipedia

Slike staništa Bjoerns (iNaturalist)

Klobuk

Klobuk je 1,5-3,5 cm u promjeru, konveksan do oblika leće (plano-konveksan), s godinama postaje zvonast do široko konveksan, sa ili bez oštre papile. Prisutna „bradavica“ kao kod semilanceate, makar nije tolika odrednica kao kod nje i jasnija je dok je mlada. Površina zna biti do prozirno-prugasta blizu ruba, a viskozna kada je vlažna zbog pelikla (gusta želatinozna ovojnica da još jednom ponovimo) koji se može odvojiti. Blijedo crvenkastosmeđe do boje meda do oker, higrofano, blijedi tijekom sušenja do žućkasto maslinaste do maslinasto žute i tamno oker. Meso je bjelkasto do boje meda. Okus i miris brašnast.

Slika Brandon Vidrine (iNaturalist)

Slika 42DH wikipedia

Listići/Otrusina

Samo usko pričvršćeni za stručak, a ponekad kao zarezane prije nego što se blago spuštaju niz stručak, ili zarezane i pričvršćene za stručak na malom dijelu. Nisu daleko odvojeni, a nisu ni blizu, napuhane u sredini. Prvo bjelkasta na glinu, kasnije tamno crvenkasto-smeđe sa maslinastom nijansom i bijelim rubom listića. Spore tamno ljubičasto-smeđe.

Slika Brandon Vidrine lijevo, desno sean1068 (iNaturalist), vidljive tamnije mrlje, početak širenja spora

Stručak

Stručak je dužine od 2 do 10 centimetara, debljine 2-4mm. Cilindričan, moguće vijugav (kao semilanceata), jednak cijelom dužinom ili blago zadebljan pri bazi. Na početku bjelkast, a brzo požuti ili smeđe-žut od manipulacije, u zrelosti crvenkastosmeđ ili medeno smeđ. Ponekad sa jasnim plavim tonovima pri bazi. Površina prekrivena bijelim strijama pri vrhu, sa ostatkom prstena (kortina), prsten koji je brzo nestao kao posljedica djelomičnog vela.

Slikalijevo Brandon Vidrine, desno sean1068, dolje sean1068 (iNaturalist)

Plavljenje/ Pelikl da?/da

Plavljenje se može javljati pri bazi, kao na prethodnoj slici. Inače ne plavi baš. Pelikl prisutan, jasnije primjetan pri mokrom vremenu.

Sean 1068 lijevo pelikl pri trganju vidljiv između prsta i listića, desno DH42 peklikl kao vrh (iNaturalist) podsjeća malo na semilanceatu kako je proziran

Psihoaktivnost

Srednje potentna.

Slika Brandon Vidrine - fimetaria

Slika fimetaria po vlažnom vremenu, Johnnyvanbatman (Joao Silva), vidljiv prsten, ostatak veluma iNaturalist

Slične vrste

Nema mnogo vrsta koje rastu na izmetu, a da su slične, a kamoli opasne. Opisat ću par sličnih kako je ne bi mijenjali, te kako bi mogli stvarno potvrditi da je to ta.

Deconica Coprophila

Klobuci i stanište su jako slični. Listići kod fimetarie su usko povezani za stručak i međusobno su bliže, dok su kod coprophilie široko povezani sa stručkom sa podrazmaknutim listićima. Deconica je češća vrsta od fimetarie, te pri pronalasku gljive ovoga oblika na izmetu treba obratiti posebnu pozornost. Kao napomena coprophilia je ranije bila rod Psilocybe gdje je i Božac smješta, ali kod coprohilie nisu prisutne psihoaktivne tvari. Coprophilia nije otrovna, ali i nije nešto jestiva obzirom na stanište. Nema pelikl. Ne plave.

Slika (https://biolwww.usask.ca/fungi/) Lijevo slika listića kod coprohilije, a desno kod fimetarije.

Slika Alan Rockefeller (iNaturalist) fimetaria ili coprophilia, odozgora je teško prepoznati, makar fimetaria ima izraženiji vrh i pelikl. Svakako bi dobro došao mikroskop

Slike combs_h_20 (iNaturalist) Deconica coprophilia, raznobojne tijekom sušenja, izraženije kod coprophilije, potrebno pogledati listiće i pelikl, dolje listići pokazuju da je to najvjerojatnije coprophilia

Deconica merdaria

Slika gore Johnatan Frank, dolje Alan Rockefeller (iNaturalist) Deconica merdaria, gore presvijetla, dolje pretamna, i s prstenom koji je izražen, posebno dolje. Nema pelikl i nema plavljenja.

PSILOCYBE SERBICA

Slika Jonas Gruska iNaturalist – Psilocybe serbica

Psilocybe serbica je zapravo slabo istražena i relativno nepoznata vrsta (po usporedbi s semilanceatom) i blisko povezana s Psilocybe cyanescens (koju ćemo obraditi slijedeću). Slabo istražena je vjerojatno zbog podneblja gdje se nalazi, ali i zbog velikih varijacija i podrvsta. Otkrivena je 1969. godine na planini Tari u Srbiji. Molekularnom analizom 2010. pokazalo se da je serbica ista vrsta kao i Psilocybe bohemica (opisana prvi put 1983.), arcana (opisana 2001.) i moravica (2003. imaju i podrvrste podrvrsta Psilocybe moravica var. moravica i Psilocybe moravica var. sterberkiana). Kako objasniti i pomiriti sve ove varijacije. Ne znam, ali ćemo probati uz veliki broj slika kako bi potekli istraživanja budući da je ovo vrsta iz regije, uključujući i bohemicu (Češka). Prvo ću samo prikazati varijacije, a onda ćemo na opise kategorija. Spominjajući varijacije pisati ću samo npr. Psilocybe arcana bez Psilocybe serbica var. arcana. Dolje prikaz varijacija, uz česte vrste koje pojačano plave kao i serbica, te rastu na raspadajućem drvetu.



Fig. 4. Macrocharacters. a – *P. cyanescens*. b – *P. bohemica*. c – *P. azurescens*. d – *P. moravica*. e – *P. arcana*.

Psilocybe serbica

Stanište

Većinom raste u grupama, na listopadnom i crnogoričnim drvima koja su započela fazu raspadanja (tj. u poodmakloj fazi) i uz koprivu, uz kupine, na graničicama, kompostu, ostatcima biljaka u šumama, obično na vlažnijim mjestima uz potoke, šumske puteve i rubove cesta. „Ne voli“ mjesta gdje ima ili je bilo ljudi. Borovička navodi da ima i u Hrvatskoj.

Klobuk

Klobuk je promjera 1-4 cm, tupo čunjast, a kasnije postaje zvonast ili konveksan. Širi se do široko konveksnog ili ravnog i prvo je zakrivljen prema dolje, pa ravan pa zakrivljen prema gore. Boja je od tamno-smeđe do narančasto-smeđe i blijedo-oker kada je suh. Gladak je, higrofan i blago proziran, strijast kada je mokar, viskozan i Stamets kaže da pelikl često nije odvojiv, ali je prisutan. Meso je bijelo, boje kreme i plavi kada se stišće.

Listići/Otrusina 

Spore su ljubičasto, smeđe. Listići su prirasli ili se malo spuštaju po stručku, zaobljeni prema unutra na točki spajanja. Listići su prvo svjetlo-smeđi, tamne sa dobi sa ljubičastim odsjajem.

Stručak

Stručak je dužine od 45-80 mm, debljine 2-10. Ima jednaku strukturu, blago zadebljanje na bazi. Bijel je, svilenkasto sjajan i gladak, ili sa ponekim bjelkastim zaostacima vela.

Plavljenje/ Pelikl da/da?

Prisutno jasno plavljenje na mjestima dodira, ostaju modrice. Pelikl često nije odvojiv, a Stamets kaže da ga ima.

Psihoaktivnost

Psilocibin u ovoj vrsti varira od 0.11% do 1.34% po suhoj težini. Razine baeocistina i psilocibina je najviši u klobuku. Umjereno da visoko potentna vrsta.

Slika – gljiva identificirana kao Psilocybe serbica (Mushroomobserver.org – slikao James Baker na farmi Kezele , Šumećani, Zagrebačka županija, Hrvatska)

Silke Luca Pasquali – Mushroom Observer – Psilocybe Serbica

Psilocybe bohemica

Stanište

Većinom raste u grupama, na listopadnom i crnogoričnim drvima koja su započela fazu raspadanja (tj. u poodmakloj fazi) i uz koprivu, uz kupine, na graničicama, kompostu, ostatcima biljaka u šumama, obično na vlažnijim mjestima uz potoke, šumske puteve i rubove cesta. Od listopada, do prosinca, makar se u Češkoj tijekom blagih zima može naći i u siječnju i veljači.

Klobuk

Obilježava je tanko-plodno tijelo, blijedo karamel smeđi klobuk (nikada narančasto-smeđ ili crvenkasto smeđ) koji može blijediti do blijedo do boje bijele kave i bjelkast (nikada žućkast; vidno na prvoj slici kod naslova). Miris blago na rotkvicu sa jasnim slatkim dodatkom (kao kakao).

Listići/Otrusina 

Spore su ljubičasto-smeđe. Listići su prirasli ili se malo spuštaju po stručku, zaobljeni prema unutra na točki spajanja. Listići su prvo svjetlo-smeđi, tamne sa dobi sa ljubičastom nijansom.

Stručak

Uzak i cilindričan, bez zadebljanja ni na bazi ni pri klobuku, sa ostatcima vela u donjem dijelu i bijeli klasteri rizomorfa (micelijarne niti) pri bazi.

Plavljenje/ Pelikl da/ne?

Prisutno jasno plavljenje na mjestima dodira, ostaju modrice. Pelikl nije prisutan, ali moguće je da samo teže odvojiv, a da je prisutan. Potrebno daljnje istraživanje.

Psihoaktivnost

Da

Slika Psilocybe Bohemica - Jan Borovička

Slika Sporulator -Image Number 110792 - Mushroom Observer – bohemica koja s dobi blijedi, te je vidljivo plavljenje

Slike cOrvuscOrax iNaturalist bohemica, različite boje, lijevo malo sliči na Panaeolus cinctulus

Slika nikolall s iNaturalist - bohemica, starija, vidljivi i listići

Slike Micelian Ciupercescu s iNaturalist bohemica, mlada, nije još pustila spore, stručak i dno stručka kao bitne odrednice za prepoznavanje

Psilocybe arcana

Stanište

Većinom raste u grupama, najčešće na listopadnom (hrast jasen, javor) ali se može naći i na crnogoričnim drvima (bor) koja su započela fazu raspadanja (tj. u poodmakloj fazi). Pronalaze se od rujna do studenog, najviše u listopadu.

Klobuk

Opisuje se kao slična Hypholomi subericauem čiju ću sliku kasnije staviti. Klobuk je većinom sa primjetnom izraslinom, vrhom na sredini, promjera od 5-7 cm, narančasto-smeđe ili tamno čokoladno-smeđe kad je mokro, sa maslinastom nijansom, a može blijedit do žuto-bijele ili prljavo bijele. Miris na rotkvicu, okus gorkast i opor.

Listići/Otrusina 

Spore su ljubičasto, smeđe. Listići su prirasli ili se malo spuštaju po stručku, zaobljeni prema unutra na točki spajanja. Listići su prvo svjetlo-smeđi, tamne sa dobi, pa su tamno-čokoladno-smeđe sa ljubičastom nijansom.

Stručak

Dugačak do 12 centimetara, deformiran (spljošten i/ili vijugav) u gornjem dijelu, obično izrazito uži prema dolje (nikada nije zadebljan na bazi, sa bijelim klasterima rizomorfa (micelijarnih niti), bijele ili blijedo ljubičaste nijanse, površina kao posipana bijelim prahom, izbrazdana pri vrhu, ostaci vela obično nisu prisutni

Plavljenje/ Pelikl da/ne?

Prisutno jasno plavljenje na mjestima dodira, ostaju modrice, te obično kad se suši. Pelikl nije prisutan, ali moguće je da je teže odvojiv, a da je prisutan. Potrebno daljnje istraživanje.

Psihoaktivnost

Da

Slika arcana – Jan Borovička, gornja slika jasno sužavanje stručka, tamno smeđi listići, blago plavljenje na stručku, dolje vrh na klobuku,

Slika gore Jan Borovička arcana, a slika dolje johnnyvanbatman iNaturalist - Hypholoma subericaeum, razlika je višebojni klobuk, ako je tada višebojan, stanište (u vlažnim šumama i močvarnim pašnjacima, stručak sličan. Hypoholoma je rijetka vrsta, kao i arcana. Kod Hypholome spore blijedo sivo-ljubičaste, kod arcane tamne, potreban oprez

Slika johnnyvanbatman – iNaturalist- ovo su Hypholoma subericaeum, te je potrebno biti oprezan i posebno se usmjeriti na stanište

Psilocybe moravica

Stanište

Većinom raste u grupama, stanište kao i ostale varijacije. Potvrđena nalazišta na više od 15 lokacija u Češkoj (Moravia), Austriji, Italiji i Slovačkoj. Zbog toga je možda moguće je pronaći u Hrvatskoj, no ne treba se previše nadati. Pronalaze se od rujna do studenog, a može se naći i tijekom ljeta, ako je hladno.

Klobuk

Može se prepoznati po slijedećoj kombinaciji, klobuk većinom bez izrasline na sredini, konveksan, ponekad ravan i hemisferičan, rub ponekad valovit pri starosti.

Listići/Otrusina 

Spore su ljubičasto, smeđe. Listići sa sivom nijansom, široki u starosti.

Stručak

Stručak sa srebrnastim ostatcima veluma na tamnoj podlozi. Čehasta zona na ostatcima prstena. (nema na drugim varijacijama serbice).

Plavljenje/ Pelikl da/ne?

Prisutno jasno plavljenje na mjestima dodira, ostaju modrice, te obično kad se suši.Pelikl nije prisutan, ali moguće je da samo nije odvojiv, a da je prisutan. Potrebno daljnje istraživanje.

Psihoaktivnost

Da

Slične vrste

Može se zamijeniti sa arcanom, ali arcana ima deformirani stručak i čokoladno-smeđe lamele sa ljubičastom nijansom.

Slike Jan Boroviček – Psilocybe moravica

Psilocybe moravica var. sternberkiana

Pronađena na dva susjedna mjesta u Češkoj i jednom mjestu u Bavarskoj. Evo malo slika, ali nećemo komplicirati još i s njom, te nemojte očekivati da ćete je pronaći, ako mislite probavati bolje povjerujte da je neka druga vrsta.

Slika Psilocybe moravica var. sternberkiana – Jan Borovička

Slične vrste za sve serbice

Najopasnije su Galerina marginata i Galerina autumnalis, koje su zapravo mikroskopskom analizom jedna vrsta Galerina marginata, te su otrovne i smrtno otrovne, pa je pažnju potrebno pažljivo usmjeriti. Slične su i Psilocybe cyanescens. **Moguće da se jave na istom staništu jedna do druge. Pregledati svaku gljivu posebno.**

Galerina marginata

Stanište

Raste ljeti i početkom jeseni na panjevima, povaljenim stablima ili otpalim granama crnogoričnog drveća i bukve. Slično stanište kao i serbica.

Slika dogbowlbookpile (iNaturalist) - stanište

Klobuk

Klobuk Galerine marginate (rebraste patuljice) je širok od 1,5 do 4 centimetara, u mladosti konveksan ili primjetno stožast, zatim otvoren, gladak, vodenast, rub vidljivo rebrast samo za vlažna vremena, slabo mesnat, za suha vremena žućkast, a u vrijeme vlažnog vremena gotovo tamnooker smeđ. Meso je tanko, gotovo da ga i nema; miris i okus po brašnu.

Slika lijevo Jeff Skrentny, stari klobuci mijenjaju boju, desno Mike Henry mladi (iNaturalist)

Slika gore Benjamin J. Dion (iNaturalist), dolje s_yang (iNaturalist), možda mislite da sam ubacio donju kao serbica, no nisam i donja je galerina

Listići/Otrusina

Listići su gusti, prirasli, ili se lagano spuštaju po stručku; nejednako dugi, uski, okeržuti. Spore su smeđe, te da mogu čovjeka i zavarati posebno onoga koji se nada u drugačiji nalaz.

Slika lijevo Zack Graham (iNaturalist), desno christineyoung (iNaturalist)

Slika bjdion (iNaturalist) - otrusina

Stručak

Stručak je visok od 2 do 6 centimetara, tanak, vitak, gladak, iznad vjenčića injast, svilenast, okerastosmeđ, na osnovi nešto proširen i paučinasto bijel, nosi tanak opnasti vjenčić. Posebno obratiti na to pažnju.

Slika lijevo Bruce Newhouse desno Benjamin J. Dion (iNaturalist)

Plavljenje/ Pelikl ne/ne

Ne plavi, nema pelikl (teško odvojiv i kod serbice). Tako da se ne treba oslanjati na to.

Otrovnost

Rebrasta patuljica sadrži alfa i beta amanitin kao i najotrovnije vrste iz roda Amanite (pupavke).

Smrtonosna, ako već do sad nije jasno tako da se ne treba zezati, koliko god bezopasno izgledale.

Slika Zach Graham (iNaturalist) mlade na oko bezopasne marginate

Slika s_young (iNaturalist), vidljv sličan klobuk, različit stručak, izboranost ruba svijetlije boje, ako ste u sumnji daljnji oprez , slika je marginate

Pholiota

Raniji naziv Galerine marginata je Pholiota unicolor, te osim toj ranijoj Pholioti, serbica može ličiti na druge Pholiote koje također rastu na ostatcima drveta, no one često rastu u raskošnim busenima i često su čehave ili po stručku ili po klobuku, te takve bez daljnjeg opisivanja možemo odmah odbaciti.

Gore lijevo billweir1, gore desno tssptrllo, dolje ktk2509 (iNaturalist) slike raznih Pholiota, vidna čehavost

Armillaria Mellea

Raste u velikim raskošnim busenovima, puno raskošnijim od Pholiote, imaju veće klobuke od 5-10 cm, klobuci su čehasti, listići su gusti, najprije bijeli, a kasnije crvenkasto naprašeni, a stručak ima prsten, sumnje ne bi trebalo biti. Jestiva je.

Slika gore grateful_pete, dolje R.J.Adams (iNaturalist), Armillaria mellea

Flammulina velutipes

Također raste većinom u raskošnim busenovima. Klobuk je mazav i vrlo ljepljiv. Ima vrlo malo mesa. Žućkastocrvene je ili narančastožute boje, u sredini tamniji. Promjera je do 10 cm. Listići su rijetki, slobodni, bijele boje. Kako gljiva stari, postaju crvenkasti. Prema kraju klobuka su uži. Stručak je 3-7 cm dug, pun, kasnije šupalj i bočno spljošten. Baršunast, pod klobukom crvenkast, prema dnu tamnosmeđ i na kraju crn. Meso je žuto, tanko, mekano, žilavo, u dršci vlaknasto i žutozelenkasto. Nema karakterističan miris i okus. No raste u zimu, te stoga ne bi trebalo biti zamjene, kao i baršunasti stručak kojeg serbica nema. Jestiva.

Slika gore nickcarrera, dolje jengungi (iNaturalist) Flammulina velutipes

PSILOCYBE CYANESCENS

Psilocybe cyanescens je usko povezan uz Psilocybe bohemicu, ima slične karakteristike i postoji mišljenje da je bohemica prvotno varijanta cyanscensa koja se proširila po Europi. Iako u Hrvatskoj po dostupnim informacijama je nema, moguće je da nije zabilježena zbog ranije navedenih razloga. Ima je u Srbiji i Austriji.

Slika Alan Rockefeller (iNaturalist) stariji i mladi Psilocybe cyanescnes, kod starijeg vidljiv valoviti rub klobuka kao bitno obilježje prepoznavanja. higrofon, zadebljani stručak pri bazi, cilindričan, vidljivi ostatci vela obojani od spora

Stanište

Često raste u velikim grupama ili zbijenim klasterima na drvenoj sječki, piljevini, ostatcima drveta, među grančicama i lišćem, uz ili na malčiranim gredicama biljaka, tamo gdje je bogato humusom. Voli supstrat bogat ligninom (organski polimer, bitna sastavnica drveta), te ne raste tamo gdje ga nema. Obično ne raste na sječki od kore drveta. Po svijetu se rapidno širi, jedna mogućnost je da je u svijetu micelij na prodajnom malču od drveta. Nema konzensusa koji je originalno stanište cyanescensa u prirodi budući da se većinom pronalazi na ranije spomenutim staništima (misli se da su crnogorične šume SAD-a ili travnate dine uz obale oceana). Javlja se kada su temperature između 10-18 °C.

Slika Alan Rockefeller (iNaturalist) vidljiva zaobljenost klobuka na nekima, higrofani klobuk, stanište

Inoculatethewest (iNaturalist) – stanište, način rasta (iNaturalist)

Ryantlodge iNaturalist – stanište (iNaturalist)

Klobuk

Ima higrofani klobuk koji varira od boje karamele do kestenasto smeđe kada je vlažno, a blijedi do blijedo oker ili žućkaste kada je suh. Obično su od 1,5-5 cm promjera, te je jedna od najbitnijih odrednica je valovitost ruba koja je prozirno iscrtana.. Miris i okus na brašno. Površina glatka i viskozna od ponekad odvojivog pelikla.

Slika gore lijevo i sredina lijevo Alan Rockefeller – karamel boja klobuka, dolje lijevo ryantlodge - oker po suhom, desno Chantel Walker - kestenasto smeđ po vlažnom (iNaturalist)

Stephen James McWiliam valovitost klobuka, higrofanost (iNaturalist)

Listići/Otrusina

Listići su slobodni (blago povezani sa stručkom pri vrhu) ili prirasli uz stručak, ali zaobljeni prema unutra kod točke dodira. Široki, bliski do srednje blizu. Cimetno-smeđe boje koja postaje kao jako zadimljeno smeđa, a rubovi ostaju svjetliji. Spore su svjetlo-smeđe do tamno ljubičaste u zrelosti sa svjetlijim rubom.

Slika Efthimios – slobodni listići cimet smeđe boje (iNaturalist)

Slika Alan Rockefeller - slobodni listići koji postaju zadimljeno smeđi (iNaturalist)

Slika Chantel Walker listići malo prirasli uz stručak, bijeli rub listića (iNaturalist)



Slika Efthimios - otisak spora (iNaturalist)

Stručak

Dugačak od 2-8 cm, a širok 2.5-5mm. Obično zaobljen i ponešto zadebljan pri bazi. Krut, ali i ne nesavitljiv. Površina svilenkasta, pretežito bijel, prekriven strijama i obično sa dugačkim bijelim rizomorfima koji izlaze oko baze stručka. Nema prstena, ali mladi primjerci imaju paučinasti veo koji može ostaviti prstenasti otisak u zrelosti.

Slika Alan Rockefeller, stručak bijel, vidljivo zadebljanje pri bazi, ostatak vela (iNaturalist)

Stephen James McWiliam – stručak ponekad tamnije boje, ali klobuk jasno cyanescens (iNaturalist)

Plavljenje/ Pelikl da/ne?

Prisutno jasno plavljenje na mjestima dodira, ostaju modrice, te obično kad se suši. Moguće plavljenje na svim dijelovima gljive, uključujući i klobuk i listiće. Također bitna odrednica. Pelikl nije prisutan tj. prisutan je ali je teško odvojiv, te se ne treba oslanjati na njega.

Slika Ann Goddard – plavljenje (iNaturalist)

Psihoaktivnost

Umjereno do visoko potentna vrsta.

Slika lijevo Sigrid Jakob – suhe, desno Anthony Rasonsky – veličina u ruci (iNaturalist)

Slika Drew T. Henderson – da li ih možete sve pronaći na slici (iNaturalist)

Slične vrste

Makroskopski slična vrstama Psilocybe azurescens, serbica, bohemica, subaeriginosa, cyanofibrillosa i mairei. Od navedenih, a ranije nespomenutih vrsta u Europi se po Guzmanu samo pronalazi mairei, dok Stamets navodi da ih ima samo u Sjevernoj Africi. Njihove opise možete pronaći u drugim izvorima ako pronađete gljivu koja nema sve odrednice cyanescensa, a mislite da bi mogla biti Psilocybe, plavi ili ima neke druge osobine Psilocybe.

Također sliči Galerini marginati.

Moguće da se jave na istom staništu jedna do druge. Pregledati svaku gljivu posebno.

Za razlike između marginate i cyanescens (i ostalih Psilocybe vrsta sa drveta) ponovno se referirati na raniji odjeljak sa marginatom.

- ♠ Boja spora: Galerine imaju hrđasto-smeđe spore, dok Psilocybe imaju crno-smeđe ili ljubičasto smeđe
- ♠ Plavljenje: Cyanescens plavi, dok Galerina ne, no Galerina može pocrniti gdje se dira, što se može interpretirati kao plavljenje.
- ♠ Veličina: Galerine su obično manje nego Psilocybe, no moguće je preklapanje u veličini
- ♠ Klobuk: kod cyanescens klobuk je valovit

Sve je to jako blizu tako da je oprez preporučen.

Pholite
Moguća je i zamjena za Pholiote, no one su obično čehave, te se može referirati na prethodni odjeljak sličnosti Psilocybe serbice sa Pholiotama.

Tubaria sp.

Gljive male do srednje veličine s klobucima u rasponu boja od blijedo ružičasto-smeđe do crvenkasto-smeđe, i često s ostacima djelomičnog vela na rubu. Gljive plode na trulom drvetu, rjeđe u tlu. U rodu nema vrsta koje se preporučuju za konzumaciju

Slika Christian Schwarz - Tubaria

Slika Damon Tighe – Tubaria punicea – prisutna valovitost, ali boja skroz kriva

Slika Stacie Wolny – Tubaria furfuracea, čehav rub, boja donekle slična, gore lijevo – aarongunnar – listići, žućkastiji nego kod mlade cyanescens, ako u sumnji, koje ne bi trebalo biti – uzeti otisak spora

Slika Reiner Richter - Tubaria rufovulva, boja kriva i kod stručka i kod klobuka

Slika Alan Rockefeller – Tubaria furfuracea na ovoj slici sličniji Panaeolus cinctulus kojeg ćemo spominjati slijedećeg

PANAEOLUS

OPĆENITE KARAKTERISTIKE

Iako proučavanje psihoaktivnosti gljiva mora započeti sa rodom Psilocybe s njim ne treba završiti. Drugi najpoznatiji rod u psihoaktivnim gljivama (ako nije Amanita koje se nećemo posebno doticati) je zasigurno Paneolus. U uvodu sam već zapravo spominjao određene vrste ovoga roda i nedostatak točne određenosti prisutnosti psihoaktivnih tvari kod roda Panaeolus. Božac naziva sve gljive ovoga roda halucinogene, za što znamo da nije točno. Njemu je psihoaktivan Panaeolus spinchteris, rickenii (danas acuminatus) i dr. koje u drugim literaturama ne nazivaju tako. Unatoč tome što mnoge gljive iz ovoga roda nisu psihoaktivne proći ćemo psihoaktivne, a i neke koje liče na psihoaktivne. Već smo spomenuli Panaeolus papilionaceus, sphinctrinus, semiovatus, (panaeolina) foenisecii, acuminatus. Obično su nejestive, te sve vrste ovoga roda sadrže derivative serotonina, ali ne svi sadrže kao što sam već napomenuo psilocibin i psilocin.

Stanište

Većinom rastu na izmetu i travnatim površinama. Slične Panaeolusu (osim Psilocybe) su i Psathyrella koje rastu na drvetu ili na tlu bogatom ligninom.

Spore

Gljive roda Panaeolus imaju crne spore (Panaeolina ima smeđe). Ime Paneolus na grčkom znači „raznobojan“ ili „šarolik“ što se odnosi na točkaste listiće gljive. O čemu govorim vidjet ćemo na primjeru kasnije. Listići ovih gljiva su crni ili sivi i imaju pjegav, točkast ili „mutan“ izgled, uzrokovan načinom na koji tamne spore sazrijevaju zajedno u sićušnim skupinama na površini listića; različite skupine potamne u različito vrijeme.

Plavljenje / Pelikl

Gljive ovoga roda tipično ne plave osim Panaeolus cyanescens. Nemaju pelikl.

Koje postoje u Hrvatskoj? Koje ćemo proučavati?

Božac govori da u Hrvatskoj postoji Panaeolus cinctulus (subbalteatus), fimicola i Panaeolina foenisecii (smatra ih otrovnim). Po Guzmanu u Europi još postoji ater (smatra se za istu vrstu kao i Panaeolus fimicola), olivaceus (ranije castaneifolius), te Panaeolus (ranije Copelandia) cyanescens. Guzman spominje i Panaeolus retirugis kojeg se smatra za istom vrstom kao i papilionaceus, koje Stamets smatra neaktivnima. Pošto smo papilionaceus već spominjali retirugis nećemo posebno obrađivati. Počet ćemo upoznavanje sa cinctulus, a onda sa ostalima potvrđenima fimicola i foenicecii (ako vam se sve izmještalo; ostaju još i olivaceus i cyanescens koje ćemo obraditi kako bi možda potaknuli identifikaciju u Hrvatskoj).

PANAEOLUS CINCTULUS (SUBBALTEATUS)

Stanište (rijetko)

Panaeolus cinctulus je kozmopolitska vrsta koja raste pojedinačno, u skupinama ili u grudama (gusto skupljena) na hrpama komposta, dobro pognojenim travnjacima i vrtovima, a rijetko izravno na konjskom izmetu. Raste od proljeća do jeseni. Obilno raste nakon kiše.

Slika gore -Dustin Dodson – stanište – travnjak, dolje - Alan Rockefeller – rastu u „grudama“ na hrpama komposta (iNaturalist)

Klobuk

Naraste od 1,5–5,5 centimetara, hemisferičan do konveksan kad je mlad do široko ispupčen ili ravan u zrelosti, gladak, higrofan, upadljivo cimetno-smeđe boje kad je vlažan, čađavo crn kad je mokar što nestaje kada se gljiva potpuno osuši. Vanjski pojas je obično tamniji. Meso je cimet smeđe do krem boje i tanko. Subbalteatus „sub“- „ponešto“ i „balteat“ („opasan“- ima pojas, opasač), što se odnosi na tamni vanjski pojas.

Slika lijevo - zeaya-winter – široko ispuppen ravni klobuk s jasnim tamnim pojasom, stanište u travi, desno gore – Tim Sage– hemisferičan mladi klobuk cimetno-smeđe boje, slabije vidljiv tamni pojas, desno dolje Alan Rockefeller, malo osušeni klobuci (iNaturalist)

Listići/Otrusina

Listići su međusobno blizu, prirasli ili samo malo povezani sa stručkom krem boje kad je gljiva mlada, kasnije mrljasto prljavo smeđa, a zatim čađavocrna. Rubovi listića su bijeli i blago obrubljeni, ali postaju crnkasti kada su potpuno zreli. Otrusina sjajno crna.

Slika gore lijevo – Tyson Hobbs – krem listići, goro sredina– serablondi - prljavo smeđi, dolje - BJ Stacey - čađavo crni, sa bijelim obrubom, desno - shroomydan– crni otisak spora (iNaturalist),

Stručak

Stručak je 2-10 cm dug, 2-9 mm širok, jednak cijelom dužinom ili sužen na krajevima, crvenkastosmeđ do bjelkast, kao posipan prahom, šupalj, bez ostataka vela, uzdužno bijelo-fibrilozna i bijelo-praškasta, izbrazdan na vrhu ili prema dolje cijelom dužinom stručka, baza stručka i micelij povremeno obojeni plavo.

Slika lijevo BJ Stacey – crvenkasto-smeđ stručak, desno gore – serablondi – bjelkast pri vrhu, desno dolje Tyson Hobbs baza stručka obojana plavo (iNaturalist)

Slika Eric henley – stručak kao posipan prahom

Plavljenje/ Pelikl ne/ne

Nije prisutno plavljenje osim pri bazi stručka, kao na slici gore. Nema pelikl.

Psihoaktivnost

Slabo do umjereno potentna vrsta.

Slične vrste

Na izmetu biljojeda raste slična vrsta Panaeolus semiovatus koja naraste veća, bjelkaste je boje stručka i klobuka te na stručku ima mali vjenčić. Nju smo već spominjali kada smo pričali o Psilocybe semilanceata. Nije psihoaktivna, te je sličan i Panaeolus acuminatus koji naraste manji, ima ušiljeno konični klobuk koji je tamnosmeđe ili riđesmeđe boje, a i Panaeolus papilionaceus i sphincteris koje smo također spominjali. Nijedan od njih nije psihoaktivan, niti imaju tamni pojas. Za razlike se možete referirati na raniji odjeljak, a tu ćemo dodati još dosad nespomenute vrste. Slična je i Panaeolus fimicola koju ćemo obraditi slijedeću.

Psathyrella pseudovernalis/ Psathyrella spadiceogrisea

Ove dvije vrste psathyrella su po makroskopskim karatkeristikama jednake, osim što je spadiceogrisea veća (a obje u rasponu veličine kao cinctulus). Obje vrste Psathytrelle imaju smeđe klobuke, pramenove materijala vela duž ruba klobuka, tamno smeđe otiske spora i bijele stabljike koje su lomljive, nisu plave na bazi stručka, dok kod cinctulusa stručak nije tako lomljiv, nemaju veo, te po suhom Psathyrelle vremenu mogu imati taman pojas oko ruba klobuka, koji nije pravilan kao kod cinctulusa. Još je veća nevolja što su spore tamne boje, grimizno smeđe do crno smeđe. Listići Psathyrelle su isprva bjelkaste do blijedosmeđe boje, a zatim postaju tamnosmeđe, dok su cinctulus krem boje kad je gljiva mlada, kasnije mrljasto prljavo smeđa, a zatim čađavocrna, a zapravo slične. Psatyhrelle rastu do proljeća do ljeta (a cinctulus do jeseni), spadiceogrisea raste u blizini panjeva ili uz raspadajuće korijenje listopadnog drveća (a cinctulus po travnjacima), a pseudovernalis u šumama, uz rijeke ispod trske i na pjeskovito-ilovičastom tlu. Naziv roda Psathyrella potječe od latinske riječi psathyrus (mekano, krhko), zbog malih i krhkih gljiva. U proljeće i ljeto oprez. Stavljam samo slike gdje su velike sličnosti, inače nas te gljive ne zanimaju.



Slika lijevo Michael Kuo(mushroomexpert.com)spore Psyatherelle, sredina pucak – spore pseudovernalisa, a desno shroomydan (iNaturalist) cinctulus, dosta slično

Slika lijevo yaiur - spadiceogrisea, desno pucak - pseudovernalis. Kod pseudovernalisa vidljiv ostatak prstena, što će biti vidljivo i na slijedećoj slici (iNaturalist)

Slika Dustin Dodson Psathyrella pseudovernalis lakše ih je prepoznati kada se ne suše slično kao cinctulus (iNaturalist)

Slika dontgiveafungus – klobuk spadiceogrisea, mala slika zeaya-winter klobuk cinctulus (iNaturalist)

Psathyrella piluliformis (hydrophila)

Neki kažu jestive gljive iz porodice Psathyrellaceae. Klobuk je svijetložute boje, u početku polukuglast, kasnije raširen i tupo ispupčen u sredini, gladak, vlažan, za kišnog vremena rub je vodenast i tamnosmeđ, rebrast, velik 2-5 cm. Listići su gusti, tamnosmeđe boje, oštrica je svjetlija. Na oštrici posjeduju sitne kapljice vode. Stručak je bjelkast, valjkast, vijugav, šupalj, često zakrivljen i u osnovi je spojedn s drugim stručcima, visok je 5-12 cm, debeo 3-6 mm. Meso klobuka je blijedosmeđe, meso stručka je bijelo, krhko, bez izraženog mirisa i okusa. Spore su ovalne, glatke, otrusina je purpurno smeđa. Stanište Raste busenasto i u skupinama ljeti i ujesen. Staništa su vlažne listopadne šume, raste na i oko panjeva i na otpalim listovima. Obratiti pozornost na stanište.

Slika brandao - Psathyrella piluliformis (iNaturalist)

Slika alposylaev - Psathyrella piluliformis – stanište (iNaturalist)

PANAEOLUS FIMICOLA (ATER)

Slika Ryan Patrick (iNaturalist)

Slika Jed (Jed79SC) (Mushroomobserver)

Stanište

Raste od kasnog proljeća, do sredine jeseni (Božac kaže potkraj ljeta) u skupinama na travi na pognojenim tlima, uz ceste, te na izmetu.

Slika Nicolas Schwab (iNaturalist) – stanište u travi

Klobuk

Širok od 1,5 do 3,5cm; u početku polukuglasto koničan, kasnije koveksno zvonast, pa otvoren, tupo ispupčen, vodenast; po vlažnom vremenu tamnosmeđ, po suhom izblijedi, ali zadrži vodenasti obruč uz rub, jedino kod starih plodišta malo narebran. Meso bež, lomljivo.

Slika lijevo – CarmodyCaramel – klobuci, desno - Peachy steve (iNaturalist)

Slika Mario Vega Pérez, identificiran kao Panaeolus ater, tamniji po vlažnom vremenu, mala slika Icyurmt (Mushroomobserver)

Slika Nicolas Schwab (iNaturalist) – Panaeolus ater

Listići/Otrusina

Listići su sivosmeđi (sivomaslinasti) do crni, trbušasti, u početku maljavi, blizu, oštricu svjetlija. Spore sivocrne.



Slike – CarmodyCaramel (iNaturalist)

Slika Dustin Dodson , tamni listići (iNaturalist)

Stručak

Visok od 5-10 cm, valjkast, tanak, blago zadebljan pri bazi, šupalj, lomljiv, prljavo-bijel do boje gline, s dobi smeđi prema bazi, gladak, sitno maljav pri vrhu, bez prstena.

Slike – CarmodyCaramel (iNaturalist)

Slika Dustin Dodson (iNaturalist)

Plavljenje/ Pelikl ne/ne

Kao i skoro svi Panaeolusi ne plavi i nema pelkl.

Psihoaktivnost

Neaktivno do slabo psihoaktivna vrsta.

Slične vrste:

Drugi Panaeolusi, a posebno je sličan cinctulus. cinctulus nikada nije tako taman kao fimicola, iako su po suhom dosta slični, ali cinctulus ima jasniji pojas.

Slične su i druge ranije navedene vrste koje liče i na cinctulus.

Komentar
U nas jako zanimljivog imena đubretarski smetištar.

PANAEOLUS (PANAEOLINA) FOENISECII

Danas se Panaeolina Foenisecci više ne smatra aktivnom vrstom no zbog sličnosti s drugima psihoaktivnim vrstama (posebno cinctulusom) ovoga roda će se bliže spomenuti kako ne bi bilo zamjene. Panaeolina znači da liči na Panaeolus.

Slika Alan Rockefeller (iNaturalist), vidljiv tamni pojas kao cinctulus

Slika Nicolas Schwab (iNaturalist)

Stanište

Raste skupno na travi potkraj ljeta na pognojenom tlu, po vrtovima, parkovima i uz cestu, ubrzo nakon košnje.

Slika Nicolas Schwab (iNaturalist) - stanište

Klobuk

Širok 2,5 cm do 3,5 cm, prilično mesnat, zvonoliko otvoren, tup, lomljiv, gladak, površina neravna, boje čađi ili sivo-smeđasto-riđ, izgled vodenast, po suhom vremenu izblijedi i malo kružno ispuca. Meso tamnosmeđe, blijedo krem ili ružičasto, tanko, miris nije izražen, okus blag.

Slika localpariah, mala slika lijevo Simon Nicolas, mala slika desno Axel jmad 951 (iNaturalist), različite boje klobuka

Slika Drew T Henderson, mala slika quetalquetzal (iNaturalist)

Listići/Otrusina

Rijetki, široko vretenasti, prirasli uz stručak, ružičastomaslinasti ili blijedosmeđi, oštrica bjelkasta. Otrusina smeđe-crna (tamno orah smeđa). Božac navodi da je grimiznocrvena (?).

Slika cloister, desno Danny Newman (iNaturalist), svijetliji listići , ružičastomaslinasti i blijedosmeđi

Slike konelix (iNaturalist), kasnije tamniji listići

Slika bjoerns, mala slika Danny Newman (iNaturalist)



Slika Drew T Henderson (iNaturalist), boja otrusine tamna, smeđe-crna

Stručak

Visok od 5-8 cm, šupalj, valjkast, često zavijen, gladak, blijede smeđe boje mesa, na osnovi bijeli ostatci ovoja.

Slika teigens (iNaturalist) – stručak, jasno valjkast, smeđe boje, gladak i zavijen

Slika JC vdM (iNaturalist)– stručak , bijeli ostatci ovoja na bazi

Slika jordanjacobs (iNaturalist) – stručak, bijeli ostatci ovoja na bazi, a na gljivi desno i kod klobuka bijelo

Plavljenje/ Pelikl ne/ne

Kao i skoro svi Panaeolusi ne plavi i nema pelkl.

Psihoaktivnost

Ne smatra se psihoaktivnim.

Slika Danny Neman (iNaturalist) – različiti oblici foenisecii

Slične vrste

Može se zamijeniti za Panaeolus cinctulus ili Panaeolus olivaceus, koji imaju sjajno crne spore To je vjerojatno razlog zbog kojeg se nekada može naći podatak da je foenisecii psihoaktivna, kao i za Conocybe apala, Marasmius oreades, Psathyrella candolleana, and Psathyrella gracilis. Conocybe smo obradili, a ostale ćemo poslije slijedeće gljive.

PANAEOLUS OLIVACEUS (CASTANEIFOLIUS)

Slika Jerry Cooper

Stanište

Raste grupno ili pojedinačno na bogatim travnatim područjima, od kasnog ljeta do prosinca.

Slika jbushman iNaturalist – stanište u travi

Klobuk

Od 1 do 4 cm. Prvo izrazito zvonasti, zatim subhemisferalni do konveksni, postaju široko konusni, ne šire se u potpunosti, uvijenog ruba kad su mladi, tamno dimno-sivkasti do tamno cimetastog, sušeći se do slamnatožute ili blago maslinastosive boje, ostajući crvenkastosmeđi prema sredini, higrofan, gladak, ponekad isprugan ili fino naboran, meso debelo i čvrsto.

Slika lijevo Alan Rockefeller, desno karlincubus – klobuci, različitog izgleda, lijevi dimno-sivkasti, desno higrofan(iNaturalist)

Slika Alan Rockefeller, mala slika Guillaume Clin - klobuci, različitog izgleda (iNaturalist)

Listići/Otrusina

Prirasli ili samo malo spojeni sa stručkom, međusobno blizu, tanki, blijedi, pjegavi, blago maslinastozeleni, s dobi postaju tamnoljubičasti sivo-crni, rub bjelkast.

Slika Christian Schwab, mala slika laughingjims (iNaturalist) – različiti listići i klobuci ovisno o zrelosti

Stručak

Od 4 do 6 (7.5) cm visok, oko 3— 4(6) mm širok, jednak skoro cijelom dužinom, blago sužen pri bazi, šupalj, lomljiv, lomljiv blago izbrazdan, bez ostatka vela, koprene. Sivkast do oker, žutosmeđ ili ljubičast pri bazi.

Slika Guillaume Clin, male slike Alan Rockefeller (iNaturalist) – stručak različitosti

Slike rainerburkard (iNaturalist) – stručak, gore vidljivo izbrazdan

Plavljenje/ Pelikl ne/ne

Kao i skoro svi Panaeolusi ne plavi i nema pelkl.

Psihoaktivnost

Latentno sadrži psilocibin i kad se može izmjeriti jako slabe koncentracije. Ponekad psihoaktivan.

Slične vrste

Može se zamijeniti za Panaeolus cinctulus ili Panaeolus foenesecii, kao i za ostale vrste koje su slične njima.

Merasmius oradeus

Glavna razlika su svijetli listići, blijedo smeđi, a otisak spora je bijel. Stručak je bijel ili žućkast, a na vrhu klobuka ima ispupčenje. Nema velike opasnosti jer je Merasmius oradeus jestiv, i to jako ukusna gljiva.

Slika David Whyte (iNaturalist) - Merasmius oradeus

Slika Fabio Mauri (iNaturalist) - Merasmius oradeus

Slika balnarringcubs (iNaturalist) - *Merasmius oradeus*

Psathyrella candolleana

Psathyrellu candolleana (zapravo Candolleomyces candolleanus) smo već spominjali kod semilanceate, te se može reći da je sličnija Panaeolusu nego semilanceati, ali nije ni toliko slično.

Slika miro, iz ove perspekive možda slični, ali rastu oko drveta, ili na korijenju (iNaturalist)

Slika Christian Schwab, spore su ljubičasto smeđe, klobuk je neravan i radijalno asimetričan, što je karakteristika ove vrste (iNaturalist)

Psathyrella gracilis

Raste oko trulog drveta, lisitći su crvenkasti, a otisak je ljubičasto-smeđ. Makroskopski dosta slična, ali ovo ranije spomenute su razlike.

Slika Sara Fatimah, mala slika Daniel Josefchak (iNaturalist) - Psathyrella gracilis

Slika Christian Schwarz(iNaturalist) - Psathyrella gracilis

Komentar

Postoji i Panaeolina castaneifolia koja se razlikuje od Panaeolusa jer ima tamno smeđe spore, te postoje određene konfuzije da li je to ista vrsta sa Panaeolusom, ali tu ćemo raspravu ostaviti znanstvenicima. Samo ću još napomenuti da je Panaolina castaneifolia široko rasprostranjena, ali rijetka.

PANAEOLUS CYANESCENS

Najpotentniji od Panaeolusa. Nije pronađen u Hrvatskoj ni kod susjeda (osim Italije), ali ih ima u Europi. Ranije je bila u rodu Copelandia, a kako to kod gljiva ide prebačena u Panaeolus. Kako bi potaknuo eventualnu identifikaciju navodim je.

Slika gore Alan Rockefeller – u različitim fazama zrelost, dolje yas17 – na staništu (izmetu) (iNaturalist) – Panaeolus cyanescens

Stanište

Raste pojedinačno ili u skupinama na izmetu po pašnjacima i poljima. Većinom se nalazi u tropskim i subtropskim zonama. Makar Guzman navodi da ih ima i u Italiji i Austriji.

Slika Aidan Marshall – stanište, vidljive pukotine na klobuku (iNaturalist)

Klobuk

Od 1,5 do 4 cm u promjeru, suh, isprva hemisferičan, širi se do zvonastog do konveksnog, s uvijenim rubom kad je mlad. Mladi klobuci počinju svijetlosmeđe boje, a u zrelosti blijede u prljavobijele ili svijetlosive, ponekad sa žućkastim ili smećkastim tonovima. Često razvija pukotine po suhom vremenu, blago je higrofan, postaje zelenkast ili plav na mjestima oštećenja. Okus i miris po brašnu.

Slika James Lennon (iNaturalist) - bijeli klobuci

Slika GeRa_MaChaDo (iNaturalist) - svijetlosivi klobuci, prisutna ispucanost

Slika rh (iNaturalist) – tamniji klobuci

Listići/Otrusina

Široko prirasli ili blago pripojeni uz stručak, međusobno blizu, počinju sivi i postaju crni kako spore sazrijevaju. Listići su pjegavi, rubovi bijeli.

Slike Aidan Marshall, (iNaturalist), bijeli rubovi, listići pjegavi

Slika Steven DM, mala slika ktodges (iNaturalist) – različite boje listića

Slika Ernesto Valenzuela (iNaturalist) - otrusina

Stručak

Od 7 do 12 cm duljine i 2 do 3 mm debljine, ili svuda jednako debeo ili blago zadebljan pri bazi, kao posipane bijelim prahom, boje poput klobuka, plave mrlje na mjestima gdje su nagnječene.

Slika lijevo rh -mlade kao prahom posipane, desno Alan Rockefeller – plave po stručku (iNaturalist)

Slika Tristan Packard (iNaturalist) - stručak

Slika Edmundo Gómez Venancio (iNaturalist) - stručak

Plavljenje/ Pelikl da/ne

Prisutno plavljenje (plavo-zeleno) gdje je gljiva oštećena.

Slika lijevo jethrobodine, desno shibbo (iNaturalist) – jasno vidljivo plavljenje

Psihoaktivnost

Umjereno potentna vrsta.

Slika Tristan Packard (iNaturalist) – skriveni cyanescens

Slične vrste

Pholiotina rugosa

Navode da je rugosa je izgledom slična Panaeolus cyanescens, tako da oprez jer su u rugosi prisutni amatoksini koji mogu biti smrtonosni. Mojem oku nisu toliko slične, rugosa ne raste na izmetu, te ima prsten na stručku, te su kod Pholitine rugose spore od hrđavo-narančaste do smeđe boje, dok su kod Panaeolusa to crne ili tamno-ljubičaste.

lijevo klara1 ruogsa, desno Pilgrim 218, veće sličnost po suhom vremenu (desno), prisutan prsten, moguće je da prsten otpadne tako se ne treba usmjeriti samo na prsten, ali se vidi drugačije stanište (iNaturalist)

Slika laughingjims Pholiotina rugosa (iNaturalist)

Slična je i Tubaria furfuracea, ali ona nije otrovna, iako je također higrofana raste na sječki, a ne na izmetu. Tubarie su također delikatnije i nisu savitljive kao Panaeolus. Spore kod Tubarie su svjetlo narančaste do smeđe. Slika ima kod Psilocybe cyanescens.

Postoji i sličnost sa Galerinom marginata koja je kako sam već nekoliko puta napomenuo smrtonosna. Galerina ima hrđavo narančaste spore i obično se nalazi na raspadajućem drvetu. Također Galerina ima crne ozljede kada se s njom manipulira, dok Panaeolus ima plavo zelene.

Panaeolus antillarum. Po makroskopskim karakteristikama su dosta slične i dosta dugo se mislilo da su ista vrsta, no Panaeolus antillarum nije psihoaktivan. Razlike su što antillarum ima deblji klobuk i svjetlije je boje, te ne plavi.

Slika lijevo lizziepop Panaeolus antillarum*, desno Carolina Can (iNaturalist) – slično bijele boje, ali ne plavi*

Slika kiefer (iNaturalist) - šest sa bijelim klobukom su Panaeolus cyanescens, dok su ostali sa smeđim klobukom navjerojatnije Panaeolus papilionaceus.

Literatura

Knjige i članci:

Borovička J. (2008): The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe – an identification key. – Czech Mycol. 60(2): 173–192.

Božac Romano (1984). Gljive: 600 Gljiva naših krajeva, Mladost, Zagreb.

Božac Romano (2005). Enciklopedija Gljiva, Školska Knjiga, Zagreb.

Guzmán, Gastón & Allen, John & Gartz, Jochen. (1998). A Worldwide geographical distribution of the Neurotropic Fungi, an analysis and discussion. Ann Mus Civ Rovereto. 14.

O'Reily, Pat (2011). Fascinated by Fungi, First Nature.

Stamets, Paul (1996). Psilocybin mushrooms of the Words. An Identification Guide, Ten Speed Press, Berkeley.

Stijve, T i Kuyperm Th. W. (1985) Occurrence of Psilocybin in Various Higher Fungi from Several European Countries, Planta Med 1985; 51(5): 385-387.

Internet stranice:

https://www.commanster.eu

https://dreamstime.com ID223634447 Zanfira (slika potentne, nepotentne gljive)

https://www.iNaturalist.org

https://www.ohuobach.cz

https://www. fungoceva.it

https://healing-mushrooms.net

https://www.shroomery.org

https://mushroomobserver.org

https://www.pijanitvor.com

https://www.plantea.com.hr

https://www.reddit.com

httpis://www.waarneming.nl

https://www.wikipedia.org

Slike koje su preuzete su kada je bilo potrebno prilagođene kako bi stale u okvir knjige, te kako bi se jasnije ilustriralo što se želi njima prikazati.