

Københavns Universitet

LinAlgDat - Project B

Victor Vangkilde Jørgensen - kft410
kft410@alumni.ku.dk
Hold 13 Mach

10. maj 2025

Indhold

1 Opgave

1.a

Vi kan aflæse M_a til:

$$\begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ 0 & (a-1) & -1 \\ 0 & 2 & (a+2) \end{bmatrix}$$

1.b

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & -1 & 0 \\ 0 & a-1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & a+2 & 0 \end{array} \right] \cdot \frac{1}{a-1} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 2 & a+2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2+a}{a-1} & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\cdot \frac{a-1}{a^2+a}} \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{+r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{+r_3 \cdot \frac{1}{a-1}} \left[\begin{array}{ccc|c} a & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{+r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\cdot \frac{1}{a}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

T_a er altså injektiv.

T_a er surjektiv, da vi har 3 vektorer. T_a er dermed bijektiv, da den både er injektiv og surjektiv.

Vi bestemmer nu T_a^{-1} :

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} a & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & a+2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \cdot \frac{1}{a-1} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} a & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 & \frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 2 & a+2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-2r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} a & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 & \frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2+a}{a-1} & 0 & -\frac{2}{a-1} & 1 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\cdot \frac{a-1}{a^2+a}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} a & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{a-1} & 0 & \frac{1}{a-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{a-1} & \frac{a-1}{a^2+a} \end{array} \right] \xrightarrow{+r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} a & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a+1} & \frac{1}{a+1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a+2}{a^2+a} & \frac{1}{a^2+a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{a^2+a} & \frac{a-1}{a^2+a} \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\cdot \frac{1}{a}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2+a} & \frac{1}{a^2+a} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a+2}{a^2+a} & \frac{1}{a^2+a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{a^2+a} & \frac{a-1}{a^2+a} \end{array} \right] \end{aligned}$$

1.c

Vi opstill igen T_a , hvor $a = -1$:

$$\begin{aligned}
& \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1+2 & 0 \end{array} \right] \text{reducer} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightsquigarrow \\
& \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} +r_3 \\ +r_3 \end{array} \rightsquigarrow \\
& \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} \cdot(-1) \\ \cdot(-\frac{1}{2}) \end{array} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} -r_2 \\ \rightsquigarrow \end{array} \\
& \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

1.d

1.e