

Rappel de cours

Definition 1. La relation xRy est une relation d'équivalence sur l'ensemble E ssi:

- $\forall x \in E, xRx$
- $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow yRx$
- $\forall x, y, z \in E, xRy \wedge yRz \Leftrightarrow xRz$

Exercice 1

Exercice 1.1

La relation R n'est pas une relation d'équivalence car $(4, 4) \notin R$.

Si on ajoute le couple $(4, 4)$ à la relation R alors R est une relation d'équivalence car

- $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \in R$
- $(1, 2) \Leftrightarrow (2, 1), (3, 4) \Leftrightarrow (4, 3)$
- $(1, 1) \wedge (1, 2) \Leftrightarrow (1, 2), (1, 2) \wedge (2, 1) \Leftrightarrow (1, 1), (1, 2) \wedge (2, 2) \Leftrightarrow (1, 2), \dots$

Exercice 1.2

La liste des classes d'équivalence est $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}, \{(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$.

Exercice 2

Exercice 2.1

- $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a, b)R(a, b) \Leftrightarrow a^2 + b^2 = a^2 + b^2$ est vrai
- $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, ((a, b)R(c, d) \Leftrightarrow (c, d)R(a, b)) \Leftrightarrow (a^2 + b^2 = c^2 + d^2 \Leftrightarrow c^2 + d^2 = a^2 + b^2)$ est vrai car l'égalité est symétrique
- $\forall a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}, ((a, b)R(c, d) \wedge (c, d)R(e, f) \Leftrightarrow (a, b)R(e, f)) \Leftrightarrow (a^2 + b^2 = c^2 + d^2 \wedge c^2 + d^2 = e^2 + f^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = e^2 + f^2)$ est vrai car l'égalité est transitive

Exercice 2.2

La relation R est l'ensemble des points du cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{a^2 + b^2}$.

Exercice 2.3

Pas compris $|R^2 \setminus \mathbb{R}$.

Exercice 3

Exercice 3.1

- $\forall x \in \mathbb{R}, xRx \Leftrightarrow |x| = |x|$ est vrai
- $\forall x, y \in \mathbb{R}, (xRy \Leftrightarrow yRx) \Leftrightarrow (|x| = |y| \Leftrightarrow |y| = |x|)$ est vrai car l'égalité est symétrique
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (xRy \wedge yRz \Leftrightarrow xRz) \Leftrightarrow (|x| = |y| \wedge |y| = |z| \Leftrightarrow |x| = |z|)$ est vrai car l'égalité est transitive

Exercice 3.2

- $\forall x \in \mathbb{R}, xRx \Leftrightarrow e^x = e^x$ est vrai
- $\forall x, y \in \mathbb{R}, (xRy \Leftrightarrow yRx) \Leftrightarrow (e^x = e^y \Leftrightarrow e^y = e^x)$ est vrai car l'égalité est symétrique
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (xRy \wedge yRz \Leftrightarrow xRz) \Leftrightarrow (e^x = e^y \wedge e^y = e^z \Leftrightarrow e^x = e^z)$ est vrai car l'égalité est transitive

Exercice 4

Exercice 4.1

- $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a, b)R(a, b) \Leftrightarrow ab = ba$ est vrai car la multiplication est commutative
- $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, ((a, b)R(c, d) \Leftrightarrow (c, d)R(a, b)) \Leftrightarrow (ad = bc \Leftrightarrow cb = da)$ est vrai car l'égalité est symétrique et la multiplication est commutative
- $\forall a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}, ((a, b)R(c, d) \wedge (c, d)R(e, f) \Leftrightarrow (a, b)R(e, f)) \Leftrightarrow (ad = bc \wedge cf = de \Leftrightarrow af = be)$ est vrai car $a = \frac{bc}{d}$, donc $af = \frac{bc}{d}f$ mais $cf = de$ donc $af = \frac{bde}{d} = be$.

Exercice 4.2

$(p, q)R(x, y) \Leftrightarrow py = qx$ avec (p, q) premiers entre eux. Le seul couple est $x = np$ et $y = nq$. Donc la relation représente les couples $\forall n \in \mathbb{N}^*, (np, nq)$ avec (p, q) premiers entre eux.

Exercice 5

Exercice 5.1

- $\forall P \in \mathbb{R}, PRP \Leftrightarrow P - P$ est un multiple de X est vrai car 0 est un multiple de tous les nombres ($0 = 0 \cdot X$)
- $\forall P, Q \in \mathbb{R}, (PRQ \Leftrightarrow QRP) \Leftrightarrow (P - Q = kX \Leftrightarrow Q - P = k'X)?$ est vrai en prenant $k' = -k$ car $Q - P = -(P - Q) = -kX$
- $\forall P, Q, S \in \mathbb{R}, (PRQ \wedge QRS \Leftrightarrow PRS) \Leftrightarrow (P - Q = kX \wedge Q - S = k'X \Leftrightarrow P - S = k''X)?$ est vrai $P - S = (P - Q) - (Q - S) = kX + k'X = (k + k')X$

Exercice 5.2

$PRP(0) = P - P(0)$ mais $P(0)$ est le polynôme de degré 0, donc $P - P(0)$ est un polynôme avec le degré 0 égale à 0. On peut donc le factoriser par X . Par conséquent $P - P(0) = X \cdot k$ est un multiple de X

Exercice 5.3

En prenant par exemple, $\pi : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}[X], P \mapsto P - X$, on a $\forall P \in \mathbb{Z}[X], P(0) = (P - X)(0)$ car $P - X$ ne change pas de degré 0 du polynôme P .

Exercice 6

Preuve par l'absurde. Supposons $a \neq 7k_a$ (a n'est pas un multiple de 7), on a $a^2 \neq 49k_a^2$. Si $a^2 + b^2 = 7k$, $49k_a^2 + b^2 = 7k$, $b^2 = 7k - 49k_a^2 = 49(\frac{k}{7} - k_a^2)$ donc $b \neq 7\sqrt{\frac{k}{7} - k_a^2}$. Donc b n'est pas un multiple de 7. Cela ne nous amène pas loin.???

Exercice 7

Preuve par récurrence. Vrai pour $n = 0$ ($3^1 + 2^2 = 7$). Supposons vrai pour n , $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$ est-ce que $3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 7k'$

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 3^{(2n+1)+2} + 2^{(n+2)+1} = 9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2}$$

On a $3^{2n+1} = 7k - 2^{n+2}$ (hypothèse)

$$9 \cdot (7k - 2^{n+2}) + 2 \cdot 2^{n+2} = 63k - 7 \cdot 2^{n+2} = 7(9k + 2^{n+2})$$

Donc vrai en prenant $k' = 9k + 2^{n+2}$.

Exercice 8

Faux. pour $n = 1$, on a $2^3 + 3 - 7 - 8 = 11$ et 11 n'est pas un multiple de 49. ?????

Exercice 9

Exercice 9.1

Preuve par récurrence. Vrai pour $n = 0$ ($2^3 + 3^1 = 11$). Supposons vrai pour n , $2^{6n+3} + 3^{2n+1} = 11k$ est-ce que $2^{6(n+1)+3} + 3^{2(n+1)+1} = 11k'$

$$2^{6(n+1)+3} + 3^{2(n+1)+1} = 2^{(6n+3)+6} + 3^{2n+1+2} = 2^6 \cdot 2^{6n+3} + 3^2 \cdot 3^{2n+1}$$

On a $2^{6n+3} = 11k - 3^{2n+1}$ (hypothèse)

$$2^6 \cdot (11k - 3^{2n+1}) + 3^2 \cdot 3^{2n+1} = 2^6 \cdot 11k - 2^6 \cdot 3^{2n+1} + 3^2 \cdot 3^{2n+1} = 11(2^6 k + 5 \cdot 3^{2n+1})$$

Donc vrai en prenant $k' = 2^6 k + 5 \cdot 3^{2n+1}$.

Exercice 10

- On a $p^2 - 1 = (p+1)(p-1)$
- p est premier donc il est impair ($p = 2^n + 1$). On a $(p+1)(p-1) = (2^n + 2)(2^n)$. Soit $2|(p+1)$, soit $4|(p-1)$. Donc $p^2 - 1 = 2k \cdot 4k' = 8(kk')$.
- p est premier donc $p \bmod 3 = 1$ ou $p \bmod 3 = 2$. Si $p \bmod 3 = 1$ alors $(p+1)(p-1) = (p+1) \cdot 3k = 3((p+1)k)$, et Si $p \bmod 3 = 2$ alors $(p+1)(p-1) = 3k \cdot (p-1) = 3(k(p-1))$ donc $p^2 - 1 = 3k'$

3 et 8 sont premiers entre eux, et p est premier donc $p^2 - 1 = 3 * 8 * k = 24k$.

QED