

Rappel de cours

•

Exo 1

Preuve par récurrence.

Proposition est vraie pour $u_0 = 0 = 2^0 - 1$.

Supposons que $u_n = 2^n - 1$ pour $n > 0$, vérifions si $u_{n+1} = 2^{n+1} - 1$.

$$u_{n+1} = 2u_n + 1$$

$$u_{n+1} = 2(2^n - 1) + 1$$

$$u_{n+1} = 2 * 2^n - 1$$

$$u_{n+1} = 2^{n+1} - 1$$

La proposition est Vraie.

Exo 2

Preuve par récurrence.

Proposition est vraie pour $u_0 = 3 = 3^{2*0}$.

Supposons que $u_n = 3^{2^n}$ pour $n > 0$, vérifions si $u_{n+1} = 3^{2^{n+1}}$.

$$u_{n+1} = u_n^2$$

$$u_{n+1} = (3^{2^n})^2$$

$$u_{n+1} = 3^{4^n}$$

La proposition est Fausse.

Exo 3

Prenons $f(x) = x^2 + 1$, et déterminons le signe de $f(x) - x$ selon x .

$$f(x) - x = x^2 + 1 - x = x(x - 1) + 1$$

$$f(x) - x, \begin{cases} > 0 & x \in]-\infty, 0[\\ > 0 & x = 0 \\ > 0 & x \in]0, 1[\\ > 0 & x = 1 \\ > 0 & x \in]1, +\infty \end{cases}$$

- La fonction f est continue sur \mathbb{R} car c'est un assemblage de fonctions continues sur \mathbb{R} ,
- La fonction f est stable sur \mathbb{R} car $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$.
- La fonction f est strictement croissante
- La fonction f admet un point fixe, donc la suite $u_n = u_n^2 + 1$ est strictement croissante donc tend vers $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

En passant à la limite dans l'inégalité $u_n > u_0$, on obtient $l > u_0$, et la suite u_n n'est pas constante, on en déduit que $l = +\infty$ donc, la suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \{+\infty\}$.

La proposition est Vraie.

Exo 4

Prenons $f(x) = 1 + \arctan(\frac{x}{2})$, et déterminons le signe de $f(x) - x$ selon x .

$$g(x) = f(x) - x = 1 + \arctan(\frac{x}{2}) - x$$

La fonction $g(x) = f(x) - x$ est strictement décroissante, positive $\forall x \in]-\infty, x_{pf}[$, négative $\forall]x_{pf}, +\infty[$, donc elle s'annule pour un point $x_{pf} \in]1 - \frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}[$.

$$\begin{cases} f(x) > x & x \in]-\infty, x_{pf}[\\ = 0 & x_{pf} \in]1 - \frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}[\\ f(x) < x & x \in]x_{pf}, +\infty[\end{cases}$$

- La fonction f est continue sur \mathbb{R} car c'est un assemblage de fonctions continues sur \mathbb{R} ,
- La fonction f est stable sur \mathbb{R} car $f(\mathbb{R}) \subset]1 - \frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2}[\subset \mathbb{R}$.
- La fonction f est strictement croissante
- La fonction f admet un point fixe x_{pf}

Cas $u_0 = x_{pf}$, la suite est constante.
cas $u_0 \neq x_{pf}$. Comme la fonction f est strictement croissante sur \mathbb{R} , on $f'(x_{pf}) > 1$, donc le point x_{pf} est répulsif et la suite u_n n'est pas convergente.

La proposition est Fausse.

Exo 5

La proposition est Fausse.

Exo 6

Prenons la valeur $x = \frac{3\pi}{4}$. On a :

$$\sin(\frac{3\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\arcsin(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{\pi}{4}$$

Donc $\arcsin(\sin(x)) \neq x$.

La proposition est Fausse.

Exo 7

Rappel de cours:

- une fonction f est bijective, si elle est injective et surjective
- une fonction f est injective, si $\forall (x_1, x_2) \in DxD, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ ou $\forall (x_1, x_2) \in DxD, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$
- une fonction f est surjective, si $\forall y \in A, \exists x \in D, f(x) = y$
- une fonction f est de classe \mathcal{C}^1 sur D , si la fonction f est dérivable sur D et sa dérivée $f'(x)$ est continue sur D .

La fonction f est de classe \mathcal{C}^1 sur $] -1; 1[$, donc $\forall x_0 \in] -1; 1[$, $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. On a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}$$

Comme f est injective $x \neq x_0 \implies f(x) \neq f(x_0)$, donc $f(x) - f(x_0) \neq 0$.

$$\frac{1}{f'(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)}$$

En prenant $f(x_0) = y_0$ et $f(x) = y$, on a

$$\frac{1}{f'(x_0)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)}$$

Comme la fonction f est continue, lorsque $x \rightarrow x_0$, on a $f(x) \rightarrow f(x_0)$, donc $y \rightarrow y_0$.

$$\frac{1}{f'(x_0)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = (f^{-1})'(y_0)$$

La dérivée de la fonction f^{-1} existe et est continue car la dérivée de la fonction f est continue (ie. la fonction f est de classe \mathcal{C}^1).

La proposition est Vraie.

Exo 8

La proposition est Fausse.

Exo 9

Rappel de cours:

- une fonction f est impaire si $\forall x, f(-x) = -f(x)$
- une fonction f est bijective, si elle est injective et surjective
- une fonction f est injective, si $\forall (x_1, x_2) \in DxD, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ ou $\forall (x_1, x_2) \in DxD, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$
- une fonction f est surjective, si $\forall y \in A, \exists x \in D, f(x) = y$

La fonction $f(x)$ est impaire donc $f(-x) = -f(x)$. La fonction $f(x)$ est bijective donc la fonction $f^{-1}(x)$ existe. on a $f(f^{-1}(x)) = x$ donc $-f(f^{-1}(x)) = -x$, comme f est impaire $f(-f^{-1}(x)) = -x$.

Admettons que la fonction f^{-1} ne soit pas impaire donc $f^{-1}(-x) \neq -f^{-1}(x)$. Comme la fonction f est injective on a $-x = f(-f^{-1}(x)) \neq f(f^{-1}(-x)) = -x$. Contradiction, donc la fonction f^{-1} est impaire.

La proposition est Vraie.

Exo 10

Rappel de cours:

- Intégrale de Riemann. $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k \frac{b-a}{n}) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$

On a $\frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin(\frac{\pi k}{2n})$.

En prenant $b = \pi$, $a = 0$, $x = k/n$, on a $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin(\frac{\pi k}{2n}) = \int_0^\pi \sin(\frac{\pi}{2}x) dx$$

Intégrale par substitution: $u = \frac{\pi}{2}x$, donc $\frac{du}{dx} = \frac{\pi}{2}$ et $dx = \frac{2}{\pi} du$

$$\int \sin(\frac{\pi}{2}x) dx = \frac{2}{\pi} \int \sin(u) du = -\frac{2}{\pi} \cos(u) = -\frac{2}{\pi} \cos(\frac{\pi}{2}x)$$

$$\int_0^\pi \sin(\frac{\pi}{2}x) dx = [-\frac{2}{\pi} \cos(\frac{\pi}{2}x)]_0^\pi = -\frac{2}{\pi} + \frac{\cos(\frac{\pi^2}{2})}{n} \neq 1$$

La proposition est Fausse.

Exo 11

On a

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2(1 + k^2/n^2)} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k}{1 + (k/n)^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{1 + (k/n)^2}$$

En prenant: $a = 0$, $b = 1$ et $x = k/n$ on a $f(x) = \frac{nx}{1+x^2}$ donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \int_0^1 \frac{nx}{1+x^2}$$

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = [\frac{\ln(x^2+1)}{2}]_0^1 = \frac{\ln(2)}{2} - \frac{\ln(1)}{2}$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} \neq \frac{\pi}{4}$$

La proposition est Fausse.

Exo 12

On a

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2(1 + k^2/n^2)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}$$

En prenant: $a = 0$, $b = 1$ et $x = k/n$ on a $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} = [\arctan(x)]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

La proposition est Vraie.

Exo 13

Rappel de cours:

- Intégrale par partie. $\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)$

On prend

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)^2 & g'(x) &= e^x \\ f'(x) &= 2x-2 & g(x) &= e^x \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \int_0^1 (x-1)^2 e^x = [(x-1)^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 (2x-2)e^x = -1 - \int_0^1 (2x-2)e^x$$

On prend

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x-2 & g'(x) &= e^x \\ f'(x) &= 2 & g(x) &= e^x \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \int_0^1 (2x-2)e^x = [(2x-2)e(x)]_0^1 - \int_0^1 2e^x = [(2x-2)e(x)]_0^1 - 2[e^x]_0^1 = 2 - 2e + 2 = 4 - 2e.$$

$$\text{Enfin } \int_0^1 (x-1)^2 e^x = -1 - (4 - 2e) = 2e - 5$$

La proposition est Vraie.

Exo 14

Soit $f(x)$ une fonction croissante et $F(x)$ une fonction tel que $F'(x) = f(x)$. On a

$$g(x) = \int_{x^3}^{x^3+1} f(t)dt = F(x^3+1) - F(x^3)$$

La valeur de la dérivée de la fonction $g(x)$ donne le sens de la fonction $g(x)$.

$$g'(x) = (F(x^3+1) - F(x^3))' = F'(x^3+1) - F'(x^3) = f(x^3+1) - f(x^3)$$

La fonction $f(x)$ est croissante donc $\forall x_1, x_2, x_1 \geq x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$ et $x^3+1 > x^3$. Donc $g'(x)$ est toujours positive ou nulle. Par conséquent la fonction $g(x)$ est croissante.

La proposition est Vraie.

Exo 15

La proposition est Fausse.

Exo 16

La proposition est Fausse.