

Rappel de cours

Méthode de Newton

•

Exercice 1

Exercice 1.1.a

La définition de " f est dérivable en x_0 " (note $f'(x_0)$) si la limite existe et est finie.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Pour $x_0 = 0$, on a

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

Exercice 1.1.b

$$\begin{aligned} l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{f(2x) - f(0)}{2x} - \frac{f(x) - f(0)}{x} = 2 \lim_{\frac{x}{2} \rightarrow 0} \frac{f(X) - f(0)}{X} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= 2 \lim_{X \rightarrow 0} \frac{f(X) - f(0)}{X} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 2f'(0) - f'(0) = f'(0) \end{aligned}$$

Exercice 1.2.a

1 - Montrons que f dérivable en 0 $\implies g$ dérivable en 0.

g dérivable en 0 si il existe $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - lx - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - l$$

f est dérivable en 0 donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ existe, l existe également donc a existe.

2 - Montrons que g dérivable en 0 $\implies f$ dérivable en 0.

g dérivable en 0 donc il existe $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}$

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - lx - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - l$$

Par hypothèse a et l existe, par conséquent $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ existe ($= a + l$). Donc f est dérivable en 0.

Exercice 1.2.b

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} g\left(\frac{x}{2^n}\right) = \lim_{X \rightarrow 0} g(X)$$

Car 2^n est toujours très grand devant x quand n tend vers $+\infty$.

$$\lim_{X \rightarrow 0} g(X) = \lim_{X \rightarrow 0} f(X) - lX = \lim_{X \rightarrow 0} f(X) - l \lim_{X \rightarrow 0} X = \lim_{X \rightarrow 0} f(X) = f(0)$$

Car comme la fonction f est dérivable en 0, elle est continue en 0. On a $g(0) = f(0) - l0 = f(0)$ donc $\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow +\infty} g\left(\frac{x}{2^n}\right) = g(0)$.

Exercice 1.3.a

La fonction h est continue en 0, si $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - 2lx - f(x) + lx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} - l = l - l = 0$$

Donc h est continue en 0.

$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ est équivalent à $\forall \epsilon > 0, \exists \sigma > 0, |x| < \sigma \implies |h(x)| < \epsilon$ et $\forall x \in [a, b], |h(x)| < \sup |h(x)|$.

Exercice 1.3.b

On a $\forall k, \forall x \in [-\alpha_\epsilon, \alpha_\epsilon], X = \frac{x}{2^k} \in [-\frac{\alpha_\epsilon}{2^k}, \frac{\alpha_\epsilon}{2^k}] \in [-\alpha_\epsilon, \alpha_\epsilon]$. Donc

$$\begin{aligned} |h(X)| &< \epsilon \\ \sum_{k=1}^n |h(\frac{x}{2^k})| &< \sum_{k=1}^n \epsilon \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} |h(\frac{x}{2^k})| &< \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \epsilon \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} |h(\frac{x}{2^k})| &< \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \end{aligned}$$

Par inégalité triangulaire

$$|\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k})| < \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

Exercice 1.3.c

Soit la suite $v_n = \frac{1}{2^n}$. Suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n v_n &= \frac{\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2^n})}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n v_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{2^n} = 1 \end{aligned}$$

La suite u_n est strictement croissante, $u_1 = 1/2$ et sa limite est 1, donc la suite u_n est majorée par 1.

Exercice 1.4.a

Soit la relation $g(x) - g(\frac{x}{2^n}) = x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k})$, montrons $g(x) - g(\frac{x}{2^{n+1}}) = x \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k})$.
Pour $x = 0$, on a $g(0) - g(\frac{0}{2^n}) = 0 \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k})$. Vrai

Pour $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} g(x) - g(\frac{x}{2^{n+1}}) &= x \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k}) = x \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h(\frac{x}{2^k}) + \frac{1}{2^{n+1}} h(\frac{x}{2^{n+1}}) \right) \\ g(x) - g(\frac{x}{2^{n+1}}) &= g(x) - g(\frac{x}{2^n}) + \frac{x}{2^{n+1}} h(\frac{x}{2^{n+1}}) \\ g(\frac{x}{2^n}) - g(\frac{x}{2^{n+1}}) &= \frac{x}{2^{n+1}} h(\frac{x}{2^{n+1}}) \end{aligned}$$

$$\frac{g\left(\frac{2x}{2^{n+1}}\right) - g\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)}{x} = \frac{1}{2^{n+1}} h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$$

$$h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2^{n+1}} h\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$$

???

Exercice 1.4.b

$$g(x) - g\left(\frac{x}{2^n}\right) = x \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{g(x) - g\left(\frac{x}{2^n}\right)}{x} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

$$\left| \frac{g(x) - g\left(\frac{x}{2^n}\right)}{x} \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right|$$

De 1.3.b

$$\left| \frac{g(x) - g\left(\frac{x}{2^n}\right)}{x} \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right) \right| < \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

Quand $n \rightarrow \infty$, par 1.3.c

$$\left| \frac{g(x) - g\left(\frac{x}{2^n}\right)}{x} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{g(x) - g(0)}{x} \right| < \epsilon$$

Exercice 1.4.cLa fonction h est dérivable en 0.**Exercice 2****Exercice 2.1.a**Si la fonction f est dérivable sur \mathbb{R} alors $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = l_1$$

Et

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = l_2$$

Donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 2l$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = l_1 + l_2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

$$f'(x) = \tilde{f}(x)$$

???

Exercice 2.1.b

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

On a

$$\tilde{f}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{2h} = 0$$

Exercice 2.1.c

$$f(x) = |x|$$

$f(x)$ est continu en 0, non dérivable en 0 et pseudo-dérivable en 0.

$$\tilde{f}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - |-h|}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Exercice 2.2.a

On suppose que la fonction f n'est pas croissante (donc strictement décroissante). $a < b, f(a) > f(b)$ alors $m = \frac{f(a)+f(b)}{2} < f(a)$, donc E contient au moins le point a . Comme la fonction f est strictement décroissante, la borne supérieure est le point c tel que $f(c) = m$ car

$$f(x) = \begin{cases} a < x < c & f(x) > f(c) = m & x \in E \\ x = c & f(x) = f(c) = m & x \notin E \\ c < x < b & f(c) = m > f(x) & x \notin E \end{cases}$$

c est le plus petit majorant de E , c'est la borne supérieure.

Exercice 2.2.b

f est continue et strictement décroissante et $x \in E$, donc $f(x) > m$. Posons $h = c - (x + \epsilon)$. On a $f(x+h) = f(c-\epsilon) > f(c) = m$.

$c = f(m) \notin E$ voir précédent (2.2.a).

Exercice 2.2.c

Posons la suite $h_n = \frac{1}{n}$, on a $h_n > 0$, f est strictement décroissante donc $f(c-h_n) > f(c) = m$ donc $f(c-h_n) \in E$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = 0$.

Exercice 2.2.d

Voir précédent (2.2.a).

Exercice 2.2.e

f est strictement décroissante donc $f(c+h_n) < f(c) = m$ donc $f(c+h_n) \notin E$ Voir précédent (2.2.a).

Exercice 2.2.f

f est strictement décroissante donc $f(c+h_n) < f(c-h_n)$. Donc $f(c+h_n) - f(c-h_n) < 0$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(c+h_n) - f(c-h_n)}{2h_n} < 0$$

Donc

$$\tilde{f} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(c+h_n) - f(c-h_n)}{2h_n} < 0$$

QED.