

Rappel de cours :
Baricentre

- Si $\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{IA_i} = \overrightarrow{0}$ alors $I = \text{Bari}(A_i, m_i)$.
- Si le point I est le milieu d'un segment AB alors $k\overrightarrow{IA} + k\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$, donc $I = \text{Bari}((A, k), (B, k))$.
- Si $\text{Bari}((A, m_a), (A, n_a), \dots) = \text{Bari}((A, m_a + n_a), \dots)$.
- Baricentre partiel. Si $F = \text{Bari}((B_j, n_j))$ alors $\text{Bari}((A_i, m_i), (B_j, n_j)) = \text{Bari}((A_i, m_i), (F, \sum n_j))$
- G est un centre de gravité des points A_i si $G = \text{Bari}((A_i, m))$.

Expression des transformations en complexe:

- s est une translation d'affixe a alors $s : z \mapsto z + a$
- s est une rotation de centre \mathcal{C} d'affixe c et d'angle θ alors $s : z \mapsto c + e^{i\theta}(z - c)$
- s est la symétrie centrale de centre \mathcal{C} d'affixe c alors $s : z \mapsto -z + 2c$ (car c est le milieu de $s(z)z$)
- la réflexion d'axe $\mathcal{O}x$ est $s : z \mapsto \bar{z}$
- s est l'homothétie de centre \mathcal{C} d'affixe c et de rapport λ alors $s : z \mapsto c + \lambda(z - c)$

Classification des isométries (transformation qui conserve les longueurs)
Supposons que φ et ψ soit 2 isométries, alors:

- si φ et ψ sont des déplacements (isométrie qui conservent les angles) alors $\varphi \circ \psi$ est un déplacement
- si φ et ψ sont des antidéplacements (isométrie qui inversent les angles) alors $\varphi \circ \psi$ est un déplacement
- si φ est un déplacement et ψ un antidéplacement alors $\varphi \circ \psi$ est un antidéplacement
- si φ est un antidéplacement et ψ un déplacements alors $\varphi \circ \psi$ est un antidéplacement

Question 1.a

Les distances AB et $A'B'$ sont identiques, montrons qu'il existe une isométrie $\phi(z) = az + b$ qui transforme $A' = \phi(A)$ et $B' = \phi(B)$

- soit $a = 1$, donc la transformation ϕ est la translation $\overrightarrow{AA'}$.
- soit $a \neq 1$. Il existe un angle θ tel que $a = e^{i\theta}$. Pour que ϕ soit une rotation alors $\phi(z) = c + d(z - c) = dz + c(1 - d)$. Prenons, $d = a = e^{i\theta}$ et $b = c(1 - d) = c(1 - a)$. Alors ϕ est la rotation de centre c et d'angle θ .

Les valeurs de a et b sont uniques donc la transformation ϕ est unique.

Question 1.b

La transformation ϕ est une translation lorsque $a = 1 = e^{i\theta}$. Donc $\theta = 0$, par conséquent les droites AB et $A'B'$ sont parallèles.

Question 1.c

??

Question 1.d

??

Question 1.e

ϕ est une isométrie donc $AB = A'B'$, Soit $D = \phi(D)$, on a $AD = AC$ et $BD = BC$ car ϕ est une isométrie. De même, l'angle $(AB, AC) = (A'B', A'D)$. D est le point tel que $AD = AC$ et $(AB, AC) = (A'B', A'D)$. Donc $\phi(C) = D = C'$.

Question 2.a

La transformation est une translation.

Question 2.b

Question 3

Soit s la réflexion d'axe \mathbb{D} . La rotation ϕ de centre O et d'angle $-\theta$ de la droite \mathbb{D} est l'axe des abscisses. La réflexion sur l'axe des abscisses, ϕ_a d'un point A est le conjugué du point A , $\phi_a(A) = \bar{A}$. Donc en utilisant le principe de conjugaison on a

$$\phi_a = \phi \circ s \circ \phi^{-1}$$

$$\phi^{-1} \circ \phi_a \circ \phi = s$$

$$s = e^{i\theta} \cdot (e^{-i\theta} z) 0$$

Question 4

QED