

Rappel de cours

Definition 1. Soit I un intervalle de \mathbb{R} , (U_n) une suite de fonctions définies sur I et f une fonction définie sur I . On dit que (u_n) converge **simplement** vers f sur I si pour tout $x \in I$, la suite $(U_n(x))$ converge vers $f(x)$.

Definition 2. Soit I un intervalle de \mathbb{R} , (U_n) une suite de fonctions définies sur I et f une fonction définie sur I . On dit que (u_n) converge **uniformément** vers f sur I si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \forall n > n_0, |(U_n(x)) - f(x)| < \epsilon$$

Definition 3. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} U_n(x)$ converge **normalement** sur I si la série $\sum_{n \geq 0} \|U_n(x)\|_\infty$ est convergente.

Definition 4. On dit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} U_n(x)$ converge **normalement** sur I si la série $\sum_{n \geq 0} \|U_n(x)\|_\infty$ est convergente.

Exercice 1

Montrons que la fonction $f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x}$ converge simplement pour $x \in [0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^{-x} + 1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^{-x}}{n} = e^{-x}$$

La fonction $f_n(x)$ converge simplement vers $f(x) = e^{-x}$. Montrons maintenant que $f_n(x)$ converge uniformément. Il faut que $\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \implies \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon)$. Calculons

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x} - e^{-x} \right| = \left| \frac{ne^{-x} + x^2 - (n+x)e^{-x}}{n+x} \right| = \left| \frac{x^2 - xe^{-x}}{n+x} \right| < \frac{2}{n}$$

car $n+x \geq n$ et $|x^2 - xe^{-x}| < 2$ comme $x^2 \in [0, 1]$ et $xe^{-x} \in [0, \frac{1}{e}]$. Prenons $\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{2}{n}$, donc n_ϵ existe et doit être supérieur à $\frac{2}{\epsilon}$.

Exercice 2

Exercice 2.1

Montrons que la fonction $f_n(x) = \ln\left(x + \frac{1}{n}\right)$ converge simplement pour $x \in]0, +\infty[$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(x + \frac{1}{n}\right) = \ln(x + 0) = \ln(x)$$

La fonction $f_n(x)$ converge simplement vers $f(x) = \ln(x)$. Montrons maintenant que $f_n(x)$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$. Il faut que $\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \implies \sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon)$. Calculons

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \ln\left(x + \frac{1}{n}\right) - \ln(x) \right| = \left| \ln\left(\frac{x + \frac{1}{n}}{x}\right) \right| = \left| \ln\left(1 + \frac{1}{nx}\right) \right| \leq \ln\left(1 + \frac{1}{na}\right)$$

car $\frac{1}{na} \geq \frac{1}{nx}$ pour $x \in [a, +\infty[$.

Prenons $\sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \ln\left(1 + \frac{1}{na}\right)$, donc n_ϵ existe et doit être tel que $\ln\left(1 + \frac{1}{n_\epsilon a}\right) < \epsilon$.

Exercice 2.2

Non, car pour x proche de 0, il n'existe pas de borne supérieure pour $|f_n(x) - f(x)| = \left| \ln\left(1 + \frac{1}{nx}\right) \right|$.

Exercice 3

Exercice 3.1

Quand $x = 0$, on a $f_n(x) = 0$ pour tout $n \geq 1$.

Pour $x > 0$, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} xe^{-nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{nx}} = 0$$

On en déduit que la fonction $f_n(x)$ converge simplement vers la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 0 & x \in]0, +\infty[\end{cases} = 0$$

Exercice 3.2

Pour que la fonction $f_n(x)$ converge uniformément sur $[0, +\infty]$. Il faut que $\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_\epsilon \implies \sup_{x \in [0, +\infty]} |f_n(x) - 0| < \epsilon)$.

Cela revient à trouver si la fonction $f_n(x)$ a un maximum pour $x \in [0, +\infty]$. La fonction est continue et positive sur $[0, \infty]$, cherchons si il existe un maximum.

Calculons $f'_n(x) = e^{-x}(1 - nx)$. on a $f'_n(x)$ qui s'annule lorsque $x = \frac{1}{n}$.

La fonction $f_n(x)$ croît entre $[0, \frac{1}{n}]$ jusqu'à la valeur $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{ne}$ et décroît ensuite pour $x \in [\frac{1}{n}, \infty]$. Donc il existe une valeur supérieure $\frac{1}{ne}$.

On a $\sup_{x \in [0, +\infty]} |f_n(x)| = \frac{1}{ne}$, donc il n_ϵ existe et doit être supérieure à $\frac{1}{e \cdot \epsilon}$. Par conséquent, la fonction $f_n(x)$ converge uniformément vers la fonction 0.

Exercice 4

Pour $x \in [-r, r]$ avec $r > 0$ on a $0 \leq f_n(x) \leq \ln\left(1 + \frac{r^2}{n^2}\right)$. On va montrer que

$$\ln\left(1 + \frac{r^2}{n^2}\right) \leq \frac{r^2}{n^2}$$

$$1 + \frac{r^2}{n^2} \leq e^{\frac{r^2}{n^2}} = 1 + \frac{r^2}{n^2} + \frac{r^4}{2n^4} + O\left(\frac{r^2}{n^2}\right)$$

$$0 \leq \frac{r^4}{2n^4} + O\left(\frac{r^2}{n^2}\right)$$

Donc, pour $x \in [-r, r]$ avec $r > 0$ on a $0 \leq f_n(x) \leq \ln\left(1 + \frac{r^2}{n^2}\right) \leq \frac{r^2}{n^2}$. Comme la série de fonctions $\frac{r^2}{n^2}$ converge normalement, on en déduit par le critère d'équivalence que la série de fonctions $f_n(x) = \ln\left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right)$ converge normalement pour tout $x \in [-r, r]$.

Les fonctions f_n sont continues sur $x \in [-r, r]$ (assemblage de fonctions continues) et la série de fonctions $S = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge normalement pour $x \in [-r, r]$. On en déduit que S est continue pour $x \in [-r, r]$.

Exercice 5

Exercice 5.1

On va montrer que

$$\begin{aligned} \frac{x}{n(n+x)} &< \frac{x}{n^2} \\ 0 &< \frac{x}{n^2} - \frac{x}{n(n+x)} \\ 0 &< \frac{x^2}{n^2(n+x)} \end{aligned}$$

Qui est vrai, donc $f_n(x) < \frac{x}{n^2}$. On sait que la série de fonctions $\frac{x}{n^2}$ converge, donc par le critère d'équivalence on a la série de fonctions $f_n(x)$ qui converge.

Exercice 5.2

- (H1) - fonction $f_n(x)$ dérivable. Oui. $f'_n(x) = \frac{1}{(n+x)^2}$.
- (H2) - la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur une fonction S sur $[0, +\infty]$. Oui voir 5.1
- (H3) - la série de fonctions $\sum f'_n$ converge uniformément sur une fonction g sur $[0, +\infty]$.

Montrons (H3). on a $f'_n(x) = \frac{1}{(n+x)^2} < \frac{1}{n^2}$ et la série de fonctions $\frac{1}{n^2}$ converge uniformément sur \mathbb{R}^+ .
Donc (H3) est vérifiée.

Donc la série de fonctions f_n est de classe C^1 .

Exercice 6

Exercice 6.1

$$\begin{aligned} \int_x^{1-x} \frac{\ln(1-t)}{t} dt &= \int_x^{1-x} \frac{-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n}}{t} dt = \int_x^{1-x} -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{n} dt = -\sum_{n=1}^{+\infty} \int_x^{1-x} \frac{t^{n-1}}{n} dt \\ &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{t^n}{n^2} \right]_x^{1-x} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2} - \frac{(1-x)^n}{n^2} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} (x^n - (1-x)^n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} ((1-x)^n - x^n) = \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \end{aligned}$$

Exercice 6.2

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{1-x} \frac{\ln(1-t)}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} ((1-x)^n - x^n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Exercice 7

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n(1+x)}\right) = 0$. Grâce aux critères des séries alternées, on voit que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} (-1)^n f_n(x)$ converge simplement. En appliquant le critère de Cauchy uniforme, la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge uniformément sur \mathbb{R}^+ ssi:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, (m > n \geq n_\epsilon \implies \forall x \in \mathbb{R}^+, \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \epsilon)$$

On a

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \ln \left(1 + \frac{x}{n(1+x)} \right) < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \frac{x}{1+x} \right) < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

Donc en prenant n_ϵ , tel que $\ln \left(1 + \frac{1}{n_\epsilon} \right) < \epsilon$, le critère de Cauchy est vérifié et la série de fonctions converge uniformément sur \mathbb{R}^+ .

QED