







































































killing1889: formula evidence















The page, the confidence and the picture of an inline formula are its HOST LINE's — a formula has none of its own. A line's confidence is not a formula's.

Inline formulas (first occurrence)









































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00001	2	0.880	`r`	r	
killing1889_F00002	2	0.931	`X_{1} f \ldots X_{r} f`	$X_1 f \dots X_r f$	
killing1889_F00003	2	0.523	`\left(X_{i}, X_{x}\right)`	(X_i, X_x)	
killing1889_F00004	2	0.548	`(\iota x \lambda)`	$(\iota x \lambda)$	
killing1889_F00005	2	0.925	`\iota, x`	ι, x	
killing1889_F00006	2	0.925	`m(<r)`	$m(< r)$	
killing1889_F00007	2	0.820	`1 \ldots m`	$1 \dots m$	
killing1889_F00008	2	0.820	`\frac{m(m-1)}{2}`	$\frac{m(m-1)}{2}$	
killing1889_F00009	2	0.820	`\left(X_{i} X_{x}\right)`	$(X_i X_x)$	
killing1889_F00010	2	0.820	`X_{1} f \ldots X_{m} f`	$X_1 f \dots X_m f$	
killing1889_F00011	2	0.577	`\iota=1 \ldots m, \varrho=1 \ldots r`	$\iota = 1 \dots m,\ \varrho = 1 \dots r$	
killing1889_F00012	2	0.577	`\left(X_{\imath} X_{\rho^{\prime}}\right)`	$(X_\imath X_{\rho'})$	
killing1889_F00013	2	0.927	`\Sigma \eta_{i} X_{i} f`	$\Sigma \eta_i X_i f$	
killing1889_F00014	2	0.659	`r+1`	$r+1$	
killing1889_F00015	2	0.659	`\omega, \xi_{1} \ldots \xi_{r}`	$\omega, \xi_1 \dots \xi_r$	
killing1889_F00016	2	0.927	`\omega`	ω	
killing1889_F00017	2	0.909	`\xi_{1}: \xi_{2}: \cdots: \xi`	$\xi_1 : \xi_2 : \dots : \xi$	
killing1889_F00018	2	0.928	`\psi_{1}(\eta), \psi_{2}(\eta) \ldots \psi_{r-1}(\eta)`	$\psi_1(\eta), \psi_2(\eta) \dots \psi_{r-1}(\eta)$	
killing1889_F00019	2	0.909	`l`	l	
killing1889_F00020	3	0.911	`k`	k	
killing1889_F00021	3	0.521	`\psi_{r-1}(\eta) \ldots \psi_{r-2+1}(\eta)`	$\psi_{r-1}(\eta) \dots \psi_{r-2+1}(\eta)$	
killing1889_F00022	3	0.521	`\psi_{r-1}(\eta)`	$\psi_{r-1}(\eta)$	
killing1889_F00023	3	0.898	`\psi_{r-1}(\eta) \ldots \psi_{r-k+1}(\eta)`	$\psi_{r-1}(\eta) \dots \psi_{r-k+1}(\eta)$	
killing1889_F00024	3	0.563	`(r-k+1)^{\text {tea }}`	$(r-k+1)^{\text{tea}}$	
killing1889_F00025	3	0.316	`\left|\gamma_{1 x}\right|=\left|\sum c_{\rho_{2 x}} \eta_{e}\right|`	$\lvert\gamma_{1x}\rvert = \left\lvert\sum c_{\rho_{2x}} \eta_e\right\rvert$	
killing1889_F00026	3	0.915	`=k`	$= k$	
killing1889_F00027	3	0.186	`\omega_{t}`	ω_t	
killing1889_F00028	3	0.186	`\omega_{x}`	ω_x	
killing1889_F00029	3	0.186	`a_{t x}`	a_{tx}	
killing1889_F00030	3	0.186	`a_{x i}`	a_{xi}	
killing1889_F00031	3	0.920	`\omega_{i}`	ω_i	
killing1889_F00032	3	0.920	`\omega_{i}+a_{i x} \omega_{x}`	$\omega_i + a_{ix}\omega_x$	
killing1889_F00033	3	0.360	`\omega_{x}+a_{x} \omega_{c}`	$\omega_x + a_x \omega_c$	
killing1889_F00034	3	0.742	`a`	a	
killing1889_F00035	3	0.742	`\omega_{i}+a \omega_{x}`	$\omega_i + a\omega_x$	
killing1889_F00036	3	0.742	`a_{i}`	a_i	
killing1889_F00037	3	0.840	`a_{i x}`	a_{ix}	
killing1889_F00038	3	0.320	`x`	x	
killing1889_F00039	3	0.929	`a_{2 x}`	a_{2x}	












































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00040	3	0.929	\lambda	λ	
killing1889_F00041	3	0.922	a_{\times 2}	$a_{\times 2}$	
killing1889_F00042	3	0.905	1 \ldots l	$1 \dots l$	
killing1889_F00043	3	0.918	l=2,4,6,7,8	$l = 2, 4, 6, 7, 8$	
killing1889_F00044	4	0.185	\left|\sum \eta_{e} c_{e l x}\right|	$\left\|\sum \eta_e c_{elx}\right\|$	
killing1889_F00045	4	0.185	\left|\gamma_{i x}\right|	$\|\gamma_{ix}\|$	
killing1889_F00046	4	0.893	X_{r} f	$X_r f$	
killing1889_F00047	4	0.912	\eta_{r} X_{r} f+\eta_{r-1} X_{r-1} f	$\eta_r X_r f + \eta_{r-1} X_{r-1} f$	
killing1889_F00048	4	0.915	\varepsilon	ε	
killing1889_F00049	4	0.896	\eta_{1}=\eta_{2}=\cdots=\eta_{r-1}=0, \eta_{r}=1	$\eta_1 = \eta_2 = \cdots = \eta_{r-1} = 0, \eta_r = 1$	
killing1889_F00050	4	0.917	X_{1} \ldots X_{r-2}	$X_1 \dots X_{r-2}$	
killing1889_F00051	4	0.887	\left(X_{r} X_{2}\right) \ldots\left(X_{r} X_{r-2}\right)	$(X_r X_2) \dots (X_r X_{r-2})$	
killing1889_F00052	4	0.887	X_{1} f	$X_1 f$	
killing1889_F00053	4	0.900	(1, r, r-1)	$(1, r, r-1)$	
killing1889_F00054	4	0.900	\omega \varepsilon=0	$\omega \varepsilon = 0$	
killing1889_F00055	5	0.888	m	m	
killing1889_F00056	5	0.897	X_{1} f, X_{2} f \ldots X_{r-2} f	$X_1 f, X_2 f \dots X_{r-2} f$	
killing1889_F00057	5	0.897	\left(X_{r} X_{1}\right),\left(X_{r} X_{2}\right) \ldots \left(X_{r} X_{m}\right)	$(X_r X_1), (X_r X_2) \dots (X_r X_m)$	
killing1889_F00058	5	0.899	\left(X_{r} X_{m+1}\right) \ldots	$(X_r X_{m+1}) \dots$	
killing1889_F00059	5	0.876	\left(X_{r} X_{r-2}\right)	$(X_r X_{r-2})$	
killing1889_F00060	5	0.914	(r, r-1, x)	$(r, r-1, x)$	
killing1889_F00061	5	0.900	X_{x} f	$X_x f$	
killing1889_F00062	5	0.885	\eta_{1} \ldots \eta_{r}	$\eta_1 \dots \eta_r$	
killing1889_F00063	5	0.889	1<k<r	$1 < k < r$	
killing1889_F00064	5	0.785	r-1^{\text {ten }}	$r - 1^{\text{ten}}$	
killing1889_F00065	5	0.921	\xi_{1} \ldots \zeta_{r}	$\xi_1 \dots \zeta_r$	
killing1889_F00066	5	0.908	\Sigma \eta_{t} X_{t} f	$\Sigma \eta_t X_t f$	
killing1889_F00067	5	0.887	\left(\eta_{1} \ldots \eta_{r}\right)	$(\eta_1 \dots \eta_r)$	
killing1889_F00068	5	0.931	(00 \ldots 01) \omega=0	$(00 \dots 01)\omega = 0$	
killing1889_F00069	5	0.880	r-i+1^{100}	$r - i + 1^{100}$	
killing1889_F00070	5	0.898	i<k	$i < k$	
killing1889_F00071	5	0.518	X_{r \rightarrow i} f \ldots X_{r-k+1} /	$X_{r \to i} f \dots X_{r-k+1}/$	
killing1889_F00072	6	0.829	X_{1} f \ldots X_{r \rightarrow k} f	$X_1 f \dots X_{r \to k} f$	
killing1889_F00073	6	0.679	\alpha, \beta=1 \cdots \gamma-k	$\alpha, \beta = 1 \cdots \gamma - k$	
killing1889_F00074	6	0.797	\left|e_{\alpha \beta}\right|	$\|e_{\alpha\beta}\|$	
killing1889_F00075	6	0.925	\alpha, \beta	α, β	
killing1889_F00076	6	0.925	1 \ldots r-k	$1 \dots r - k$	
killing1889_F00077	6	0.925	x, \lambda	x, λ	
killing1889_F00078	6	0.911	1 \ldots i-1	$1 \dots i - 1$	
killing1889_F00079	6	0.911	(r, r-x, r-\lambda)	$(r, r - x, r - \lambda)$	
killing1889_F00080	6	0.892	X_{r}	X_r	
killing1889_F00081	6	0.892	X_{r}, X_{r-1} \ldots X_{r-i+1}	$X_r, X_{r-1} \dots X_{r-i+1}$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00082	6	0.856	`(r, r-\lambda, \alpha)`	$(r, r-\lambda, \alpha)$	
killing1889_F00083	6	0.890	`\left(X_{r-2} X_{\beta}\right)`	$(X_{r-2}X_{\beta})$	
killing1889_F00084	6	0.890	`m_{p} X_{r-k+1}`	$m_{p}X_{r-k+1}$	
killing1889_F00085	6	0.890	`X_{r-k+1}`	X_{r-k+1}	
killing1889_F00086	6	0.914	`\sum e_{\alpha \beta} m_{\beta}=0`	$\sum e_{\alpha\beta}m_{\beta}=0$	
killing1889_F00087	6	0.914	`\alpha=1 \ldots r-k`	$\alpha=1\ldots r-k$	
killing1889_F00088	6	0.914	`\left|e_{\alpha \beta}\right|=0`	$\|e_{\alpha\beta}\|=0$	
killing1889_F00089	6	0.909	`X_{r-k+2} \ldots X_{r-i}`	$X_{r-k+2}\ldots X_{r-i}$	
killing1889_F00090	6	0.921	`X_{r-i+1} \ldots X_{r}`	$X_{r-i+1}\ldots X_{r}$	
killing1889_F00091	6	0.915	`\alpha`	α	
killing1889_F00092	6	0.890	`(r, r-\lambda, r-i)`	$(r, r-\lambda, r-i)$	
killing1889_F00093	7	0.371	`\left(X_{n-1} X_{n-i-1}\right)`	$(X_{n-1}X_{n-i-1})$	
killing1889_F00094	7	0.371	`X_{n}`	X_{n}	
killing1889_F00095	7	0.901	`X_{r-1} \ldots X_{r-i-1}, X_{r-i-2}`	$X_{r-1}\ldots X_{r-i-1}, X_{r-i-2}$	
killing1889_F00096	7	0.901	`r-i-v`	$r-i-v$	
killing1889_F00097	7	0.905	`r-i-\varrho`	$r-i-\varrho$	
killing1889_F00098	7	0.905	`r-i \ldots r-k+1`	$r-i\ldots r-k+1$	
killing1889_F00099	7	0.285	`\left(X_{g} X_{v}\right)`	$(X_{g}X_{v})$	
killing1889_F00100	7	0.285	`X_{r} \ldots X_{r-l+1}`	$X_{r}\ldots X_{r-l+1}$	
killing1889_F00101	7	0.916	`\sigma`	σ	
killing1889_F00102	7	0.916	`\tau`	τ	
killing1889_F00103	7	0.645	`r-i-\nu`	$r-i-\nu$	
killing1889_F00104	7	0.571	`(r, r-i-v, r-i-\varrho)`	$(r, r-i-v, r-i-\varrho)$	
killing1889_F00105	7	0.452	`\left(X_{r-i-v} X_{r-i-p}\right)`	$(X_{r-i-v}X_{r-i-p})$	
killing1889_F00106	7	0.452	`X_{r} \ldots X_{r-i+1}`	$X_{r}\ldots X_{r-i+1}$	
killing1889_F00107	7	0.938	`X_{r} f, X_{r-1} f \ldots X_{r-k+1} f`	$X_{r}f, X_{r-1}f\ldots X_{r-k+1}f$	
killing1889_F00108	7	0.919	`\nu_{1} \ldots \nu_{r-k}`	$\nu_{1}\ldots\nu_{r-k}$	
killing1889_F00109	7	0.919	`\left(X_{r}, \nu_{1} X_{1}+\cdots+\nu_{r-k} X_{r-k}\right)=0`	$(X_{r}, \nu_{1}X_{1}+\cdots+\nu_{r-k}X_{r-k})=0$	
killing1889_F00110	7	0.666	`\frac{\mu_{1}}{\mu_{0}}, \frac{\mu_{2}}{\mu_{0}} \cdots \frac{\mu_{r-1}}{\mu_{0}}`	$\frac{\mu_1}{\mu_0}, \frac{\mu_2}{\mu_0}\cdots\frac{\mu_{r-1}}{\mu_0}$	
killing1889_F00111	7	0.693	`\left(X_{r} X_{r-t-1}\right) \cdots\left(X_{r} X_{r-k+1}\right)`	$(X_{r}X_{r-t-1})\cdots(X_{r}X_{r-k+1})$	
killing1889_F00112	7	0.898	`X`	X	
killing1889_F00113	7	0.898	`\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-i+1}, X_{r-i}\right]`	$[X_{r}X_{r-1}\ldots X_{r-i+1}, X_{r-i}]$	
killing1889_F00114	7	0.922	`X_{r-i}, \ldots`	$X_{r-i}, \ldots$	
killing1889_F00115	7	0.922	`\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-k+2}\right]`	$[X_{r}X_{r-1}\ldots X_{r-k+2}]$	
killing1889_F00116	7	0.922	`X_{r-k+2}`	X_{r-k+2}	
killing1889_F00117	7	0.910	`\left[X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-k+1}\right]`	$[X_{r}X_{r-1}\ldots X_{r-k+1}]$	
killing1889_F00118	7	0.872	`X_{r-1} \ldots X_{r-i+1}`	$X_{r-1}\ldots X_{r-i+1}$	
killing1889_F00119	7	0.701	`X_{r \rightarrow i} \ldots X_{r-k+1}`	$X_{r\to i}\ldots X_{r-k+1}$	
killing1889_F00120	7	0.701	`\left(X_{r} X_{r-i}\right) \ldots\left(X_{r} X_{r-i}\right)`	$(X_{r}X_{r-i})\ldots(X_{r}X_{r-i})$	
killing1889_F00121	7	0.910	`\left(X_{r} X_{r-1-1}\right)`	$(X_{r}X_{r-1-1})$	
killing1889_F00122	7	0.868	`\ldots\left(X_{r} X_{r-i}\right)`	$\ldots(X_{r}X_{r-i})$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00123	7	0.868	`X_{r} \ldots X_{r-i+1}, X_{r-i} \ldots X_{r-i}`	$X_r \ldots X_{r-i+1}, X_{r-i} \ldots X_{r-i}$	
killing1889_F00124	7	0.690	`X_{r-i} \ldots X_{r-i}`	$X_{r-i} \ldots X_{r-i}$	
killing1889_F00125	7	0.690	`\left(X_{r} X_{r-i-1}\right)`	$(X_r X_{r-i-1})$	
killing1889_F00126	7	0.889	`\ldots\left(X_{r} X_{r-i^{\prime \prime}}\right)`	$\ldots (X_r X_{r-i''})$	
killing1889_F00127	7	0.889	`X_{r} \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i}`	$X_r \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i}$	
killing1889_F00128	7	0.540	`X_{r \rightarrow-1} \ldots X_{r \rightarrow i^{\prime}}`	$X_{r\to -1} \ldots X_{r\to i'}$	
killing1889_F00129	7	0.873	`\left(X_{r-2} X_{r-i}\right) \cdots\left(X_{r-2} X_{r-i} \right)`	$(X_{r-2}X_{r-i}) \cdots (X_{r-2}X_{r-i})$	
killing1889_F00130	7	0.461	`X_{r} X_{r-1} \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i}`	$X_r X_{r-1} \ldots X_{r-i} \ldots X_{r-i}$	
killing1889_F00131	7	0.461	`\left(X_{r-i} X_{r-i-1}\right) \ldots\left(X_{r-2} X_{r-i ^{\prime}}\right)`	$(X_{r-i}X_{r-i-1}) \ldots (X_{r-2}X_{r-i'})$	
killing1889_F00132	7	0.657	`X_{r} \ldots X_{r \rightarrow-i}`	$X_r \ldots X_{r\to -i}$	
killing1889_F00133	7	0.657	`X_{r-i-1} \ldots X_{r-f^{\prime}}`	$X_{r-i-1} \ldots X_{r-f'}$	
killing1889_F00134	8	0.891	`\psi_{r-1}(\eta) \ldots`	$\psi_{r-1}(\eta) \ldots$	
killing1889_F00135	8	0.895	`\psi_{r-k+1}(\eta)`	$\psi_{r-k+1}(\eta)$	
killing1889_F00136	8	0.907	`X_{1} f \ldots`	$X_1 f \ldots$	
killing1889_F00137	8	0.928	`X_{r-k} f`	$X_{r-k} f$	
killing1889_F00138	8	0.928	`X_{r-1} \ldots X_{r-k+1}`	$X_{r-1} \ldots X_{r-k+1}$	
killing1889_F00139	8	0.909	`a_{1} \ldots a_{k-2}`	$a_1 \ldots a_{k-2}$	
killing1889_F00140	8	0.900	`X_{r-k+1} f`	$X_{r-k+1} f$	
killing1889_F00141	8	0.798	`\left(X_{r} X_{\alpha}\right)`	$(X_r X_\alpha)$	
killing1889_F00142	8	0.926	`r-k`	$r-k$	
killing1889_F00143	8	0.921	`\omega_{1} \ldots \omega_{r-k}`	$\omega_1 \ldots \omega_{r-k}$	
killing1889_F00144	9	0.880	`(r, r-k+2, \alpha)`	$(r, r-k+2, \alpha)$	
killing1889_F00145	9	0.929	`a_{k-2}=0`	$a_{k-2} = 0$	
killing1889_F00146	9	0.894	`\psi_{r-1}(\eta), \psi_{r-2}(\eta) \ldots \psi_{r-2+1}( \eta)`	$\psi_{r-1}(\eta), \psi_{r-2}(\eta) \ldots \psi_{r-2+1}(\eta)$	
killing1889_F00147	9	0.592	`r-k+1{ }^{\text {ten }}`	$r-k+1^{\text{ten}}$	
killing1889_F00148	9	0.908	`\psi_{r-k}(\eta)`	$\psi_{r-k}(\eta)$	
killing1889_F00149	9	0.908	`\eta`	η	
killing1889_F00150	9	0.889	`r-k+1^{\text {ten }}`	$r-k+1^{\text{ten}}$	
killing1889_F00151	9	0.727	`r-k^{\text {ten }}`	$r-k^{\text{ten}}$	
killing1889_F00152	9	0.727	`\gamma_{i x}=\sum \rho \eta_{\rho} c_{\rho i x}`	$\gamma_{ix} = \sum \rho \eta_\rho c_{\rho i x}$	
killing1889_F00153	9	0.914	`(00 \ldots 01) k`	$(00 \ldots 01)k$	
killing1889_F00154	9	0.919	`X_{r-1} f, \ldots X_{r-k+1} f`	$X_{r-1}f, \ldots X_{r-k+1}f$	
killing1889_F00155	9	0.909	`\alpha_{0} \ldots \alpha_{x}, \beta_{0} \ldots \beta_{2} \ldots`	$\alpha_0 \ldots \alpha_x, \beta_0 \ldots \beta_2 \ldots$	
killing1889_F00156	9	0.891	`\left(X_{r} X_{1}\right),\left(X_{r} X_{2}\right) \ldots \left(X_{r} X_{r-k}\right)`	$(X_r X_1), (X_r X_2) \ldots (X_r X_{r-k})$	
killing1889_F00157	9	0.864	`\left(r, \varrho, \alpha_{0}\right),\left(r, \varrho , \alpha_{1}\right) \ldots\left(r, \varrho, \alpha_{n} \right)`	$(r, \varrho, \alpha_0), (r, \varrho, \alpha_1) \ldots (r, \varrho, \alpha_n)$	
killing1889_F00158	9	0.881	`\varrho`	ϱ	
killing1889_F00159	9	0.881	`r-1, \ldots r-k+1`	$r-1, \ldots r-k+1$	
killing1889_F00160	9	0.874	`\omega_{\beta}`	ω_β	











































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00161	9	0.874	\omega_{\alpha}	ω_α	zunächst an, dass keine Wurzel ω_β gleich ω_α sei, so folgt, dass sich
killing1889_F00162	9	0.395	\left(X_{\rho} X_{1}\right) \ldots\left(X_{\rho} X_{r-k}\right)	$(X_\rho X_1) \ldots (X_\rho X_{r-k})$	$(X_\varrho X_1) \ldots (X_\varrho X_{r-k})$ in der durch die vorstehenden Gleichungen be-
killing1889_F00163	10	0.829	e_{2 \mu}	$e_{2\mu}$	zeichneten Art darstellen lassen, wofern nur die ω und $e_{2\mu}$ geändert
killing1889_F00164	10	0.920	X_{\alpha_{0}} f	$X_{\alpha_0} f$	Somit gehört die Transformation $X_{\alpha_0} f$ einer ebenen k-fach aus-
killing1889_F00165	10	0.682	X_{u_{0}} f	$X_{u_0} f$	gleich k ist und dass $X_{\alpha_0} f$ mit Transformationen der Reihe $X_1 f \ldots X_{r-k} f$
killing1889_F00166	10	0.682	X_{1} f \ldots X_{r-k} f	$X_1 f \ldots X_{r-k} f$	gleich k ist und dass $X_{\alpha_0} f$ mit Transformationen der Reihe $X_1 f \ldots X_{r-k} f$
killing1889_F00167	10	0.922	l-1	$l-1$	*eine $(l-1)$-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit von zweigliedrigen Unter-*
killing1889_F00168	10	0.938	\omega_{a}	ω_a	Der beim Beweise ausgeschlossene Fall, dass ω_α weiteren Wurzeln
killing1889_F00169	10	0.920	\omega_{\alpha}=\omega_{\beta}=\omega_{\gamma}	$\omega_\alpha = \omega_\beta = \omega_\gamma$	z. B. $\omega_\alpha = \omega_\beta = \omega_\gamma$, so sollen für $\omega = \omega_\alpha$ alle Unterdeterminanten
killing1889_F00170	10	0.920	\omega=\omega_{\alpha}	$\omega = \omega_\alpha$	z. B. $\omega_\alpha = \omega_\beta = \omega_\gamma$, so sollen für $\omega = \omega_\alpha$ alle Unterdeterminanten
killing1889_F00171	10	0.496	r-2^{\text {tea }}	$r - 2^{\text{tea}}$	$r - 2^{\text{tea}}$ Grades von $\lvert\gamma_{ix} - \delta_{ix}\omega\rvert = \lvert c_{rix} - \delta_{ix}\omega\rvert$ verschwinden; es
killing1889_F00172	10	0.496	\left|\gamma_{i x}-\delta_{i x} \omega\right|=\left|c_{r i x}-\delta_{i x} \omega\right|	$\lvert\gamma_{ix} - \delta_{ix}\omega\rvert = \lvert c_{rix} - \delta_{ix}\omega\rvert$	$r - 2^{\text{tea}}$ Grades von $\lvert\gamma_{ix} - \delta_{ix}\omega\rvert = \lvert c_{rix} - \delta_{ix}\omega\rvert$ verschwinden; es
killing1889_F00173	10	0.917	X_{\rho} f	$X_\rho f$	muss also auch für $X_\varrho f$ eine Wurzel existiren, für welche alle Unter-
killing1889_F00174	10	0.925	r-2^{\text {to }}	$r - 2^{\text{to}}$	determinanten $r - 2^{\text{tea}}$ Grades verschwinden. Nun müsste wegen der
killing1889_F00175	10	0.840	r \rho \alpha_{0}	$r\rho\alpha_0$	Jacobi'schen Relation $(r\ \varrho\ \alpha_0)$ sein:
killing1889_F00176	10	0.933	X_{e} f	$X_e f$	Soll aber jetzt für $X_\varrho f$ die verlangte Bedingung erfüllt sein, so
killing1889_F00177	10	0.550	\left(X_{Q} X_{\alpha_{1}}\right)	$(X_Q X_{\alpha_1})$	Entsprechendes gilt für die $(X_\varrho\ X_{\alpha_1})$ u. s. w.
killing1889_F00178	10	0.791	(l-1)	$(l-1)$	*$(l-1)$-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit an, deren Transformationen*
killing1889_F00179	10	0.902	l+1	$l+1$	*Untergruppe ist, so gehört sie einer aus mindestens $l+1$ Gliedern ge-*
killing1889_F00180	11	0.886	p=1	$p=1$	*bildeten Untergruppe an, für welche $p=1$ ist und welche eine l-gliedrige*
killing1889_F00181	11	0.863	\left(\xi_{1} \ldots \xi_{r}\right)	$(\xi_1 \ldots \xi_r)$	um zu dem gegebenen System $(\eta_1 \ldots \eta_r)$ ein System $(\zeta_1 \ldots \zeta_r)$ zu
killing1889_F00182	11	0.684	\gamma_{i x} \mid	$\gamma_{ix} \mid$	$\gamma_{ix}\rvert$ identisch, so kann man $k-1$ Systeme $(\eta') \ldots (\eta^{(k-1)})$ finden,
killing1889_F00183	11	0.684	k-1	$k-1$	$\gamma_{ix}\rvert$ identisch, so kann man $k-1$ Systeme $(\eta') \ldots (\eta^{(k-1)})$ finden,
killing1889_F00184	11	0.684	\left(\eta^{\prime}\right) \ldots\left(\eta^{(k-1)}\right)	$(\eta') \ldots \left(\eta^{(k-1)}\right)$	$\gamma_{ix}\rvert$ identisch, so kann man $k-1$ Systeme $(\eta') \ldots (\eta^{(k-1)})$ finden,
killing1889_F00185	11	0.829	l>1	$l > 1$	Diese Formeln führen uns dazu, für $l > 1$ nicht die eine Gleichung
killing1889_F00186	11	0.903	\left(\eta^{\prime}\right),\left(\eta^{\prime \prime} \right) \ldots\left(\eta^{(k-1)}\right)	$(\eta'), (\eta'') \ldots \left(\eta^{(k-1)}\right)$	(2) die (η'), $(\eta'') \ldots (\eta^{(k-1)})$ bestimmt sind, die weiteren:
killing1889_F00187	12	0.915	\left(\eta^{\prime}\right)	(η')	Gleichungen in sich abgeschlossen ist: geht man z. B. von (η') aus,
killing1889_F00188	12	0.920	(\eta),\left(\eta^{\prime \prime}\right) \ldots\left(\eta^{(k-1)}\right)	$(\eta), (\eta'') \ldots \left(\eta^{(k-1)}\right)$	so darf man damit (η), $(\eta'') \ldots (\eta^{(k-1)})$ in derselben Weise verbinden,
killing1889_F00189	12	0.391	(\eta)	(η)	wie man (η'), $(\eta'') \ldots (\eta^{(k-1)})$ mit (η) verbunden hat.
killing1889_F00190	12	0.367	\omega^{\prime} \ldots \omega^{(l-1)}	$\omega' \ldots \omega^{(l-1)}$	eingesetzt, liefert die entsprechenden Wurzeln $\omega' \ldots \omega^{(l-1)}$.
killing1889_F00191	12	0.507	\varkappa+1	$\varkappa + 1$	Ist ω_α eine $\varkappa+1$-fache Wurzel der ersten Gleichung, und ver-
killing1889_F00192	12	0.316	\left|\gamma_{i}-\delta_{i x} \omega_{\alpha}\right|	$\lvert\gamma_i - \delta_{ix}\omega_\alpha\rvert$	schwinden nicht alle Unterdeterminanten $r-1^{\text{ten}}$ Grades von $\lvert\gamma_{ix} - \delta_{ix}\omega_\alpha\rvert$,
killing1889_F00193	12	0.407	z+1-	$z+1-$	so muss auch jede der entsprechenden Wurzeln mindestens eine $\varkappa+1$-
killing1889_F00194	12	0.437	(\eta),\left(\eta^{\prime}\right)	$(\eta), (\eta')$	fache Wurzel ihrer Gleichung sein. Schliesst man für (η), (η') ... be-
killing1889_F00195	12	0.443	\omega_{\alpha}, \omega_{\alpha}^{\prime} \ldots \omega_{\alpha}^{(l-1)}	$\omega_\alpha, \omega'_\alpha \ldots \omega_\alpha^{(l-1)}$	Bilden $\omega_\alpha, \omega'_\alpha \ldots \omega_\alpha^{(l-1)}$ eine Reihe entsprechender Wurzeln der
killing1889_F00196	12	0.316	(\widetilde{\eta})	$(\widetilde{\eta})$	so bilde man $(\widetilde{\eta})$ als homogene lineare Function der (η), $(\eta') \ldots (\eta^{(l-1)})$,
killing1889_F00197	12	0.316	(\eta),\left(\eta^{\prime}\right) \ldots\left(\eta^{\prime \llcorner 1)}\right)	$(\eta), (\eta') \ldots \left(\eta'^{\llcorner 1)}\right)$	so bilde man $(\widetilde{\eta})$ als homogene lineare Function der (η), $(\eta') \ldots (\eta^{(l-1)})$,
killing1889_F00198	12	0.900	\varpi_{\alpha}	ϖ_α	Bezeichnet man nun mit $\overline{\omega}_\alpha$ die ω_α entsprechende Wurzel der Glei-
killing1889_F00199	12	0.698	\tilde{\eta}_{i}	$\tilde{\eta}_i$	wie $\overline{\eta}_i$ aus $\eta_i, \eta_i' \ldots \eta_i^{(l-1)}$, so dass ist:
killing1889_F00200	12	0.698	\eta_{i}, \eta_{i}^{\prime} \ldots \eta_{i}^{(l-1)}	$\eta_i, \eta_i' \ldots \eta_i^{(l-1)}$	wie $\overline{\eta}_i$ aus $\eta_i, \eta_i' \ldots \eta_i^{(l-1)}$, so dass ist:













































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00201	12	0.911	\left(X_{r} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha} f,\left(X_{r-1} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha}{ }^{\prime} X_{\alpha} f \ldots\left(X_{r-l+1} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha}^{(l-1)} X_{\alpha} f	$(X_r X_\alpha) = \omega_\alpha X_\alpha f, (X_{r-1} X_\alpha) = \omega_\alpha{}' X_\alpha f \ldots (X_{r-l+1} X_\alpha) = \omega_\alpha^{(l-1)} X_\alpha f$	
killing1889_F00202	13	0.714	\xi_{1}, \xi_{2}, \ldots	$\xi_1, \xi_2, \ldots$	
killing1889_F00203	13	0.274	\eta_{1}	η_1	
killing1889_F00204	13	0.643	\eta_{1} \ldots \eta	$\eta_1 \ldots \eta$	
killing1889_F00205	13	0.775	\omega^{\prime}	ω'	
killing1889_F00206	13	0.775	\eta^{\prime}	η'	
killing1889_F00207	13	0.916	p_{0}, p_{1}, \ldots p_{i-1}	$p_0, p_1, \ldots p_{i-1}$	
killing1889_F00208	13	0.801	r-l+1^{100}	$r - l + 1^{100}$	
killing1889_F00209	13	0.913	r-l^{\text {ten }}	$r - l^{\text{ten}}$	
killing1889_F00210	13	0.913	\left|\gamma_{t x}\right|	$\lvert\gamma_{tx}\rvert$	
killing1889_F00211	13	0.908	r-l	$r - l$	
killing1889_F00212	13	0.902	p	p	
killing1889_F00213	13	0.889	\omega^{r}-\omega^{r-1} \psi_{1}+\omega^{r-2} \psi_{2}-\cdots-0	$\omega^r - \omega^{r-1}\psi_1 + \omega^{r-2}\psi_2 - \cdots - 0$	
killing1889_F00214	13	0.556	X_{r-1} f \ldots X_{r-4+1} f	$X_{r-1} f \ldots X_{r-4+1} f$	
killing1889_F00215	13	0.884	X_{1} f, X_{2} f \ldots X_{r-l} f	$X_1 f, X_2 f \ldots X_{r-l} f$	
killing1889_F00216	13	0.897	\alpha=1 \ldots r-l	$\alpha = 1 \ldots r - l$	
killing1889_F00217	14	0.737	(\eta),\left(\eta^{\prime}\right) \ldots\left(\eta^{(L-1)}\right)	$(\eta), (\eta') \ldots \left(\eta^{(L-1)}\right)$	
killing1889_F00218	14	0.737	\xi_{1}: \xi_{2}: \ldots: \xi	$\xi_1 : \xi_2 : \ldots : \xi$	
killing1889_F00219	14	0.921	(r, \alpha, \beta),(r-1, \alpha, \beta) \ldots	$(r, \alpha, \beta), (r-1, \alpha, \beta) \ldots$	
killing1889_F00220	14	0.909	\alpha, \beta, \gamma \ldots	$\alpha, \beta, \gamma \ldots$	
killing1889_F00221	14	0.909	1 \ldots r-l	$1 \ldots r - l$	
killing1889_F00222	14	0.913	\varrho, \sigma	ϱ, σ	
killing1889_F00223	14	0.913	r-l+1 \ldots r	$r - l + 1 \ldots r$	
killing1889_F00224	14	0.899	\beta	β	
killing1889_F00225	14	0.941	\left(X_{\alpha} X_{\beta}\right)	$(X_\alpha X_\beta)$	
killing1889_F00226	14	0.912	X_{1} f \ldots X_{r-l} f	$X_1 f \ldots X_{r-l} f$	
killing1889_F00227	14	0.919	X_{r-41} f \ldots X_{r} f	$X_{r-41} f \ldots X_r f$	
killing1889_F00228	14	0.944	X_{\alpha} f	$X_\alpha f$	
killing1889_F00229	14	0.890	X_{p} f	$X_p f$	
killing1889_F00230	14	0.920	\mathrm{X}_{\alpha} f	$\mathrm{X}_\alpha f$	
killing1889_F00231	14	0.921	X_{\beta} f	$X_\beta f$	
killing1889_F00232	14	0.488	\left(X_{r} X_{\alpha}\right) \ldots\left(X_{r-4+1} X_{\alpha}\right)	$(X_r X_\alpha) \ldots (X_{r-4+1} X_\alpha)$	
killing1889_F00233	14	0.488	X_{1} f \ldots X_{r-i} f	$X_1 f \ldots X_{r-i} f$	
killing1889_F00234	14	0.926	p=r	$p = r$	
killing1889_F00235	14	0.908	\alpha, \beta=1 \ldots r-l	$\alpha, \beta = 1 \ldots r - l$	
killing1889_F00236	14	0.908	X_{r-l+1} f \ldots X_{r} f	$X_{r-l+1} f \ldots X_r f$	
killing1889_F00237	14	0.915	l^{2}	l^2	
killing1889_F00238	14	0.915	c_{\alpha \beta \varrho}	$c_{\alpha\beta\varrho}$	
killing1889_F00239	14	0.898	1 \ldots r-l, \varrho, \sigma	$1 \ldots r - l, \varrho, \sigma$	
killing1889_F00240	14	0.627	\iota, x, \lambda \ldots \iota^{\prime}, x^{\prime}, \lambda^{\prime} \ldots	$\iota, x, \lambda \ldots \iota', x', \lambda' \ldots$	
killing1889_F00241	14	0.922	1 \ldots 2 l	$1 \ldots 2l$	
killing1889_F00242	14	0.887	\left(X_{i} X_{i}\right)	$(X_i X_i)$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00243	14	0.887	`X_{r-4+1} f \ldots X_{r} f`	$X_{r-4+1}f \dots X_r f$	
killing1889_F00244	14	0.910	`\omega_{.}+\omega_{i}=0`	$\omega_{.} + \omega_i = 0$	
killing1889_F00245	14	0.910	`\nu`	ν	
killing1889_F00246	14	0.637	`0 \ldots l-1`	$0 \dots l-1$	
killing1889_F00247	15	0.909	`e^{(v)}`	$e^{(v)}$	
killing1889_F00248	15	0.890	`\left(\iota, \iota^{\prime}, \alpha\right)`	(ι, ι', α)	
killing1889_F00249	15	0.880	`2(r-l)`	$2(r-l)$	
killing1889_F00250	15	0.724	`\omega_{\alpha}^{(\gamma)}+\omega_{\iota}^{(\gamma)}`	$\omega_{\alpha}^{(\gamma)} + \omega_{\iota}^{(\gamma)}$	
killing1889_F00251	15	0.724	`\omega_{\alpha}^{(\gamma)}-\omega_{\iota}^{(\gamma)}`	$\omega_{\alpha}^{(\gamma)} - \omega_{\iota}^{(\gamma)}$	
killing1889_F00252	15	0.724	`\omega_{\alpha}^{(\gamma)}+\omega_{i}^{(\gamma)}`	$\omega_{\alpha}^{(\gamma)} + \omega_{i}^{(\gamma)}$	
killing1889_F00253	15	0.556	`\omega_{\alpha}^{(\gamma)}-\omega_{i}^{(\gamma)}`	$\omega_{\alpha}^{(\gamma)} - \omega_{i}^{(\gamma)}$	
killing1889_F00254	15	0.754	`\iota`	ι	
killing1889_F00255	15	0.754	`{ }^{\prime}`	$'$	
killing1889_F00256	15	0.391	`e_{\iota} \omega_{u}+\cdots+e_{\iota}^{(l-1)} \omega_{ \alpha}^{(L-1)}`	$e_\iota \omega_u + \dots + e_\iota^{(l-1)} \omega_\alpha^{(L-1)}$	
killing1889_F00257	15	0.608	`\omega_{i}^{(\gamma)}`	$\omega_i^{(\gamma)}$	
killing1889_F00258	15	0.608	`\omega_{a}^{(\gamma)}`	$\omega_a^{(\gamma)}$	
killing1889_F00259	15	0.884	`\omega_{i}^{(\nu)}`	$\omega_i^{(\nu)}$	
killing1889_F00260	15	0.924	`\alpha_{0}, \alpha_{1} \ldots \alpha_{x}`	$\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_x$	
killing1889_F00261	15	0.924	`\alpha_{0}`	α_0	
killing1889_F00262	15	0.914	`\varepsilon=\alpha_{1}`	$\varepsilon = \alpha_1$	
killing1889_F00263	15	0.914	`\alpha_{1}`	α_1	
killing1889_F00264	15	0.927	`\varepsilon=\alpha_{2}`	$\varepsilon = \alpha_2$	
killing1889_F00265	15	0.927	`\varepsilon=\alpha_{0}`	$\varepsilon = \alpha_0$	
killing1889_F00266	15	0.916	`\alpha_{x}`	α_x	
killing1889_F00267	15	0.896	`\varepsilon=\alpha_{x-1}`	$\varepsilon = \alpha_{x-1}$	
killing1889_F00268	15	0.889	`\varkappa`	$\varkappa$	
killing1889_F00269	15	0.860	`\alpha_{1}, \alpha_{2} \ldots \alpha_{x}`	$\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_x$	
killing1889_F00270	15	0.860	`x-2, x-4, \ldots,-x`	$x-2, x-4, \dots, -x$	
killing1889_F00271	16	0.823	`\omega_{\alpha} \ldots \omega_{\alpha}^{(l-1)}`	$\omega_\alpha \dots \omega_\alpha^{(l-1)}$	
killing1889_F00272	16	0.553	`a_{a c}`	a_{ac}	
killing1889_F00273	16	0.671	`a_{a u}`	a_{au}	
killing1889_F00274	16	0.671	`\omega_{\alpha}^{(\eta)}+a \omega_{c}^{(\eta)}`	$\omega_\alpha^{(\eta)} + a\omega_c^{(\eta)}$	
killing1889_F00275	16	0.543	`\mathfrak{b}`	$\mathfrak{b}$	
killing1889_F00276	16	0.543	`a_{\alpha_{i}}`	a_{α_i}	
killing1889_F00277	16	0.487	`\omega_{\alpha}+\mathfrak{b} \omega_{\imath}`	$\omega_\alpha + \mathfrak{b}\omega_\imath$	
killing1889_F00278	16	0.487	`\mathfrak{b}+\mathfrak{c}=a_{\alpha \imath}`	$\mathfrak{b} + \mathfrak{c} = a_{\alpha\imath}$	
killing1889_F00279	16	0.670	`\omega_{\alpha}+c \omega_{i}`	$\omega_\alpha + c\omega_i$	
killing1889_F00280	16	0.914	`\mathfrak{d}`	$\mathfrak{d}$	
killing1889_F00281	16	0.914	`\mathfrak{c}`	$\mathfrak{c}$	
killing1889_F00282	16	0.205	`\mathfrak{e}`	$\mathfrak{e}$	
killing1889_F00283	16	0.205	`\omega_{\alpha}+\delta \omega_{\iota}`	$\omega_\alpha + \delta\omega_\iota$	
killing1889_F00284	16	0.205	`\omega_{\alpha}+\mathrm{e} \omega_{c}`	$\omega_\alpha + \mathrm{e}\omega_c$	
killing1889_F00285	16	0.510	`a_{\alpha \iota}=0`	$a_{\alpha\iota} = 0$	
killing1889_F00286	16	0.510	`\omega_{\alpha}^{(\nu)}`	$\omega_\alpha^{(\nu)}$	
killing1889_F00287	16	0.510	`\omega_{\iota}^{(\nu)}`	$\omega_\iota^{(\nu)}$	
killing1889_F00288	16	0.631	`\omega_{\alpha}^{(\gamma)}+\mathfrak{a} \omega_{\iota}^{( \gamma)}`	$\omega_\alpha^{(\gamma)} + \mathfrak{a}\omega_\iota^{(\gamma)}$	














































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00289	16	0.631	\omega_{\alpha}^{(\gamma)}-\mathfrak{a} \omega_{c}^{(\gamma)}	$\omega_\alpha^{(\gamma)} - \mathfrak{a}\omega_c^{(\gamma)}$	auch $\omega_\alpha^{(\nu)} + \mathfrak{a}\omega_\iota^{(\nu)}$ eine Wurzel ist, so muss es auch $\omega_\alpha^{(\nu)} - \mathfrak{a}\omega_\iota^{(\nu)}$, sowie
killing1889_F00290	16	0.493	\omega_{\alpha}^{(\gamma)} \pm \mathfrak{b} \omega_{i}^{(\gamma)}	$\omega_\alpha^{(\gamma)} \pm \mathfrak{b}\omega_i^{(\gamma)}$	$\omega_\alpha^{(\nu)} \pm \mathfrak{b}\omega_\iota^{(\nu)}$ sein, wenn $\mathfrak{b}$ zwischen 0 und $\mathfrak{a}$ liegt.
killing1889_F00291	16	0.493	\mathfrak{a}	$\mathfrak{a}$	$\omega_\alpha^{(\nu)} \pm \mathfrak{b}\omega_\iota^{(\nu)}$ sein, wenn $\mathfrak{b}$ zwischen 0 und $\mathfrak{a}$ liegt.
killing1889_F00292	16	0.883	\alpha=\iota	$\alpha = \iota$	In der Gleichung (7) kann man auch $\alpha = \iota$ wählen, wenn man
killing1889_F00293	16	0.917	a_{u}=-2	$a_u = -2$	$a_{\iota\varkappa} = -2$ setzt.
killing1889_F00294	16	0.733	e_{i}^{(\nu)}	$e_i^{(\nu)}$	Da die Determinante der $e_\iota^{(\nu)}$ nicht verschwindet, so lassen sich
killing1889_F00295	16	0.911	g_{i v}	g_{iv}	Coefficienten $g_{\iota\nu}$ so bestimmen, dass ist:
killing1889_F00296	16	0.788	=1 \ldots l	$= 1 \dots l$	Hier darf man α auch $= 1 \dots l$ setzen, wobei die $g_\iota^{(\nu)}$ sich nicht
killing1889_F00297	16	0.788	g_{i}^{(v)}	$g_i^{(v)}$	Hier darf man α auch $= 1 \dots l$ setzen, wobei die $g_\iota^{(\nu)}$ sich nicht
killing1889_F00298 **[conf 0.089]**	17	0.089	\left|\begin{array}{cccc}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{22} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{22}\end{array}\right|	$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{22} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{22} \end{vmatrix}$	Wenn jetzt die Determinante $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2l} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{l1} & a_{l2} & \dots & a_{ll} \end{vmatrix}$ nicht verschwindet,
killing1889_F00299	17	0.792	h_{a 1} \ldots h_{a t}	$h_{a1} \dots h_{at}$	so lassen sich rationale Zahlen $h_{\alpha 1} \dots h_{\alpha l}$ so finden, dass ist
killing1889_F00300	17	0.515	\omega_{i}^{(v)}	$\omega_i^{(v)}$	Gruppe darstellt, wofern nur die aus den l^2 Wurzeln $\omega_\iota^{(\nu)}$ gebildete
killing1889_F00301	17	0.926	a_{m}	a_m	Beim Beweise ist der Fall ausgeschlossen, dass die aus den $a_{\iota\varkappa}$
killing1889_F00302	17	0.919	\iota, x=1 \ldots l	$\iota, x = 1 \dots l$	für $\iota, \varkappa = 1 \dots l$ gebildete Determinante gleich Null ist. Der folgende
killing1889_F00303	17	0.564	\omega_{.}{ }^{(v)}	$\omega_\cdot^{(v)}$	Wurzeln $\omega_\iota^{(\nu)}$ für $\iota = 1 \dots l$, $\nu = 0 \dots l-1$ gebildete Determinante
killing1889_F00304	17	0.564	\iota=1 \ldots l, \nu=0 \ldots l-1	$\iota = 1 \dots l, \nu = 0 \dots l-1$	Wurzeln $\omega_\iota^{(\nu)}$ für $\iota = 1 \dots l$, $\nu = 0 \dots l-1$ gebildete Determinante
killing1889_F00305	18	0.696	a_{\text {ax }}	a_{ax}	Eigenschaften des aus den $a_{\iota\varkappa}$ gebildeten Systems.
killing1889_F00306	18	0.847	a_{4 x}	a_{4x}	Hier tritt ein System von l^2 Coefficienten $a_{\iota\varkappa}$ auf, wenn die Marken
killing1889_F00307	18	0.920	a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{l}=-2	$a_{11} = a_{22} = \dots = a_l = -2$	$\iota, \varkappa$ die Reihe $1 \dots l$ durchlaufen. Dabei ist $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{ll} = -2$.
killing1889_F00308	18	0.938	a_{\mathrm{tx}}	a_{tx}	$a_{\iota\varkappa}$ bestimmte Beziehungen bestehen. Wir wollen nur diejenigen
killing1889_F00309	18	0.924	m_{1} \omega_{1}+\cdots+m_{l} \omega_{l}	$m_1\omega_1 + \dots + m_l\omega_l$	Es sei also $m_1\omega_1 + \dots + m_l\omega_l$ eine beliebige Wurzel, wo die
killing1889_F00310	18	0.914	m_{1} \ldots m_{\imath}	$m_1 \dots m_\imath$	$m_1 \dots m_\iota$ ganze Zahlen mit Einschluss von Null sind. Man setze
killing1889_F00311	18	0.911	\omega_{1}	ω_1	diese Wurzel statt ω_α in die Gleichung (7) § 12 ein und nehme ω_1
killing1889_F00312	18	0.426	a_{\alpha}	a_α	statt ω_ι. An Stelle der Zahl $a_{\alpha\iota}$ gelangt man dann zu der Zahl:
killing1889_F00313	18	0.889	\Sigma m_{i} \omega_{i}	$\Sigma m_i\omega_i$	Somit muss mit $\Sigma m_\iota \omega_\iota$ mindestens die Wurzel $\Sigma m_\iota' \omega_\iota$ vorhanden
killing1889_F00314	18	0.889	\Sigma m_{i}^{\prime} \omega_{i}	$\Sigma m_i'\omega_i$	Somit muss mit $\Sigma m_\iota \omega_\iota$ mindestens die Wurzel $\Sigma m_\iota' \omega_\iota$ vorhanden
killing1889_F00315	18	0.943	\omega_{2}	ω_2	ist. Auf diese Wurzel wendet man dieselbe Betrachtung an für ω_2,
killing1889_F00316	18	0.421	a_{\alpha c}	$a_{\alpha c}$	wobei die Zahl $a_{\alpha 2}$ ist $= \Sigma m_\iota' a_{\iota 2}$, und daher kommt noch mindestens
killing1889_F00317	18	0.421	=\Sigma m_{i}^{\prime} a_{i 2}	$= \Sigma m_i' a_{i2}$	wobei die Zahl $a_{\alpha 2}$ ist $= \Sigma m_\iota' a_{\iota 2}$, und daher kommt noch mindestens
killing1889_F00318	18	0.887	\Sigma m_{.}^{\prime \prime} \omega_{t}	$\Sigma m_\cdot'' \omega_t$	die Wurzel vor: $\Sigma m_\iota'' \omega_\iota$, wo ist
killing1889_F00319	18	0.928	a_{\alpha 3}	$a_{\alpha 3}$	Für die gefundene Wurzel suche man die Zahl $a_{\alpha 3}$ in Bezug auf ω_3
killing1889_F00320	18	0.928	\omega_{3}	ω_3	Für die gefundene Wurzel suche man die Zahl $a_{\alpha 3}$ in Bezug auf ω_3
killing1889_F00321	18	0.917	\Sigma m_{x}^{\prime \prime} \omega_{x}	$\Sigma m_x'' \omega_x$	und schliesse auf das Vorhandensein einer Wurzel $\Sigma m_\varkappa''' \omega_\varkappa$, u. s. w.
killing1889_F00322	18	0.866	\Sigma m_{x}^{(1-1)} \omega_{x}	$\Sigma m_x^{(1-1)} \omega_x$	Nachdem man so auf eine Wurzel $\Sigma m_\varkappa^{(\iota-1)} \omega_\varkappa$ gekommen ist, sucht man
killing1889_F00323	18	0.538	\omega_{l}	ω_l	für sie die dem $a_{\alpha\iota}$ entsprechende Zahl in Bezug auf ω_l und schliesst
killing1889_F00324	18	0.501	\Sigma m_{x}^{(1)} \omega_{x}	$\Sigma m_x^{(1)} \omega_x$	dann auf das Vorhandensein der Wurzel $\Sigma m_\varkappa^{(l)} \omega_\varkappa$, wo ist:
killing1889_F00325	19	0.189	{ }_{\text {x }}	x	*Sobald die charakteristische Gleichung eine Wurzel $\Sigma m_\varkappa \omega_\varkappa$ hat,*
killing1889_F00326	19	0.180	\Sigma b w_{x}, w_{x}	$\Sigma b w_x, w_x$	*besitzt sie zum mindesten noch eine weitere Wurzel $\Sigma b_{\iota\varkappa} m_\iota \omega_\varkappa$, wo sich*
killing1889_F00327	19	0.514	b_{\mathrm{ax}}	b_{ax}	*die Coefficienten $b_{\iota\varkappa}$ nach folgenden Regeln berechnen lassen:*
killing1889_F00328	19	0.899	\bar{m}_{x}, \overline{\bar{m}}_{x}	$\bar{m}_x, \overline{\bar{m}}_x$	$\bar{m}_\varkappa$, $\overline{\bar{m}}_\varkappa$ u. s. w. welche man durch wiederholte Anwendung der Sub-
killing1889_F00329	19	0.323	b_{i}	b_i	Die Substitution $b_{\iota\varkappa}$ muss also, beliebig oft wiederholt, nur eine end-
killing1889_F00330	19	0.907	m_{x}	m_x	liche Zahl von Systemen $m_\varkappa$ liefern, oder da die Determinante der
killing1889_F00331	19	0.381	b_{i x}	b_{ix}	$b_{\iota\varkappa}$, wie man leicht sieht und unten noch besonders gezeigt werden
killing1889_F00332	19	0.321	b_{\mathrm{ix}}	b_{ix}	Soll die Substitution $b_{\iota\varkappa}$ nach μ-facher Wiederholung in die identische











































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00333	19	0.321	`\mu`	μ	Soll die Substitution $b_{\iota\varkappa}$ nach μ-facher Wiederholung in die identische
killing1889_F00334	19	0.559	`s`	s	nur für solche Werthe von s, welche μ^{te} Wurzeln der Einheit sind,
killing1889_F00335	19	0.559	`\mu^{\mathrm{t}}`	μ^{t}	nur für solche Werthe von s, welche μ^{te} Wurzeln der Einheit sind,
killing1889_F00336	19	0.918	`(l-1)^{\text {ten }}`	$(l-1)^{\text{ten}}$	Determinanten der $(l-1)^{ten}$ Ordnung, durch die Determinante dividirt,
killing1889_F00337	20	0.912	`b_{t x}`	b_{tx}	Gleichwie die durch die Coefficienten $b_{\iota\varkappa}$ für $\iota, \varkappa = 1 \cdots l$ be-
killing1889_F00338	20	0.912	`\iota, x=1 \cdots l`	$\iota, x = 1 \cdots l$	Gleichwie die durch die Coefficienten $b_{\iota\varkappa}$ für $\iota, \varkappa = 1 \cdots l$ be-
killing1889_F00339	20	0.922	`l-\lambda`	$l - \lambda$	für welche die Marken $\iota, \varkappa$ auf die $l - \lambda$ ersten Zahlen $1 \ldots l - \lambda$
killing1889_F00340	20	0.922	`1 \ldots l-\lambda`	$1 \ldots l - \lambda$	für welche die Marken $\iota, \varkappa$ auf die $l - \lambda$ ersten Zahlen $1 \ldots l - \lambda$
killing1889_F00341	20	0.868	`s-e^{\frac{2 k \pi i}{\mu}}`	$s - e^{\frac{2k\pi i}{\mu}}$	*Form* $s - e^{\frac{2k\pi i}{\mu}}$ *haben, wo* k *und* μ *ganze Zahlen sind; ferner muss*
killing1889_F00342	20	0.546	`\lambda=1 \ldots l-2)`	$\lambda = 1 \ldots l - 2)$	$\lambda = 1 \ldots l - 2$) *Verticalreihen erhalten wird, denselben beiden Be-*
killing1889_F00343	20	0.907	`\left|b_{t x}-\delta_{t x} s\right|`	$\left\|b_{tx} - \delta_{tx} s\right\|$	Subtrahirt man in der Determinante $\|b_{\iota\varkappa} - \delta_{\iota\varkappa} s\|$ von der l^{ten},
killing1889_F00344	20	0.907	`l^{\text {ten }}`	l^{ten}	Subtrahirt man in der Determinante $\|b_{\iota\varkappa} - \delta_{\iota\varkappa} s\|$ von der l^{ten},
killing1889_F00345	20	0.756	`(l-1)^{\text {ton }} \ldots 2^{\text {ten }}`	$(l-1)^{\text{ton}} \ldots 2^{\text{ten}}$	$(l-1)^{ten} \ldots 2^{ten}$ Horizontalreihe die mit gewissen Factoren multiplicirten
killing1889_F00346	20	0.911	`\frac{1}{s}`	$\frac{1}{s}$	Ersetzt man in dieser Determinante s durch $\frac{1}{s}$ und multiplicirt
killing1889_F00347	20	0.489	`s^{d}`	s^d	mit s^l, so werden die Glieder der Diagonale ungeändert bleiben;
killing1889_F00348	20	0.910	`\left|b_{x x}\right|`	$\left\|b_{xx}\right\|$	Determinante $\|b_{\iota\varkappa}\|$ den Werth $(-1)^l$ hat. Schreibt man die Deter-
killing1889_F00349	20	0.910	`(-1)^{i}`	$(-1)^i$	Determinante $\|b_{\iota\varkappa}\|$ den Werth $(-1)^l$ hat. Schreibt man die Deter-
killing1889_F00350	20	0.864	`M_{l-k}`	M_{l-k}	so wird jeder Coefficient M_{l-k} aus M_k dadurch erhalten, dass man
killing1889_F00351	20	0.864	`M_{k}`	M_k	so wird jeder Coefficient M_{l-k} aus M_k dadurch erhalten, dass man
killing1889_F00352	21	0.894	`a_{k x}`	a_{kx}	jedes in M_k enthaltene $a_{\varkappa\iota}$ durch $a_{\varkappa_1}$ ersetzt. Um z. B. den Coef-
killing1889_F00353	21	0.905	`M_{1}`	M_1	ficienten M_1 anzugeben, setze man fest, dass für jedes ϱ sein soll
killing1889_F00354	21	0.905	`\rho`	ρ	ficienten M_1 anzugeben, setze man fest, dass für jedes ϱ sein soll
killing1889_F00355	21	0.824	`M_{i-1}`	M_{i-1}	Dann wird M_{l-1} erhalten, wenn man jedes $a_{\iota\varkappa}$ mit $a_{\varkappa_1}$ vertauscht;
killing1889_F00356 **[conf 0.050]**	21	0.050	`a_{i_{1} i_{2}} a_{i_{2} i_{3}} a_{i_{4} i_{2}} \ldots a_{i_{1} i_{2}}`	$a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} a_{i_4 i_2} \ldots a_{i_1 i_2}$	Jedes M_k besteht aus Aggregaten der Form $a_{\iota_1\iota_2} a_{\iota_3\iota_4} a_{\iota_5\iota_6} \ldots a_{\iota_{\varrho}\iota_1}$,
killing1889_F00357	21	0.574	`\iota_{1} \ldots \iota_{4}`	$\iota_1 \ldots \iota_4$	wo die vorstehende Bedingung wegen der Grösse der Marken $\iota_1 \ldots \iota_{\varrho}$
killing1889_F00358	21	0.924	`\alpha+\beta i`	$\alpha + \beta i$	Wenn der Ausdruck (5) für $\alpha + \beta i$ verschwindet, so muss er
killing1889_F00359	21	0.917	`\alpha-\beta i=\frac{1}{\alpha+\beta i}`	$\alpha - \beta i = \frac{1}{\alpha + \beta i}$	auch für $\alpha - \beta i = \frac{1}{\alpha+\beta i}$ gleich Null werden. Demnach ist für jedes
killing1889_F00360	21	0.852	`M_{k}=M_{l-k}`	$M_k = M_{l-k}$	k nothwendig $M_k = M_{l-k}$. Da dasselbe auch für jedes aus weniger
killing1889_F00361	21	0.577	`\iota_{1} \iota_{2} \ldots`	$\iota_1 \iota_2 \ldots$	$\iota_1 \iota_2 \ldots$ erfüllt sind, so ist auch jedes $M_k = M_{l-k}$.
killing1889_F00362	21	0.577	`M_{k}=M_{i-k}`	$M_k = M_{i-k}$	$\iota_1 \iota_2 \ldots$ erfüllt sind, so ist auch jedes $M_k = M_{l-k}$.
killing1889_F00363	21	0.904	`s^{1}+M_{1} s^{1-1}+\cdots+1=0`	$s^1 + M_1 s^{1-1} + \cdots + 1 = 0$	Wenn die Gleichung $s^l + M_1 s^{l-1} + \cdots + 1 = 0$ eine Wurzel
killing1889_F00364	21	0.920	`=+1`	$= +1$	$= +1$ hat, so muss dieselbe eine Doppelwurzel sein. Somit müssen
killing1889_F00365	21	0.404	`\left\{b_{c x}-\delta_{c x} s \mid\right.`	$\{b_{cx} - \delta_{cx} s \mid$	$\|b_{\iota\varkappa} - \delta_{\iota\varkappa} s\|$ verschwinden, speciell der Coefficient von $b_{\iota\iota} - s$. Dieser
killing1889_F00366	21	0.404	`b_{u}-s`	$b_u - s$	$\|b_{\iota\varkappa} - \delta_{\iota\varkappa} s\|$ verschwinden, speciell der Coefficient von $b_{\iota\iota} - s$. Dieser
killing1889_F00367	21	0.941	`s=1`	$s = 1$	auch hierin $s = 1$ eine Doppelwurzel sein. Indem man diese Be-
killing1889_F00368	21	0.935	`b_{11}-s`	$b_{11} - s$	$b_{11} - s$ oder $-1 - s$ für $s = 1$ verschwindet, was nicht angeht.
killing1889_F00369	21	0.935	`-1-s`	$-1 - s$	$b_{11} - s$ oder $-1 - s$ für $s = 1$ verschwindet, was nicht angeht.
killing1889_F00370	22	0.913	`\left|a_{i x}\right|`	$\left\|a_{ix}\right\|$	Für $s = 1$ geht die genannte Determinante in $\|a_{\iota\varkappa}\|$ über. Folglich
killing1889_F00371	22	0.910	`\left|a_{t x}\right|`	$\left\|a_{tx}\right\|$	Grenzen für die Determinante $\|a_{\iota\varkappa}\|$ anzugeben. Da die Function
killing1889_F00372	22	0.504	`s^{t}+M_{1} s^{t-1}+\cdots+1`	$s^t + M_1 s^{t-1} + \cdots + 1$	$s^l + M_1 s^{l-1} + \cdots + 1$ nur für Wurzeln der Einheit verschwindet,
killing1889_F00373	22	0.927	`2^{l}`	2^l	so muss ihr Werth für $s = 1$ zwischen 0 und 2^l eingeschlossen sein.
killing1889_F00374	22	0.839	`a_{c x}`	a_{cx}	*Die Determinante aus den Coefficienten* $a_{\iota\varkappa}$ *liegt zwischen* $(-2)^l$





































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00375	22	0.839	`(-2)^{4}`	$(-2)^4$	
killing1889_F00376	22	0.893	`\rho(<l)`	$\rho(<l)$	
killing1889_F00377	22	0.922	`\iota_{1} \ldots \iota_{e}`	$\iota_1 \dots \iota_e$	
killing1889_F00378	22	0.922	`\varrho^{2}`	ϱ^2	
killing1889_F00379	22	0.922	`a_{x z}`	a_{xz}	
killing1889_F00380	22	0.553	`\iota_{1} \ldots \iota_{\rho}`	$\iota_1 \dots \iota_\rho$	
killing1889_F00381	22	0.538	`{ }^{\mathrm{e}}`	^{e}	
killing1889_F00382	22	0.898	`\varrho=2`	$\varrho = 2$	
killing1889_F00383	22	0.859	`a_{i x} a_{x i}`	$a_{ix} a_{xi}$	
killing1889_F00384	22	0.859	`0,1,2,3`	$0, 1, 2, 3$	
killing1889_F00385	22	0.706	`a_{x t}`	a_{xt}	
killing1889_F00386	22	0.835	`\Sigma m_{c} \omega_{c}`	$\Sigma m_c \omega_c$	
killing1889_F00387	22	0.785	`b_{a}`	b_a	
killing1889_F00388	22	0.921	`\left|b_{t x}-\delta_{t x} s\right|=0`	$\left\|b_{tx} - \delta_{tx} s\right\| = 0$	
killing1889_F00389	23	0.168	`\mu^{\iota}{ }^{6}`	$\mu^{\iota 6}$	
killing1889_F00390	23	0.673	`s^{n}-1`	$s^n - 1$	
killing1889_F00391	23	0.456	`t_{1}, t_{2} \cdots t_{e}`	$t_1, t_2 \cdots t_e$	
killing1889_F00392	23	0.908	`t_{1}, t_{2} \ldots t_{\rho}`	$t_1, t_2 \dots t_\rho$	
killing1889_F00393	23	0.908	`\rho^{2}`	ρ^2	
killing1889_F00394	23	0.563	`\pm \omega_{i_{i}} \cdots \pm \omega_{i_{i}}`	$\pm\omega_{i_i} \cdots \pm \omega_{i_i}$	
killing1889_F00395	23	0.441	`\omega_{1} \ldots \omega_{l}`	$\omega_1 \dots \omega_l$	
killing1889_F00396	23	0.922	`2 \rho`	2ρ	
killing1889_F00397	23	0.598	`a_{\alpha}=0`	$a_\alpha = 0$	
killing1889_F00398	23	0.598	`a_{x_{4}}=0`	$a_{x_4} = 0$	
killing1889_F00399	23	0.241	`\iota_{1}, \iota_{2}, \iota_{3} . . .`	$\iota_1, \iota_2, \iota_3 \dots$	
killing1889_F00400	23	0.863	`a_{t_{1}}, a_{t_{2}}, a_{t_{3}} \ldots`	$a_{t_1}, a_{t_2}, a_{t_3} \dots$	
killing1889_F00401	23	0.863	`\iota, \iota_{1}, \iota_{2} \ldots`	$\iota, \iota_1, \iota_2 \dots$	
killing1889_F00402	23	0.276	`\iota_{1}, \iota_{1}, \iota_{2} \ldots`	$\iota_1, \iota_1, \iota_2 \dots$	
killing1889_F00403	23	0.276	`\iota_{11}, \iota_{12} \ldots`	$\iota_{11}, \iota_{12} \dots$	
killing1889_F00404	23	0.276	`a_{i_{1} i_{11}}, a_{i_{1} i_{22}} . .`	$a_{i_1 i_{11}}, a_{i_1 i_{22}} ..$	
killing1889_F00405	23	0.113	`t_{21}, t_{22} \ldots`	$t_{21}, t_{22} \dots$	
killing1889_F00406	23	0.113	`a_{t_{2} t_{x}}, a_{t_{2} t_{2}} . .`	$a_{t_2 t_x}, a_{t_2 t_2} ..$	
killing1889_F00407	24	0.184	`a_{l_{2}}, a_{l_{2}} \ldots a_{l_{i}, L_{1}}`	$a_{l_2}, a_{l_2} \dots a_{l_i, L_1}$	
killing1889_F00408	24	0.926	`(l-1)^{\text {ter }}`	$(l-1)^{\text{ter}}$	
killing1889_F00409	24	0.598	`m_{\mathrm{i}}`	m_{i}	
killing1889_F00410	24	0.540	`\omega_{i_{1}}, \omega_{i_{2}} \ldots`	$\omega_{i_1}, \omega_{i_2} \dots$	
killing1889_F00411	24	0.540	`m_{i}`	m_i	
killing1889_F00412	24	0.540	`m_{i_{1}}, m_{i_{2}} \ldots`	$m_{i_1}, m_{i_2} \dots$	
killing1889_F00413	24	0.925	`m_{t_{1}}, m_{t_{2}}`	m_{t_1}, m_{t_2}	
killing1889_F00414	24	0.912	`2 l`	$2l$	
killing1889_F00415	24	0.912	`\omega_{1},-\omega_{1} \ldots \omega_{l},-\omega_{l}`	$\omega_1, -\omega_1 \dots \omega_l, -\omega_l$	
killing1889_F00416	24	0.918	`m_{1} \omega_{1}+m_{2} \omega_{2}+\cdots+m_{l} \omega_{l}`	$m_1\omega_1 + m_2\omega_2 + \cdots + m_l\omega_l$	
killing1889_F00417	24	0.293	`a_{\iota \varkappa}`	$a_{\iota\varkappa}$	
killing1889_F00418	24	0.914	`\omega_{\alpha_{1}}`	ω_{α_1}	
killing1889_F00419	24	0.914	`\omega_{\alpha_{2}}`	ω_{α_2}	
killing1889_F00420	24	0.914	`a_{\alpha_{1} \alpha_{2}}`	$a_{\alpha_1\alpha_2}$	
killing1889_F00421	24	0.914	`a_{\alpha_{2} \alpha_{1}}`	$a_{\alpha_2\alpha_1}$	
killing1889_F00422	24	0.606	`a_{i x}^{\prime}`	a'_{ix}	
killing1889_F00423	24	0.776	`a_{c x}^{\prime}`	a'_{cx}	





































Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00424	24	0.907	`l=3`	$l = 3$	
killing1889_F00425	24	0.907	`a_{i x}=-1`	$a_{ix} = -1$	
killing1889_F00426	25	0.451	`\omega_{1} \ldots \omega_{i}`	$\omega_1 \dots \omega_i$	
killing1889_F00427	25	0.924	`\omega_{1}^{\prime} \ldots \omega_{i}^{\prime}`	$\omega_1' \dots \omega_i'$	
killing1889_F00428	25	0.379	`\omega_{1}^{\prime} \ldots \omega_{l}^{\prime}`	$\omega_1' \dots \omega_l'$	
killing1889_F00429	25	0.752	`a_{t x}^{\prime}`	a'_{tx}	
killing1889_F00430	25	0.766	`\$ 817`	$817	
killing1889_F00431	25	0.932	`l=2`	$l = 2$	
killing1889_F00432	25	0.932	`a_{12} a_{21}`	$a_{12} a_{21}$	
killing1889_F00433	25	0.909	`a_{12}=a_{21}=-1`	$a_{12} = a_{21} = -1$	
killing1889_F00434	25	0.903	`a_{12}=-1, a_{21}=-2`	$a_{12} = -1, a_{21} = -2$	
killing1889_F00435	25	0.869	`a_{12}=-1, a_{21}=-3`	$a_{12} = -1, a_{21} = -3$	
killing1889_F00436	25	0.902	`s^{2}+s+1`	$s^2 + s + 1$	
killing1889_F00437	25	0.902	`B`	B	
killing1889_F00438	25	0.902	`s^{2}+1`	$s^2 + 1$	
killing1889_F00439	25	0.902	`C`	C	
killing1889_F00440	25	0.902	`s^{2}-s+1`	$s^2 - s + 1$	
killing1889_F00441	25	0.901	`a_{13}, a_{31}, a_{23}, a_{32}`	$a_{13}, a_{31}, a_{23}, a_{32}$	
killing1889_F00442	26	0.916	`\iota, x=1 . . . l-1`	$\iota, x = 1 \dots l-1$	
killing1889_F00443	26	0.861	`\iota \gtrless x`	$\iota \gtrless x$	
killing1889_F00444	26	0.693	`a_{l k}`	a_{lk}	
killing1889_F00445	26	0.693	`a_{k l}`	a_{kl}	
killing1889_F00446	26	0.837	`a_{x l} a_{l x}`	$a_{xl} a_{lx}$	
killing1889_F00447	26	0.926	`a_{l x}=a_{l}`	$a_{lx} = a_l$	
killing1889_F00448	26	0.926	`a_{x l}=a_{l l}`	$a_{xl} = a_{ll}$	
killing1889_F00449	26	0.787	`\Delta`	Δ	
killing1889_F00450	26	0.911	`\frac{l-2}{2}`	$\frac{l-2}{2}$	
killing1889_F00451	26	0.915	`l>8`	$l > 8$	
killing1889_F00452	26	0.915	`0,1, l-3, l-2`	$0, 1, l-3, l-2$	
killing1889_F00453	26	0.889	`l<6`	$l < 6$	
killing1889_F00454	26	0.912	`l=6,7,8`	$l = 6, 7, 8$	
killing1889_F00455	26	0.912	`\alpha=2, l=3`	$\alpha = 2, l = 3$	
killing1889_F00456	26	0.902	`\alpha=0`	$\alpha = 0$	
killing1889_F00457	26	0.902	`=l-2`	$= l - 2$	
killing1889_F00458	26	0.916	`\alpha=0, m=1`	$\alpha = 0, m = 1$	
killing1889_F00459	26	0.928	`\omega_{1}, \omega_{2}, \ldots \omega_{l}, \omega_{1}-\omega_{2} \ldots \omega_{l}-\omega_{l} \ldots \omega_{l-1}-\omega_{l}`	$\omega_1, \omega_2, \dots \omega_l, \omega_1 - \omega_2 \dots \omega_l - \omega_l \dots \omega_{l-1} - \omega_l$	
killing1889_F00460	26	0.901	`\omega_{x}-\omega_{l}`	$\omega_x - \omega_l$	
killing1889_F00461	26	0.901	`a_{x l}^{\prime}=a_{l x}^{\prime}=-1`	$a'_{xl} = a'_{lx} = -1$	
killing1889_F00462	26	0.553	`x \geqslant \lambda`	$x \geqslant \lambda$	
killing1889_F00463	26	0.553	`a_{2 l}^{\prime}=a_{l i}^{\prime}=0`	$a'_{2l} = a'_{li} = 0$	
killing1889_F00464	26	0.553	`\alpha=l-2`	$\alpha = l - 2$	
killing1889_F00465	26	0.909	`m=1`	$m = 1$	
killing1889_F00466	26	0.893	`\alpha=0, m=2`	$\alpha = 0, m = 2$	
killing1889_F00467	26	0.463	`a_{i x}=-1, a_{x l}=-2`	$a_{ix} = -1, a_{xl} = -2$	
killing1889_F00468	27	0.890	`\omega_{1} \ldots \omega_{i}, \omega_{x}-\omega_{2}`	$\omega_1 \dots \omega_i, \omega_x - \omega_2$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00469	27	0.890	\omega_{i}-\omega_{x}, 2 \omega_{i}-\omega_{x}	$\omega_i - \omega_x, 2\omega_i - \omega_x$	$\omega_1 \ldots \omega_i$, $\omega_\varkappa - \omega_\lambda$ kommen dann noch hinzu: $\omega_i - \omega_\varkappa$, $2\omega_i - \omega_\varkappa$,
killing1889_F00470	27	0.897	2 \omega_{i}-\omega_{x}-\omega_{2}	$2\omega_i - \omega_x - \omega_2$	$2\omega_i - \omega_\varkappa - \omega_\lambda$. Die Ersetzung von ω_i durch $2\omega_i - \omega_\varkappa$ oder $2\omega_i - \omega_\varkappa - \omega_\lambda$
killing1889_F00471	27	0.897	2 \omega_{i}-\omega_{x}	$2\omega_i - \omega_x$	$2\omega_i - \omega_\varkappa - \omega_\lambda$. Die Ersetzung von ω_i durch $2\omega_i - \omega_\varkappa$ oder $2\omega_i - \omega_\varkappa - \omega_\lambda$
killing1889_F00472	27	0.705	a_{l x}	a_{lx}	ändert die a_{ix} und $a_{\varkappa i}$ nicht; wenn man aber statt ω_i die Wurzel
killing1889_F00473	27	0.445	-\omega_{i}+\omega_{x}	$-\omega_i + \omega_x$	$-\omega_i + \omega_\varkappa$ wählt, so wird $a'_{\varkappa i} = -2$, $a'_{i\varkappa} = -1$, $a'_{\lambda i} = a'_{i\lambda} = 0$;
killing1889_F00474	27	0.445	a_{x i}^{\prime}=-2, a_{l x}^{\prime}=-1, a_{2 i}^{\prime}=a_{l i}^{\prime}=0	$a'_{xi} = -2, a'_{lx} = -1, a'_{2i} = a'_{li} = 0$	$-\omega_i + \omega_\varkappa$ wählt, so wird $a'_{\varkappa i} = -2$, $a'_{i\varkappa} = -1$, $a'_{\lambda i} = a'_{i\lambda} = 0$;
killing1889_F00475	27	0.811	a_{l x}=-2, a_{k i}=-1	$a_{lx} = -2, a_{ki} = -1$	Wenn für $\alpha = 0$, $\varkappa = 2$ jedes $a_{i\varkappa} = -2$, $a_{\varkappa i} = -1$ ist, so
killing1889_F00476	27	0.907	\omega_{x}-\omega_{2}	$\omega_x - \omega_2$	müssen ausser $\omega_1 \ldots \omega_i$ und $\omega_\varkappa - \omega_\lambda$ noch die Wurzeln vorhanden
killing1889_F00477	27	0.896	\omega_{x}-\omega_{i}, 2 \omega_{x}-\omega_{i}, \omega_{x}+\omega_{2}-\omega_{i}	$\omega_x - \omega_i, 2\omega_x - \omega_i, \omega_x + \omega_2 - \omega_i$	sein: $\omega_\varkappa - \omega_i$, $2\omega_\varkappa - \omega_i$, $\omega_\varkappa + \omega_\lambda - \omega_i$. Vertauscht man hier ω_i
killing1889_F00478	27	0.889	2 \omega_{x}-\omega_{i}	$2\omega_x - \omega_i$	durch $2\omega_\varkappa - \omega_i$, so wird $a'_{\varkappa i} = -1$, $a'_{i\varkappa} = -2$, dagegen für
killing1889_F00479	27	0.889	a_{x i}^{\prime}=-1, a_{i x}^{\prime}=-2	$a'_{xi} = -1, a'_{ix} = -2$	durch $2\omega_\varkappa - \omega_i$, so wird $a'_{\varkappa i} = -1$, $a'_{i\varkappa} = -2$, dagegen für
killing1889_F00480	27	0.906	x \gtrless \lambda: a_{\lambda i}^{\prime}=0	$x \gtrless \lambda : a'_{\lambda i} = 0$	$\varkappa \gtrless \lambda$: $a'_{\lambda i} = 0$.
killing1889_F00481	27	0.927	\alpha=1	$\alpha = 1$	Endlich gehen wir zu der Annahme über, dass $\alpha = 1$ und damit
killing1889_F00482	27	0.465	a_{1 l} a_{1 l}=\cdots=a_{i-2, l} a_{l, l-2}=1, a_{l, l-1}=a_{l-1, l}=0	$a_{1l}a_{1l} = \cdots = a_{i-2,l}a_{l,l-2} = 1, a_{l,l-1} = a_{l-1,l} = 0$	$m = 1$ ist. Es sei $a_{1i}a_{i1} = \cdots = a_{i-2,i}a_{i,i-2} = 1$, $a_{i,i-1} = a_{i-1,i} = 0$.
killing1889_F00483	27	0.902	\omega_{1} \ldots \omega_{l}, \omega_{l}-\omega_{x}	$\omega_1 \ldots \omega_l, \omega_l - \omega_x$	$\omega_1 \ldots \omega_i$, $\omega_\iota - \omega_\varkappa$ kommen dann noch folgende hinzu:
killing1889_F00484	27	0.912	1 \ldots l-2	$1 \ldots l-2$	wo μ und ν zwei Nummern der Reihe $1 \ldots l-2$ bezeichnen. Ersetzt
killing1889_F00485	27	0.750	\omega_{\nu}-\omega_{i}	$\omega_\nu - \omega_i$	man ω_i durch $\omega_\nu - \omega_i$, so wird $a'_{i\nu} = a'_{\nu i} = -1$, $a'_{i,i-1} = a'_{i-1,i} = -1$,
killing1889_F00486	27	0.750	a_{i}^{\prime}=a_{\nu}^{\prime}=-1, a_{i, L-1}^{\prime}=a_{i-1, i}^{\prime}=-1	$a'_i = a'_\nu = -1, a'_{i,L-1} = a'_{i-1,i} = -1$	man ω_i durch $\omega_\nu - \omega_i$, so wird $a'_{i\nu} = a'_{\nu i} = -1$, $a'_{i,i-1} = a'_{i-1,i} = -1$,
killing1889_F00487	27	0.899	a_{l \mu}=0	$a_{l\mu} = 0$	dagegen $a'_{i\mu} = 0$. Daher führt die Annahme $\alpha = l-3$ zu einem
killing1889_F00488	27	0.899	\alpha=l-3	$\alpha = l - 3$	dagegen $a'_{i\mu} = 0$. Daher führt die Annahme $\alpha = l-3$ zu einem
killing1889_F00489	27	0.926	l>3	$l > 3$	*Für jedes $l > 3$ giebt es mindestens vier wesentlich verschiedene*
killing1889_F00490	27	0.585	\mu, \nu=1 \ldots l	$\mu, \nu = 1 \ldots l$	-1; *für* $\mu, \nu = 1 \ldots l$ *sind die Wurzeln* $\pm\omega_\mu$, $\pm(\omega_\mu - \omega_\nu)$.
killing1889_F00491	27	0.585	\pm \omega_{\mu}, \pm\left(\omega_{\mu}-\omega_{\nu} \right)	$\pm\omega_\mu, \pm(\omega_\mu - \omega_\nu)$	-1; *für* $\mu, \nu = 1 \ldots l$ *sind die Wurzeln* $\pm\omega_\mu$, $\pm(\omega_\mu - \omega_\nu)$.
killing1889_F00492	27	0.582	\iota \ldots l-1	$\iota \ldots l-1$	*der Reihe $\iota \ldots l-1$ sind:*
killing1889_F00493	27	0.862	a_{\mu \nu}=-1, a_{l \mu}=-2, a_{\mu i}=-1	$a_{\mu\nu} = -1, a_{l\mu} = -2, a_{\mu i} = -1$	*Für das System C) setze man $a_{\mu\nu} = -1$, $a_{l\mu} = -2$, $a_{\mu i} = -1$,*
killing1889_F00494	27	0.887	\mu, \nu	μ, ν	*wenn wieder μ, ν verschiedene Nummern der Reihe $1 \ldots l-1$ be-*
killing1889_F00495	27	0.887	1 \ldots l-1	$1 \ldots l-1$	*wenn wieder μ, ν verschiedene Nummern der Reihe $1 \ldots l-1$ be-*
killing1889_F00496	28	0.670	s^{1}+1	$s^1 + 1$	*für B) und C): $s^1 + 1$, für D): $(s+1)(s^{l-1}+1)$; sie verschwindet*
killing1889_F00497	28	0.670	\left.D\right):(s+1)\left(s^{1-1}+1\right)	$D) : (s+1)\left(s^{1-1}+1\right)$	*für B) und C): $s^1 + 1$, für D): $(s+1)(s^{l-1}+1)$; sie verschwindet*
killing1889_F00498	28	0.478	A	A	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00499	28	0.478	(l+1)^{t e}	$(l+1)^{te}$	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00500	28	0.478	\left.B\right)	$B)$	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00501	28	0.478	2 l^{t e}	$2l^{te}$	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00502	28	0.478	D	D	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00503	28	0.478	(2 l-2)^{t e}	$(2l-2)^{te}$	*also bei A) für $(l+1)^{te}$, bei B) und C) für $2l^{te}$, bei D) für $(2l-2)^{te}$*
killing1889_F00504	28	0.890	\alpha=2	$\alpha = 2$	Indem wir für $l = 6, 7, 8$ die Voraussetzung $\alpha = 2$ machen und
killing1889_F00505	28	0.922	a=l-4	$a = l - 4$	Annahme $a = l - 4$ zu einem äquivalenten Systeme führt. Somit
killing1889_F00506	28	0.894	l=6	$l = 6$	*Für $l = 6$ giebt es ausser den Systemen A), B), C), D) noch ein*
killing1889_F00507	28	0.905	\iota, x \cdots=1,2,3	$\iota, x \cdots = 1, 2, 3$	*System VI E), welches in folgender Weise gebildet ist; für $\iota, x \cdots = 1,2,3$*
killing1889_F00508	28	0.730	a_{i x}=-1, a_{i 4}=a_{i 5}=a_{i 6}=a_{i 4}=a_{54}=a_{64}=-1, a_{45}=a_{54}=-1	$a_{ix} = -1, a_{i4} = a_{i5} = a_{i6} = a_{i4} = a_{54} = a_{64} = -1, a_{45} = a_{54} = -1$	*ist $a_{i\varkappa} = -1$, $a_{i4} = a_{i5} = a_{i6} = a_{4i} = a_{5i} = a_{6i} = -1$, $a_{45} = a_{5i} = -1$,*
killing1889_F00509	28	0.912	a_{46}=a_{64}=a_{56}=a_{65}=0	$a_{46} = a_{64} = a_{56} = a_{65} = 0$	*$a_{46} = a_{64} = a_{56} = a_{65} = 0$. Dasselbe führt zu folgenden Wurzeln (und*
killing1889_F00510	28	0.888	l=7	$l = 7$	*Für $l = 7$ ist ein System VII E) für $\iota, \varkappa \cdots = 1 \cdots 4$ in folgen-*
killing1889_F00511	28	0.888	\iota, x \cdots=1 \cdots 4	$\iota, x \cdots = 1 \cdots 4$	*Für $l = 7$ ist ein System VII E) für $\iota, \varkappa \cdots = 1 \cdots 4$ in folgen-*
killing1889_F00512	28	0.430	a_{t x}=-1, a_{t 5}=a_{t 6}=a_{t 7}=a_{5 t}=a_{t i}=a_{7 t}=-1	$a_{tx} = -1, a_{t5} = a_{t6} = a_{t7} = a_{5t} = a_{ti} = a_{7t} = -1$	*der Weise gebildet: $a_{\iota x} = -1$, $a_{\iota 5} = a_{\iota 6} = a_{\iota 7} = a_{5\iota} = a_{6\iota} = a_{7\iota} = -1$,*
killing1889_F00513	28	0.902	a_{56}=a_{65}=-1, a_{57}=a_{67}=a_{75}=a_{76}=0	$a_{56} = a_{65} = -1, a_{57} = a_{67} = a_{75} = a_{76} = 0$	*$a_{56} = a_{65} = -1$, $a_{57} = a_{67} = a_{75} = a_{76} = 0$. Dann müssen die Wurzeln*

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00514	28	0.910	`l=8`	$l = 8$	
killing1889_F00515	28	0.910	`\iota, x \cdots=1 \cdots 5`	$\iota, x \cdots = 1 \cdots 5$	
killing1889_F00516	29	0.905	`(l-1)^{2}`	$(l-1)^2$	
killing1889_F00517	29	0.763	`1 . . .1-2`	$1 \ldots 1-2$	
killing1889_F00518	29	0.601	`a_{x i} a_{t x}`	$a_{xi} a_{tx}$	
killing1889_F00519	29	0.444	`a_{i-1, i} a_{i, L-1}=\frac{2}{m}`	$a_{i-1,i} a_{i,L-1} = \frac{2}{m}$	
killing1889_F00520	29	0.444	`=0`	$= 0$	
killing1889_F00521	29	0.444	`a_{i-1, i}=-1`	$a_{i-1,i} = -1$	
killing1889_F00522	29	0.257	`a_{l_{1}} \ldots a_{l_{2}, \ldots}`	$a_{l_1} \ldots a_{l_2,\ldots}$	
killing1889_F00523	29	0.859	`a_{l, l-1}`	$a_{l,l-1}$	
killing1889_F00524	29	0.859	`m-2`	$m - 2$	
killing1889_F00525	29	0.583	`5-l`	$5 - l$	
killing1889_F00526	29	0.583	`a_{l, L-1}`	$a_{l,L-1}$	
killing1889_F00527	29	0.907	`4-2 m(l-2-\alpha)`	$4 - 2m(l - 2 - \alpha)$	
killing1889_F00528	30	0.913	`\omega_{l}-2 \omega_{l-1}`	$\omega_l - 2\omega_{l-1}$	
killing1889_F00529	30	0.913	`l=4`	$l = 4$	
killing1889_F00530	30	0.924	`l-1^{\text {ter }}`	$l - 1^{\text{ter}}$	
killing1889_F00531	30	0.894	`\iota, x<l`	$\iota, x < l$	
killing1889_F00532	30	0.894	`a_{b x}=-1`	$a_{bx} = -1$	
killing1889_F00533	30	0.904	`a_{1 l} \ldots a_{l-3, l}`	$a_{1l} \ldots a_{l-3,l}$	
killing1889_F00534	30	0.198	`a_{\mathrm{x} 1} a_{1 \mathrm{x}}`	$a_{\mathrm{x}1} a_{1\mathrm{x}}$	
killing1889_F00535	30	0.198	`a_{1,1-1}`	$a_{1,1-1}$	
killing1889_F00536	30	0.198	`a_{1,2-2}`	$a_{1,2-2}$	
killing1889_F00537	30	0.907	`8-4 m-4 \alpha m`	$8 - 4m - 4\alpha m$	
killing1889_F00538	30	0.896	`a_{l, l-2}`	$a_{l,l-2}$	
killing1889_F00539	30	0.918	`8-(l-1) m`	$8 - (l-1)m$	
killing1889_F00540	30	0.918	`a_{l, l-1}=a_{l, l-2}=0`	$a_{l,l-1} = a_{l,l-2} = 0$	
killing1889_F00541	30	0.693	`8-4(b-3-\alpha) m`	$8 - 4(b - 3 - \alpha)m$	
killing1889_F00542	30	0.899	`\omega_{5}`	ω_5	
killing1889_F00543	30	0.899	`\omega_{4}-\omega_{5}`	$\omega_4 - \omega_5$	
killing1889_F00544	30	0.867	`a_{51}^{\prime}=a_{52}^{\prime}=a_{53}^{\prime}=0`	$a'_{51} = a'_{52} = a'_{53} = 0$	
killing1889_F00545	30	0.867	`-\omega_{1}+\omega_{5}+\omega_{6}`	$-\omega_1 + \omega_5 + \omega_6$	
killing1889_F00546	30	0.867	`\omega_{5}^{\prime}`	ω'_5	
killing1889_F00547	30	0.920	`a_{51}^{\prime}=0, a_{52}^{\prime}=a_{5 s}^{\prime}=-1`	$a'_{51} = 0, a'_{52} = a'_{5s} = -1$	
killing1889_F00548	30	0.920	`-\omega_{1}-\omega_{2}+\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{6}`	$-\omega_1 - \omega_2 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_6$	
killing1889_F00549	30	0.929	`a_{51}^{\prime}=a_{52}^{\prime}=0, a_{53}^{\prime}=-1`	$a'_{51} = a'_{52} = 0, a'_{53} = -1$	
killing1889_F00550	30	0.608	`a_{u}=-2, a_{t x}=-1`	$a_u = -2, a_{tx} = -1$	
killing1889_F00551	31	0.328	`a_{u}=-2, a_{a x}=-1`	$a_u = -2, a_{ax} = -1$	
killing1889_F00552	31	0.500	`a_{31}=a_{41}=a_{32}=a_{42}=-2`	$a_{31} = a_{41} = a_{32} = a_{42} = -2$	
killing1889_F00553	31	0.908	`s^{4}-s^{2}+1`	$s^4 - s^2 + 1$	
killing1889_F00554	31	0.886	`1^{\text {ter }}`	1ter	
killing1889_F00555	31	0.907	`l-3`	$l - 3$	
killing1889_F00556	31	0.314	`a_{t x} a_{x x}`	$a_{tx} a_{xx}$	
killing1889_F00557	31	0.938	`l=5`	$l = 5$	
killing1889_F00558	31	0.928	`l=7 \mathrm{zu}`	$l = 7\mathrm{zu}$	
killing1889_F00559	31	0.931	`l=9`	$l = 9$	
killing1889_F00560	31	0.946	`a_{27}=a_{37}=a_{47}=a_{57}=a_{67}=-1`	$a_{27} = a_{37} = a_{47} = a_{57} = a_{67} = -1$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00561	31	0.557	\omega_{7}	ω_7	
killing1889_F00562	31	0.557	\omega_{2} \ldots \omega_{6}	$\omega_2 \dots \omega_6$	
killing1889_F00563	31	0.557	\omega_{4}	ω_4	
killing1889_F00564	31	0.932	\omega_{2}-\omega_{7}	$\omega_2 - \omega_7$	
killing1889_F00565	31	0.904	\omega_{6}-\omega_{7}	$\omega_6 - \omega_7$	
killing1889_F00566	31	0.892	-\omega_{7}-\omega_{2}+\omega_{4}+\omega_{5}+\omega_{6}	$-\omega_7 - \omega_2 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_6$	
killing1889_F00567	32	0.924	\omega_{7}+\omega_{2}+\omega_{3}-\omega_{4}-\omega_{5}-\omega_{6}	$\omega_7 + \omega_2 + \omega_3 - \omega_4 - \omega_5 - \omega_6$	
killing1889_F00568	32	0.922	-\omega_{7}-\omega_{2}-\omega_{3}+\omega_{4}+\omega_{5}+2\omega_{6}	$-\omega_7 - \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + \omega_5 + 2\omega_6$	
killing1889_F00569	32	0.867	a_{17}, a_{71} \ldots	$a_{17}, a_{71} \dots$	
killing1889_F00570	32	0.925	a_{17} a_{71}, \ldots a_{57} a_{75}	$a_{17}a_{71}, \dots a_{57}a_{75}$	
killing1889_F00571	32	0.911	a_{76} a_{67}	$a_{76}a_{67}$	
killing1889_F00572	32	0.911	a_{75} a_{57}	$a_{75}a_{57}$	
killing1889_F00573	32	0.918	a_{74} a_{47}	$a_{74}a_{47}$	
killing1889_F00574	32	0.919	a_{67}=a_{76}=-1	$a_{67} = a_{76} = -1$	
killing1889_F00575	32	0.919	a_{57}=a_{47}=0	$a_{57} = a_{47} = 0$	
killing1889_F00576	32	0.919	a_{17}=a_{27}=a_{37}	$a_{17} = a_{27} = a_{37}$	
killing1889_F00577	32	0.915	a_{67}=0, a_{47}=a_{57}=-1	$a_{67} = 0, a_{47} = a_{57} = -1$	
killing1889_F00578	32	0.914	a_{17}, a_{27}, a_{37}	a_{17}, a_{27}, a_{37}	
killing1889_F00579	32	0.798	\omega_{\mathrm{s}}	ω_{s}	
killing1889_F00580	32	0.915	\omega_{2} \ldots \omega_{7}	$\omega_2 \dots \omega_7$	
killing1889_F00581	32	0.915	\omega_{6}	ω_6	
killing1889_F00582	32	0.900	\omega_{8}	ω_8	
killing1889_F00583	32	0.900	a_{28}=\cdots=a_{78}=-1	$a_{28} = \cdots = a_{78} = -1$	
killing1889_F00584	32	0.900	\omega_{2}-\omega_{8}	$\omega_2 - \omega_8$	
killing1889_F00585	32	0.950	a_{28}=-1, a_{38}=\cdots=a_{78}=0	$a_{28} = -1, a_{38} = \cdots = a_{78} = 0$	
killing1889_F00586	32	0.950	\omega_{7}-\omega_{8}	$\omega_7 - \omega_8$	
killing1889_F00587	32	0.909	-\omega_{8}-\omega_{2}+\omega_{5}+\omega_{6}+\omega_{7}	$-\omega_8 - \omega_2 + \omega_5 + \omega_6 + \omega_7$	
killing1889_F00588	32	0.800	\omega_{\mathrm{S}}+\omega_{2}+\omega_{3}-\omega_{5}-\omega_{6}-\omega_{7}	$\omega_{\mathrm{S}} + \omega_2 + \omega_3 - \omega_5 - \omega_6 - \omega_7$	
killing1889_F00589	32	0.896	-\omega_{8}-\omega_{2}-\omega_{3}+\omega_{5}+\omega_{6}+2\omega_{7}	$-\omega_8 - \omega_2 - \omega_3 + \omega_5 + \omega_6 + 2\omega_7$	
killing1889_F00590	32	0.788	\omega_{8}+\omega_{2}+\omega_{3}-\omega_{4}-\omega_{5}-\omega_{6}-2 \omega_{7}	$\omega_8 + \omega_2 + \omega_3 - \omega_4 - \omega_5 - \omega_6 - 2\omega_7$	
killing1889_F00591	33	0.588	a_{75}=-1, a_{56}=a_{65}=0	$a_{75} = -1, a_{56} = a_{65} = 0$	
killing1889_F00592	33	0.739	a_{18}, a_{28}, a_{38}, a_{48}	$a_{18}, a_{28}, a_{38}, a_{48}$	
killing1889_F00593	33	0.892	a_{7 \mathrm{~s}}=0, a_{5 \mathrm{~s}}=a_{6 \mathrm{~s}}=-1	$a_{7\ \mathrm{s}} = 0, a_{5\ \mathrm{s}} = a_{6\ \mathrm{s}} = -1$	
killing1889_F00594	33	0.590	a_{18}, a_{23}, a_{36}, a_{48}	$a_{18}, a_{23}, a_{36}, a_{48}$	
killing1889_F00595	33	0.220	7^{\text {ar }}	7^{ar}	
killing1889_F00596	33	0.220	8^{\text {arr }}	8^{arr}	
killing1889_F00597	33	0.552	\alpha, \beta, \gamma	α, β, γ	
killing1889_F00598	33	0.552	1 \ldots \gamma-2 l	$1 \dots \gamma - 2l$	
killing1889_F00599	33	0.916	r \ldots r-l+1	$r \dots r - l + 1$	
killing1889_F00600	33	0.676	\left(X_{\alpha} X_{p}\right)	$(X_\alpha X_p)$	
killing1889_F00601	34	0.924	\iota, x, \iota^{\prime}, x^{\prime}, \ldots	$\iota, x, \iota', x', \dots$	
killing1889_F00602	34	0.662	\omega_{i}+\omega_{i}=0,\left(X_{i} X_{i^{\prime}}\right)	$\omega_i + \omega_i = 0, (X_i X_{i'})$	
killing1889_F00603	34	0.683	\pm \omega_{1} \cdots \pm \omega_{l}	$\pm\omega_1 \cdots \pm \omega_l$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00604	34	0.930	a_{\iota}	a_ι	
killing1889_F00605	34	0.905	\omega_{\alpha}^{(\nu)}+\omega_{\beta}^{(\nu)}	$\omega_\alpha^{(\nu)} + \omega_\beta^{(\nu)}$	
killing1889_F00606	34	0.506	\omega_{\alpha}^{(\gamma)}+\omega_{\beta}^{(\gamma)}=0	$\omega_\alpha^{(\gamma)} + \omega_\beta^{(\gamma)} = 0$	
killing1889_F00607	34	0.929	\iota, x . .	$\iota, x..$	
killing1889_F00608	34	0.616	\pm \omega_{t}, \pm \omega_{x}	$\pm\omega_t, \pm\omega_x$	
killing1889_F00609	34	0.594	\omega_{i}-\omega_{x}	$\omega_i - \omega_x$	
killing1889_F00610	34	0.594	\omega_{\alpha},-\omega_{i}+\omega_{x}	$\omega_\alpha, -\omega_i + \omega_x$	
killing1889_F00611	34	0.594	\omega_{\alpha}^{\prime}	ω'_α	
killing1889_F00612	34	0.805	c_{t x^{\prime} \alpha}, c_{i^{\prime} x \alpha^{\prime}}, c_{t a^{\prime} x}, c_{\alpha x_{i}}	$c_{tx'\alpha}, c_{i'x\alpha'}, c_{ta'x}, c_{\alpha x_i}$	
killing1889_F00613	34	0.927	\alpha, \alpha^{\prime}, \iota	α, α', ι	
killing1889_F00614	34	0.924	\left(X_{\alpha} X_{\alpha^{\prime}}\right)	$(X_\alpha X_{\alpha'})$	
killing1889_F00615	34	0.881	X_{1} \ldots X_{2 l}	$X_1 \ldots X_{2l}$	
killing1889_F00616	34	0.881	\omega_{\beta}=\omega_{\iota}-\omega_{x}	$\omega_\beta = \omega_\iota - \omega_x$	
killing1889_F00617	34	0.835	=\omega_{i}-2 \omega_{x} \cdots	$= \omega_i - 2\omega_x \cdots$	
killing1889_F00618	34	0.835	\omega_{i}, \omega_{x}	ω_i, ω_x	
killing1889_F00619	34	0.345	\omega_{\iota}-\omega_{x} \cdots \omega_{\iota}+a_{\iota x} \omega_{x}	$\omega_\iota - \omega_x \cdots \omega_\iota + a_{\iota x}\omega_x$	
killing1889_F00620	34	0.593	\omega_{\iota}	ω_ι	
killing1889_F00621	34	0.915	\omega_{i}-\omega_{x} \cdots \omega_{i}+a_{i x} \omega_{x}	$\omega_i - \omega_x \cdots \omega_i + a_{ix}\omega_x$	
killing1889_F00622	34	0.811	a_{\iota x}	$a_{\iota x}$	
killing1889_F00623	34	0.906	a_{: x}	$a_{:x}$	
killing1889_F00624	35	0.459	X_{r-1} f \ldots X_{r-1+1} f	$X_{r-1}f \ldots X_{r-1+1}f$	
killing1889_F00625	35	0.781	X_{1} f \ldots X_{\cdots 1} f	$X_1 f \ldots X_{\cdots 1} f$	
killing1889_F00626	35	0.878	\left(X_{r} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha} X_{\alpha} f \ldots\left(X_{r-i+1} X_{\alpha}\right)=\omega_{\alpha}^{(i-1)} X_{\alpha} f	$(X_r X_\alpha) = \omega_\alpha X_\alpha f \ldots (X_{r-i+1} X_\alpha) = \omega_\alpha^{(i-1)} X_\alpha f$	
killing1889_F00627	35	0.758	\omega_{\alpha}^{*}+\omega_{\beta}^{*}=\omega_{\gamma}^{*}	$\omega^*_\alpha + \omega^*_\beta = \omega^*_\gamma$	
killing1889_F00628	35	0.528	\omega_{\alpha}^{\prime}+\omega_{\alpha^{\prime}}^{\prime}=0	$\omega'_\alpha + \omega'_{\alpha'} = 0$	
killing1889_F00629	35	0.528	\operatorname{kann}\left(X_{\alpha} X_{\alpha}\right)	$\operatorname{kann}(X_\alpha X_\alpha)$	
killing1889_F00630	35	0.528	X_{r} \ldots X_{r-4+1}	$X_r \ldots X_{r-4+1}$	
killing1889_F00631	35	0.915	\iota_{1}	ι_1	
killing1889_F00632	35	0.915	a_{u_{i}}	a_{u_i}	
killing1889_F00633	35	0.924	\iota_{11}	ι_{11}	
killing1889_F00634	35	0.924	a_{4_{4}}	a_{4_4}	
killing1889_F00635	35	0.916	X_{\alpha}	X_α	
killing1889_F00636	35	0.755	\mathrm{X}_{\alpha_{i}} f	$\mathrm{X}_{\alpha_i} f$	
killing1889_F00637	35	0.755	\left(\mathrm{X}_{\alpha} \mathrm{X}_{\alpha_{i}}\right) \neq 0	$(\mathrm{X}_\alpha \mathrm{X}_{\alpha_i}) \neq 0$	
killing1889_F00638	35	0.932	X_{\alpha_{i}} f	$X_{\alpha_i} f$	
killing1889_F00639	35	0.531	X_{r} f \ldots X_{r-L+1} f	$X_r f \ldots X_{r-L+1} f$	
killing1889_F00640	35	0.869	\left(X_{Q} X_{\sigma}\right)	$(X_Q X_\sigma)$	
killing1889_F00641	36	0.677	a_{1 *}	a_{1*}	
killing1889_F00642	36	0.878	2 \varrho	2ϱ	
killing1889_F00643	36	0.878	\iota_{1} \ldots \iota_{\rho}, \iota_{1}^{\prime} \ldots \iota_{\rho}^{\prime}	$\iota_1 \ldots \iota_\rho, \iota'_1 \ldots \iota'_\rho$	

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00644	36	0.474	\omega_{i_{1}}+\omega_{i_{1}^{\prime}}=0 \ldots \omega_{i_{\rho}}+\omega_{i_{\rho}^{\prime}}=0	$\omega_{i_1}+\omega_{i_1'}=0\ldots\omega_{i_\rho}+\omega_{i_\rho'}=0$	 unter der Bedingung $\omega_{\iota_1}+\omega_{\iota_1'}=0\ \ldots\ \omega_{\iota_\varrho}+\omega_{\iota_\varrho'}=0$ eine Unter-
killing1889_F00645	36	0.870	\omega_{\alpha}^{\nu}+\omega_{\beta}^{\nu}	$\omega_\alpha^\nu+\omega_\beta^\nu$	 Dann wird $\omega_\alpha^\nu+\omega_\beta^\nu$ für jedes ν zu einer neuen Wurzel führen. Dem-
killing1889_F00646	36	0.896	a_{\alpha \beta}	$a_{\alpha\beta}$	 nach kann der entsprechende Coefficient $a_{\alpha\beta}$ nur dann gleich Null
killing1889_F00647	36	0.860	\omega_{\alpha}^{\nu}+\mathfrak{a} \omega_{\beta}^{\nu}	$\omega_\alpha^\nu+\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$	 sein, wenn die Wurzeln $\omega_\alpha^\nu+\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$ und $\omega_\alpha^\nu-\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$ für ein ganzzahliges
killing1889_F00648	36	0.860	\omega_{\alpha}^{\nu}-\mathfrak{a} \omega_{\beta}^{\nu}	$\omega_\alpha^\nu-\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$	 sein, wenn die Wurzeln $\omega_\alpha^\nu+\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$ und $\omega_\alpha^\nu-\mathfrak{a}\omega_\beta^\nu$ für ein ganzzahliges
killing1889_F00649	36	0.887	\omega_{\alpha}+\mathfrak{a} \omega_{\beta}	$\omega_\alpha+\mathfrak{a}\omega_\beta$	 $\mathfrak{a}$ vorkommen. Ersetzt man dann ω_β durch $\omega_\alpha+\mathfrak{a}\omega_\beta$, so wird der
killing1889_F00650	36	0.894	\varrho-1	$\varrho-1$	 den Untersuchungen des vorigen Paragraphen die Marke α mit $\varrho-1$
killing1889_F00651	36	0.485	\left(\iota_{1} \ldots \iota_{0}\right)	$(\iota_1\ldots\iota_0)$	 andern dem Systeme $(\iota_1\ldots\iota_\varrho)$ angehörigen Marken so verbinden, dass
killing1889_F00652	36	0.854	\rho^{\text {ter }}	ρ^{ter}	 Weise bestimmte Marke β hinzu, so ist das Untersystem ϱ^{ter} Ordnung
killing1889_F00653	36	0.885	\varrho+1	$\varrho+1$	 durch ein einfaches System ersetzt, dessen Ordnung mindestens $\varrho+1$
killing1889_F00654	36	0.612	a_{\iota 2}	$a_{\iota 2}$	 cienten $a_{\iota\varkappa}$ zu erweisen, so muss die Gruppe eine invariante Unter-
killing1889_F00655	36	0.522	\left(X_{\imath} X_{\alpha}\right)	$(X_\iota X_\alpha)$	 nicht angehören, so führt, wie die Gl. (2) lehrt, jedes $(X_\iota X_\alpha)$, wo-
killing1889_F00656	37	0.817	\alpha, \beta, \ldots	$\alpha,\beta,\ldots$	 handene Marke. Diese letzteren (nämlich die Marken $\alpha, \beta \ldots$) werden
killing1889_F00657	37	0.881	\left(\mathrm{X}_{\alpha} \mathrm{X}_{p}\right)	$(\mathrm{X}_\alpha \mathrm{X}_p)$	 also eine invariante Untergruppe bestimmen, wenn nicht ein $(X_\alpha X_\beta)$
killing1889_F00658	37	0.811	X_{i} f	$X_i f$	 auf ein $X_\iota f$ führt. Sobald aber ein Coefficient $c_{\alpha\beta\iota}$ von Null ver-
killing1889_F00659	37	0.811	c_{a p}	c_{ap}	 auf ein $X_\iota f$ führt. Sobald aber ein Coefficient $c_{\alpha\beta\iota}$ von Null ver-
killing1889_F00660	37	0.858	\left(\alpha \beta^{\prime}\right)	$(\alpha\beta')$	 schieden ist, bilde man die Jacobi'sche Relation für $(\alpha\beta\iota')$, und aus
killing1889_F00661	37	0.911	l=1	$l=1$	 suchungen, wie sie ähnlich in § 8 für $l=1$ angestellt sind. Wollte
killing1889_F00662	37	0.886	X_{r} f \ldots X_{r-1+1} f	$X_r f\ldots X_{r-1+1}f$	$X_r f\ldots X_{r-l+1}f$ ausgedrückt werden, so zeigt man auf dem dort vor-
killing1889_F00663	37	0.196	{ }_{\mathrm{t}}	$_{\mathrm{t}}$	 *so auswählen, dass das System der zugehörigen Coefficienten $a_{\iota\varkappa}$ einfach*
killing1889_F00664	37	0.915	X_{r-1}	X_{r-1}	 (diese Annalen Bd. 31, S. 284) ein Versehen eingeschlichen hat, indem statt X_{r-1}
killing1889_F00665	37	0.590	X_{\alpha_{0}}	X_{α_0}	 stehen muss X_{α_0}. Wenn dann $2\omega_\alpha$ keine Wurzel ist, so genügt die hingeschriebene
killing1889_F00666	37	0.590	2 \omega_{\mu}	$2\omega_\mu$	 stehen muss X_{α_0}. Wenn dann $2\omega_\alpha$ keine Wurzel ist, so genügt die hingeschriebene
killing1889_F00667	37	0.505	\omega_{\gamma}=2 \omega_{a}	$\omega_\gamma=2\omega_a$	 Relation; im andern Falle bilde man für $\omega_\gamma=2\omega_\alpha$ noch die Jacobi'sche
killing1889_F00668	37	0.909	\alpha_{1} \beta_{0} \gamma_{0}	$\alpha_1\beta_0\gamma_0$	 Relation $(\alpha_1\beta_0\gamma_0)$.
killing1889_F00669	38	0.426	c_{i, x \lambda}	$c_{i,x\lambda}$	 Coefficienten $c_{\iota\varkappa\lambda}$ her. Im Ausdruck derselben kommen noch einige
killing1889_F00670	38	0.924	X_{r} f \ldots X_{r-l+1} f	$X_r f\ldots X_{r-l+1}f$	 ist. Denn einmal können die Transformationen $X_r f\ldots X_{r-l+1}f$
killing1889_F00671	38	0.271	m_{1} \ldots m_{r-l}	$m_1\ldots m_{r-l}$	 $m_1\ldots m_{r-l}$ multipliciren, ohne dass die ω_α sich ändern. Umgekehrt
killing1889_F00672	38	0.934	\iota, x, \lambda \ldots	$\iota,x,\lambda\ldots$	 wir $\iota,\varkappa,\lambda\ldots$ Marken der Reihe $1\ldots l$ sein lassen, verstehen wir
killing1889_F00673	38	0.695	X_{0 i} f, X_{i 0} f, X_{i t} f, X_{i x} f	$X_{0i}f, X_{i0}f, X_{it}f, X_{ix}f$	 unter $X_{0\iota}f$, $X_{\iota 0}f$, $X_{\iota\iota}f$, $X_{\iota\varkappa}f$ infinitesimale Transformationen; zwischen
killing1889_F00674	38	0.322	\Sigma \eta_{i} X_{i l} f	$\Sigma\eta_i X_{il}f$	 Gehen wir von der Transformation $\Sigma\eta_\iota X_{\iota\iota}f$ aus, so bilden
killing1889_F00675	38	0.582	X_{\iota 0}, X_{0 \iota}, X_{\iota}	$X_{\iota 0}, X_{0\iota}, X_\iota$	 $X_{\iota 0}$, $X_{0\iota}$, $X_{\iota\varkappa}$ die Hauptelemente der die gegebene Transformation
killing1889_F00676	38	0.921	\pm \omega_{i}, \pm\left(\omega_{i}-\omega_{x}\right)	$\pm\omega_i,\pm(\omega_i-\omega_x)$	 chung hat also in der That die Wurzeln $\pm\omega_\iota$, $\pm(\omega_\iota-\omega_\varkappa)$ und ge-
killing1889_F00677	38	0.924	X_{0 i}	X_{0i}	 und bezeichnen die zu ω_ι gehörige Transformation mit $X_{0\iota}$, die zu
killing1889_F00678	38	0.649	m_{i} X_{i 0}	$m_i X_{i0}$	 $-\omega_\iota$ gehörige mit $m_\iota X_{\iota 0}$. Dann lassen sich die Coefficienten
killing1889_F00679	38	0.403	\eta_{i}, \eta_{i}^{\prime} \ldots m_{i}	$\eta_i,\eta_i'\ldots m_i$	 $\eta_\iota, \eta_\iota'\ldots m_\iota$ so wählen, dass jedes $(X_{0\iota}X_{\iota 0})$ den oben angegebenen
killing1889_F00680	38	0.403	\left(X_{0}, X_{i 0}\right)	(X_0,X_{i0})	 $\eta_\iota, \eta_\iota'\ldots m_\iota$ so wählen, dass jedes $(X_{0\iota}X_{\iota 0})$ den oben angegebenen
killing1889_F00681	38	0.542	\omega_{i}^{\prime}=-1, \omega_{i}^{\nu}=0	$\omega_i'=-1,\omega_i^\nu=0$	 Werth erhält, $\omega_\iota^\iota=-1$, $\omega_\iota^\nu=0$ für $\nu\gtrless\iota$ wird. Indem man dann
killing1889_F00682	38	0.542	\nu \gtrless \iota	$\nu\gtrless\iota$	Werth erhält, $\omega_\iota^\iota=-1$, $\omega_\iota^\nu=0$ für $\nu\gtrless\iota$ wird. Indem man dann
killing1889_F00683	38	0.625	\omega_{\imath}-\omega_{x}	$\omega_\iota-\omega_x$	noch zu $\omega_\iota-\omega_\varkappa$ die Transformation $m_{\iota\varkappa}X_{\iota\varkappa}$ gehören lässt, lassen
killing1889_F00684	38	0.625	m_{\imath x} X_{\imath x}	$m_{xx}X_{ix}$	noch zu $\omega_\iota-\omega_\varkappa$ die Transformation $m_{\iota\varkappa}X_{\iota\varkappa}$ gehören lässt, lassen
killing1889_F00685	38	0.721	m_{t x}, m_{x x}	m_{tx}, m_{xx}	sich die $m_{\iota\varkappa}, m_{\varkappa\iota}$ eindeutig so bestimmen, dass alle Gl. (1) erfüllt sind.
killing1889_F00686	38	0.634	l(2 l-2)	$l(2l-2)$	Dann lassen sich alle $l(2l-2)$ Wurzeln in der Form $\pm\pi_\iota\pm\pi_\varkappa$
killing1889_F00687	38	0.634	\pm \pi_{\imath} \pm \pi_{x}	$\pm\pi_\iota\pm\pi_x$	Dann lassen sich alle $l(2l-2)$ Wurzeln in der Form $\pm\pi_\iota\pm\pi_\varkappa$
killing1889_F00688	38	0.297	\iota,{ }^{6}=1 \ldots 2 l	$\iota,^6=1\ldots 2l$	darstellen. Nun haben wir bereits früher für $\iota,\varkappa=1\ldots 2l$ aus
killing1889_F00689	38	0.462	l(2 l-1)	$l(2l-1)$	$l(2l-1)$ Transformationen $X_{\iota\varkappa}f(=-X_{\varkappa\iota}f)$ eine Gruppe gebildet,

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00690	38	0.462	`X_{\iota x} f\left(=-X_{x \iota} f\right)`	$X_{\iota x} f\,(=-X_{x\iota} f)$	$l(2l-1)$ Transformationen $X_{\iota x} f\,(=-X_{x\iota} f)$ eine Gruppe gebildet,
killing1889_F00691	39	0.515	`\left(X_{\alpha} X_{\alpha}\right)=X_{\alpha} f,\left(X_{ \alpha}, X_{\alpha_{\mu}}\right)=0`	$(X_\alpha X_\alpha) = X_\alpha f, \left(X_\alpha, X_{\alpha_\mu}\right) = 0$	für welche die Relationen $(X_{\iota x}\, X_{x\lambda}) = X_{x\lambda} f$, $(X_{\iota x}\, X_{\lambda\mu}) = 0$ bestehen.
killing1889_F00692	39	0.925	`\pm \pi_{i} \pm \pi_{x}`	$\pm\pi_i \pm \pi_x$	der Form $\pm \pi_\iota \pm \pi_\varkappa$. Diese Gruppe gehört also zu dem System D),
killing1889_F00693	39	0.929	`\omega_{i}-\omega_{1}, \omega_{l}-\omega_{2} \cdots \omega_{l}-\omega_{l-1}, \omega_{l}`	$\omega_i - \omega_1, \omega_l - \omega_2 \cdots \omega_l - \omega_{l-1}, \omega_l$	$\omega_\iota - \omega_1$, $\omega_\iota - \omega_2 \cdots \omega_\iota - \omega_{\iota-1}$, ω_ι. Alsdann lassen sich alle
killing1889_F00694	39	0.611	`\pm \omega_{i}, \pm \omega_{i} \pm \omega_{x}`	$\pm\omega_i, \pm\omega_i \pm \omega_x$	Wurzeln in der Form darstellen: $\pm \omega_\iota$, $\pm \omega_\iota \pm \omega_\varkappa$. Diese $2l^2$
killing1889_F00695	39	0.611	`2 l^{2}`	$2l^2$	Wurzeln in der Form darstellen: $\pm \omega_\iota$, $\pm \omega_\iota \pm \omega_\varkappa$. Diese $2l^2$
killing1889_F00696	39	0.916	`\alpha, \beta=1 \ldots 2 l+1`	$\alpha, \beta = 1 \ldots 2l+1$	$\alpha, \beta = 1 \ldots 2l+1$ die $l(2l+1)$ inf. Transformationen $X_{\alpha\beta}(=-X_{\beta\alpha})$
killing1889_F00697	39	0.916	`l(2 l+1)`	$l(2l+1)$	$\alpha, \beta = 1 \ldots 2l+1$ die $l(2l+1)$ inf. Transformationen $X_{\alpha\beta}(=-X_{\beta\alpha})$
killing1889_F00698	39	0.916	`X_{\alpha \beta}\left(--X_{\beta \alpha}\right)`	$X_{\alpha\beta}\,(--X_{\beta\alpha})$	$\alpha, \beta = 1 \ldots 2l+1$ die $l(2l+1)$ inf. Transformationen $X_{\alpha\beta}(=-X_{\beta\alpha})$
killing1889_F00699	39	0.934	`\alpha, \beta, \gamma, \delta`	$\alpha, \beta, \gamma, \delta$	voraus, so dass für ungleiche Werthe von α, β, γ, δ die Relationen
killing1889_F00700	39	0.916	`2 \omega_{1}-\omega_{l}, 2 \omega_{2}-\omega_{l} \ldots 2 \omega_{l-1}-\omega_{l}, \omega_{l}`	$2\omega_1 - \omega_l, 2\omega_2 - \omega_l \ldots 2\omega_{l-1} - \omega_l, \omega_l$	Wir ersetzen die $\omega_1 \ldots \omega_l$ durch $2\omega_1 - \omega_\iota$, $2\omega_2 - \omega_\iota \ldots 2\omega_{\iota-1} - \omega_\iota, \omega_\iota$
killing1889_F00701	39	0.901	`\pm \omega_{i}, \frac{ \pm \omega_{i} \pm \omega_{x}}{2}`	$\pm\omega_i, \frac{\pm\omega_i \pm \omega_x}{2}$	und können dann alle Wurzeln in der Form $\pm \omega_\iota$, $\frac{\pm\omega_\iota \pm \omega_\varkappa}{2}$ dar-
killing1889_F00702	39	0.612	`\frac{t-x}{2}`	$\frac{t-x}{2}$	und entsprechend für $\frac{\iota - \varkappa}{2}$.
killing1889_F00703	40	0.898	`\iota, x, v`	ι, x, v	wenn $\iota, \varkappa, \nu$ als ungleich vorausgesetzt werden. Somit lassen sich
killing1889_F00704	40	0.299	`E_{t}, E_{\frac{t \pm x}{2}}, \omega_{t}^{\gamma}`	$E_t, E_{\frac{t\pm x}{2}}, \omega_t^\gamma$	aus den E_ι, $E_{\frac{\iota\pm\varkappa}{2}}$, ω_ι^ν die e_ι^ν, $e^\nu_{\frac{\iota\pm\varkappa}{2}}$ einfach berechnen. Speciell er-
killing1889_F00705	40	0.299	`e_{t}^{\gamma}, e_{\frac{ \pm x}{2}}^{\gamma}`	$e_t^\gamma, e^\gamma_{\frac{t\pm x}{2}}$	aus den E_ι, $E_{\frac{\iota\pm\varkappa}{2}}$, ω_ι^ν die e_ι^ν, $e^\nu_{\frac{\iota\pm\varkappa}{2}}$ einfach berechnen. Speciell er-
killing1889_F00706	40	0.769	`p_{\iota}`	p_ι	Indem wir eine Grösse $p_{\iota\varkappa}$ willkürlich wählen, folgt:
killing1889_F00707	40	0.860	`\left(\frac{\imath+x}{2}, \frac{-\imath-x}{2}, \frac{-\imath+\lambda}{2}\right)`	$\left(\frac{\imath+x}{2}, \frac{-\imath-x}{2}, \frac{-\imath+\lambda}{2}\right)$	Die Jacobi'sche Relation für $\left(\frac{\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\iota-\varkappa}{2}, \frac{-\iota+\lambda}{2}\right)$ liefert:
killing1889_F00708	41	0.883	`\left(t, \frac{-t+x}{2}, \frac{-t-x}{2}\right)`	$\left(t, \frac{-t+x}{2}, \frac{-t-x}{2}\right)$	Marken nimmt, deren Summe verschwindet, z. B. $\left(\iota, \frac{-\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\iota-\varkappa}{2}\right)$
killing1889_F00709	41	0.561	`\left(\frac{1+x}{2}, \frac{-1+1}{2}, \frac{-x-2}{2}\right)`	$\left(\frac{1+x}{2}, \frac{-1+1}{2}, \frac{-x-2}{2}\right)$	oder $\left(\frac{\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\iota+\lambda}{2}, \frac{-\varkappa-\lambda}{2}\right)$. Diese werden durch die vor-
killing1889_F00710	41	0.604	`\imath, x, \frac{-\imath-x}{2}`	$\imath, x, \frac{-\imath-x}{2}$	führt. Von diesen liefert auch jede Relation $\left(\iota, \varkappa, \frac{-\iota-\varkappa}{2}\right)$ keine
killing1889_F00711	41	0.733	`\left(\iota, \frac{-i+x}{2}, \frac{-i+2}{2}\right)`	$\left(\iota, \frac{-i+x}{2}, \frac{-i+2}{2}\right)$	$\left(\iota, \frac{-\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\iota+\lambda}{2}\right)$:
killing1889_F00712	41	0.878	`\left(\iota, \frac{-i+x}{2}, \frac{-x+\lambda}{2}\right)`	$\left(\iota, \frac{-i+x}{2}, \frac{-x+\lambda}{2}\right)$	aus $\left(\iota, \frac{-\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\varkappa+\lambda}{2}\right)$:
killing1889_F00713	41	0.792	`\left(\frac{i+x}{2}, \frac{i+1}{2}, \frac{-x-1}{2}\right)`	$\left(\frac{i+x}{2}, \frac{i+1}{2}, \frac{-x-1}{2}\right)$	und aus $\left(\frac{\iota+\varkappa}{2}, \frac{\iota+\lambda}{2}, \frac{-\varkappa-\lambda}{2}\right)$:
killing1889_F00714	41	0.890	`\left(\frac{t+x}{2}, \frac{-t+1}{2}, \frac{-x+\mu}{2}\right)`	$\left(\frac{t+x}{2}, \frac{-t+1}{2}, \frac{-x+\mu}{2}\right)$	Endlich liefert die Relation $\left(\frac{\iota+\varkappa}{2}, \frac{-\iota+\lambda}{2}, \frac{-\varkappa+\mu}{2}\right)$ die
killing1889_F00715	41	0.926	`c`	c	Um alle weiteren Coefficienten c in gleicher Weise darstellen zu
killing1889_F00716	42	0.910	`X_{r} f \ldots`	$X_r f \ldots$	selben angegeben ist. Dieser kann durch passende Wahl der $X_r f \ldots$
killing1889_F00717 **[conf 0.076]**	42	0.076	`X_{r \rightarrow+1} f`	$X_{r\to+1} f$	$X_{r-\mu+1} f$ und durch Multiplication von $X_{-\iota}$, $X_{\frac{-\iota+\varkappa}{2}} f$ mit passenden
killing1889_F00718 **[conf 0.076]**	42	0.076	`X_{i}, X_{\frac{ \pm^{i} \pm x}{2}} f`	$X_i, X_{\frac{\pm^i \pm x}{2}} f$	$X_{r-\mu+1} f$ und durch Multiplication von $X_{-\iota}$, $X_{\frac{-\iota+\varkappa}{2}} f$ mit passenden
killing1889_F00719	42	0.354	`\omega_{i}^{(l-1)}=-2, \omega_{i}^{(\nu-1)}=0`	$\omega_i^{(l-1)} = -2, \omega_i^{(\nu-1)} = 0$	dass ist $\omega_\iota^{(\iota-1)} = -2$, $\omega_\iota^{(\nu-1)} = 0$ für $\iota \gtrless \nu$, und dass $g_\iota = 1$,
killing1889_F00720	42	0.354	`\iota \gtrless \nu`	$\iota \gtrless \nu$	dass ist $\omega_\iota^{(\iota-1)} = -2$, $\omega_\iota^{(\nu-1)} = 0$ für $\iota \gtrless \nu$, und dass $g_\iota = 1$,
killing1889_F00721	42	0.354	`g_{i}=1`	$g_i = 1$	dass ist $\omega_\iota^{(\iota-1)} = -2$, $\omega_\iota^{(\nu-1)} = 0$ für $\iota \gtrless \nu$, und dass $g_\iota = 1$,
killing1889_F00722	42	0.151	`\frac{g_{t x}}{2}=1`	$\frac{g_{tx}}{2} = 1$	$g_{\frac{\iota\pm\varkappa}{2}} = 1$, und jedes $p_{\iota\varkappa}$ für positive Werthe $\iota, \varkappa$ gleich eins ist. Die

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
killing1889_F00723	42	0.151	`p_{t x}`	p_{tx}	$g_{\frac{\iota+\varkappa}{2}} = 1$, und jedes $p_{\iota\varkappa}$ für positive Werthe $\iota, \varkappa$ gleich eins ist. Die
killing1889_F00724	42	0.545	`l(l+2)`	$l(l+2)$	*Die Gruppe* A) *ist* $l(l+2)$*-gliedrig und identisch mit der Gruppe*
killing1889_F00725	42	0.642	`X_{0 \iota}, X_{\iota_{0}}, X_{\iota x}`	$X_{0\iota}, X_{\iota_0}, X_{\iota x}$	*die inf. Transformationen* $X_{0\iota}, X_{\iota 0}, X_{\iota\varkappa}$ und setze fest:
killing1889_F00726	42	0.897	`\left(X_{\iota \varkappa} X_{2 \mu}\right)=0`	$(X_{\iota\varkappa} X_{2\mu}) = 0$	*und* $(X_{\iota\varkappa} X_{2\mu}) = 0$, *wenn weder* $\iota = \mu$, *noch* $\varkappa = \lambda$ *ist.*
killing1889_F00727	42	0.897	`\iota=\mu`	$\iota = \mu$	*und* $(X_{\iota\varkappa} X_{2\mu}) = 0$, *wenn weder* $\iota = \mu$, *noch* $\varkappa = \lambda$ *ist.*
killing1889_F00728	42	0.897	`\varkappa=\lambda`	$\varkappa = \lambda$	*und* $(X_{\iota\varkappa} X_{2\mu}) = 0$, *wenn weder* $\iota = \mu$, *noch* $\varkappa = \lambda$ *ist.*
killing1889_F00729	42	0.287	`\iota, x=1 \ldots 2 l`	$\iota, x = 1 \ldots 2l$	$\iota, \varkappa = 1 \ldots 2l$ *die* $l(2l-1)$ *inf. Transformationen* $X_{\iota\varkappa} f (= -X_{\varkappa\iota} f)$
killing1889_F00730	42	0.287	`X_{\iota} f\left(=-X_{\iota_{i}} f\right)`	$X_\iota f\,(= -X_{\iota_i} f)$	$\iota, \varkappa = 1 \ldots 2l$ *die* $l(2l-1)$ *inf. Transformationen* $X_{\iota\varkappa} f (= -X_{\varkappa\iota} f)$
killing1889_F00731	42	0.441	`\left(X_{\imath x} X_{\imath \lambda}\right)=X_{x 2} f, \quad\left(X_{\imath x} X_{2 \mu}\right)=0`	$(X_{\imath x} X_{\imath\lambda}) = X_{x2} f, \quad (X_{\imath x} X_{2\mu}) = 0$	*und setze fest:* $(X_{\iota\varkappa} X_{\iota\lambda}) = X_{\varkappa\lambda} f$, $(X_{\iota\varkappa} X_{2\mu}) = 0$ *für ungleiche*
killing1889_F00732	42	0.921	`\iota, x, \lambda, \mu`	ι, x, λ, μ	*Werthe von* $\iota, \varkappa, \lambda, \mu$.
killing1889_F00733	42	0.916	`\iota, x=1 \ldots 2 l+1`	$\iota, x = 1 \ldots 2l+1$	*wähle man für* $\iota, \varkappa = 1 \ldots 2l+1$ *die inf. Transformationen*
killing1889_F00734	42	0.908	`X_{t x}\left(=-X_{x_{t}}\right)`	$X_{tx}\,(= -X_{x_t})$	$X_{\iota\varkappa} (= -X_{\varkappa\iota})$ *und lasse sein:*
killing1889_F00735	43	0.905	`\iota, \mathrm{x}`	ι, x	*Indem man ferner für positive Werthe* $\iota, \varkappa$ *die* $2l(l-1)$ *Coeffi-*
killing1889_F00736	43	0.905	`2 l(l-1)`	$2l(l-1)$	*Indem man ferner für positive Werthe* $\iota, \varkappa$ *die* $2l(l-1)$ *Coeffi-*
killing1889_F00737	43	0.777	`p_{\iota \times}`	$p_{\iota\times}$	*cienten* $p_{\iota\varkappa}$ *willkürlich wählt und für negative Werthe festsetzt, dass*
killing1889_F00738	44	0.624	`\omega_{\alpha}, \omega_{\beta}`	$\omega_\alpha, \omega_\beta$	$\omega_\alpha, \omega_\beta \ldots$ die Wurzeln für die Untergruppe sind, so müssen diese
killing1889_F00739	44	0.892	`l-1^{\text {ten }}`	$l - 1^{\text{ten}}$	*Gruppe von einer dieser vier Formen Untergruppen* $l - 1^{\text{ten}}$ *Ranges,*
killing1889_F00740	44	0.922	`-\omega_{1}+\omega_{2}`	$-\omega_1 + \omega_2$	Ersetzt man hier ω_1 durch $-\omega_1 + \omega_2$, so lassen sich die Wurzeln in
killing1889_F00741	44	0.912	`\omega_{1}, \omega_{2}, \omega_{3}, \omega_{4}, \omega_{5}, \omega_{6}`	$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$	Wurzeln sollen der Reihe nach durch $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$ und die
killing1889_F00742	44	0.904	`\omega_{1^{\prime}}, \omega_{2^{\prime}} \ldots \omega_{6^{\prime}}`	$\omega_{1'}, \omega_{2'} \ldots \omega_{6'}$	entgegengesetzt gleichen durch $\omega_{1'}, \omega_{2'} \ldots \omega_{6'}$ bezeichnet werden.
killing1889_F00743	44	0.890	`X_{\imath} f`	$X_\imath f$	Ebenso mögen die zugehörigen $X_\iota f$ dargestellt werden und statt
killing1889_F00744	44	0.893	`X_{r} f, X_{r-1} f`	$X_r f, X_{r-1} f$	$X_r f$, $X_{r-1} f$ resp. $X_7 f$ und $X_8 f$ geschrieben werden. Ausserdem soll
killing1889_F00745	44	0.893	`X_{7} f`	$X_7 f$	$X_r f$, $X_{r-1} f$ resp. $X_7 f$ und $X_8 f$ geschrieben werden. Ausserdem soll
killing1889_F00746	44	0.893	`X_{8} f`	$X_8 f$	$X_r f$, $X_{r-1} f$ resp. $X_7 f$ und $X_8 f$ geschrieben werden. Ausserdem soll
killing1889_F00747	45	0.650	`e_{3}^{\prime} \ldots e_{6}^{\prime}`	$e_3' \ldots e_6'$	und entsprechend für $e_3' \ldots e_6'$.
killing1889_F00748	45	0.314	`(t, t, x)`	(t, t, x)	Die Jacobi'schen Relationen $(\iota, \iota', \varkappa)$ liefern für $g_\iota^2 = E_\iota$ folgende
killing1889_F00749	45	0.314	`g_{i}{ }^{2}=E_{i}`	$g_i{}^2 = E_i$	Die Jacobi'schen Relationen $(\iota, \iota', \varkappa)$ liefern für $g_\iota^2 = E_\iota$ folgende
killing1889_F00750	45	0.799	`X_{7}`	X_7	Durch passende Wahl von X_7 und X_8 in ihrer zweigliedrigen
killing1889_F00751	45	0.799	`X_{8}`	X_8	Durch passende Wahl von X_7 und X_8 in ihrer zweigliedrigen
killing1889_F00752	45	0.494	`X_{1^{\prime}}`	$X_{1'}$	Untergruppe und durch Multiplication von $X_{1'}$ und $X_{2'}$ mit einem
killing1889_F00753	45	0.494	`X_{z}`	X_z	Untergruppe und durch Multiplication von $X_{1'}$ und $X_{2'}$ mit einem
killing1889_F00754	45	0.585	`X_{3}, X_{3^{\prime}} \ldots`	$X_3, X_{3'} \ldots$	Ebenso kann man $X_3, X_{3'} \ldots$ mit gewissen Factoren multipli-
killing1889_F00755	45	0.930	`p_{5}=1`	$p_5 = 1$	Dann ist zugleich $p_5 = 1$.
killing1889_F00756	46	0.830	`\omega_{1}-\omega_{2}`	$\omega_1 - \omega_2$	Da man unmittelbar übersieht, welche Werthe jetzt $\omega_1 - \omega_2$ u. s. w.,
killing1889_F00757	46	0.883	`c_{124}`	c_{124}	sowie c_{124} und die weiteren c annehmen, wird es nicht nöthig sein,
killing1889_F00758	46	0.597	`e_{\imath}{ }^{\nu}, g_{\imath}{ }^{2}`	$e_\imath{}^\nu, g_\imath{}^2$	bezeichnen. In entsprechender Weise werden auch die e_ι^ν, g_ι^2 u. s. w.
killing1889_F00759	46	0.921	`\pm \iota`	$\pm\iota$	die sämmtlichen c berechnen, unter deren Marken eine Marke $\pm\iota$
killing1889_F00760	47	0.769	`\pm x_{i} \pm x_{x}`	$\pm x_i \pm x_x$	$\pm \varkappa_\iota \pm \varkappa_\varkappa$ dar, wo $\iota, \varkappa$ ungleiche Marken der Reihe $1 \ldots 5$ sind.
killing1889_F00761	47	0.769	`1 \ldots 5`	$1 \ldots 5$	$\pm \varkappa_\iota \pm \varkappa_\varkappa$ dar, wo $\iota, \varkappa$ ungleiche Marken der Reihe $1 \ldots 5$ sind.
killing1889_F00762	48	0.913	`1 \ldots 7`	$1 \ldots 7$	wo $\iota, \varkappa \ldots$ ungleiche Marken der Reihe $1 \ldots 7$ sind. Die Berechnung
killing1889_F00763	48	0.455	`\left(X_{\imath} X_{x}\right)`	$(X_\imath X_x)$	beliebigen Factoren, so ändern sich die Ausdrücke für $(X_\iota X_\varkappa)$, aber