

BH3FR: formula evidence

The page, the confidence and the picture of an inline formula are its HOST LINE’s — a formula has none of its own. A line’s confidence is not a formula’s.

Inline formulas (first occurrence)

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
BH3FR_F00001	8	■ 1.000	$Y_{\{j\}}$	Y_j	den Y_j mit dem laufenden Index $j \geq 1$ auf, die lediglich Unsicher-
BH3FR_F00002	8	■ 1.000	$j \geqq 1$	$j \geq 1$	den Y_j mit dem laufenden Index $j \geq 1$ auf, die lediglich Unsicher-
BH3FR_F00003	8	■ 1.000	$Y_{\{k\}}=1$	$Y_k = 1$	sprechend gilt für alle $Y_k = 1$, doch ist es denkbar, daß bei einem spä-
BH3FR_F00004	8	■ 1.000	$Y_{\{j\}} \neq 1$	$Y_j \neq 1$	turen $Y_j \neq 1$ zum Ausgleich der Mißweisungen bedingen, so daß diese
BH3FR_F00005	8	■ 1.000	$Y_{\{k\}}$	Y_k	schen Schemas notwendig werden müßte. Unsicherheitsfaktoren Y_k
BH3FR_F00006	9	■ 1.000	$\tau=0$	$\tau = 0$	Gültigkeitsbereich des Infinitesimalkalküls $\tau = 0$ handelt. Lediglich
BH3FR_F00007	9	■ 0.950	c	C	Norm abgewichen. So wird C durch das Zeichen $\wedge$ in der Form $\hat{C}$ als
BH3FR_F00008	9	■ 0.950	$\{ \}^{\wedge \text{\texttt{\textasciitext{^}}}}$	<i>(not rendered)</i>	Norm abgewichen. So wird C durch das Zeichen $\wedge$ in der Form $\hat{C}$ als
BH3FR_F00009	9	■ 0.950	$\hat{C}$	$\hat{C}$	Norm abgewichen. So wird C durch das Zeichen $\wedge$ in der Form $\hat{C}$ als
BH3FR_F00010	9	■ 1.000	$C_{\{i\ k\}}$	C_{ik}	Matrix ausgewiesen. Sind die Matricelemente C_{ik} solche des komple-
BH3FR_F00011	9	■ 1.000	$C_{\{i\ k\}} \neq C_{\{i\ k\}}^*$	$C_{ik} \neq C_{ik}^*$	xen algebraischen Körpers, dann bedeutet dies $C_{ik} \neq C_{ik}^*$; wird jedoch
BH3FR_F00012	9	■ 0.639	x	x	dann wird dies durch das Zeichen $\times$ in der Form $(C_{ik})^\times = C_{ki}^*$ zum
BH3FR_F00013	9	■ 0.639	$\left(C_{\{i\ k\}}\right)^{\times}=C_{\{k\ i\}}^*$	$(C_{ik})^\times = C_{ki}^*$	dann wird dies durch das Zeichen $\times$ in der Form $(C_{ik})^\times = C_{ki}^*$ zum
BH3FR_F00014	9	■ 1.000	$[a,\ b]=a\ b-b\ a$	$[a,b] = ab - ba$	$[a,b] = ab - ba$ wird das alte Symbol $(a \times b)_\pm = ab \pm ba$ verwendet,
BH3FR_F00015	9	■ 1.000	$(a\ \times\ b)_\pm=a\ b\ \pm\ b\ a$	$(a \times b)_\pm = ab \pm ba$	$[a,b] = ab - ba$ wird das alte Symbol $(a \times b)_\pm = ab \pm ba$ verwendet,
BH3FR_F00016	9	■ 0.992	$[a,\ b]$	$[a,b]$	denn $[a,b]$ wurde von <i>Heim</i> in früheren Studien bereits für einen an-
BH3FR_F00017	9	■ 1.000	$R_{\{3\}}$	R_3	und rot im R_3 verwendet, weil bei der Arbeit in höher dimensionier-
BH3FR_F00018	9	■ 0.998	$R_{\{n\}}$	R_n	ten Räumen R_n der Operator mit der Dimensionszahl n gemäß div_n ,
BH3FR_F00019	9	■ 0.998	n	n	ten Räumen R_n der Operator mit der Dimensionszahl n gemäß div_n ,
BH3FR_F00020	9	■ 0.998	$\operatorname{div}_{\{n\}}$	div_n	ten Räumen R_n der Operator mit der Dimensionszahl n gemäß div_n ,
BH3FR_F00021	9	■ 0.999	$\operatorname{grad}_{\{n\}}$	grad_n	grad_n und rot_n indizierbar wird. Hier beschreibt div_n jedoch nur
BH3FR_F00022	9	■ 0.999	$\operatorname{rot}_{\{n\}}$	rot_n	grad_n und rot_n indizierbar wird. Hier beschreibt div_n jedoch nur
BH3FR_F00023	9	■ 1.000	$R_{\{\mathrm{n}\}}$	$R_{\mathfrak{n}}$	die Skalardivergenz eines Vektorfeldes im $R_{\mathfrak{n}}$. Handelt es sich um die
BH3FR_F00024	9	■ 1.000	m	m	den Tensorgrad m um 1 verjüngende Vektordivergenz eines Tensor-
BH3FR_F00025	9	■ 0.999	$\overline{\operatorname{div}_{\{n\}}}$	$\overline{\text{div}}_n$	feldes, dann wird dies durch $\overline{\text{div}}_n$ symbolisiert, während die den Ten-
BH3FR_F00026	9	■ 1.000	$m+1$	$m + 1$	sorgrad m auf $m + 1$ erweiternde Tensordivergenz des betreffenden
BH3FR_F00027	9	■ 1.000	$\widehat{\operatorname{div}_{\{n\}}}$	$\widehat{\text{div}}_n$	Feldes durch $\widehat{\text{div}}_n$ ausgedrückt wird. Diese Operatoren werden jedoch
BH3FR_F00028	9	■ 1.000	$\tau>0$	$\tau > 0$	In den Gültigkeitsbereichen $\tau > 0$ wird hingegen eine von DIN
BH3FR_F00029	12	■ 1.000	$E=m\ .\ c^{\{2\}}$	$E = m.c^2$	Materieäquivalents $E = m \cdot c^2$.
BH3FR_F00030	12	■ 0.978	$2,7^{\{\circ\}}\ K$	$2,7^\circ K$	sche $2,7^\circ K$ Hintergrundstrahlung entdeckten, ein Relikt aus der An-
BH3FR_F00031	16	■ 0.940	$\mathrm{W}^{\{\ \pm \}}$	$W^\pm$	Gluonen und die schwache durch das $W^\pm$ - und Z^0 -Boson vermittelt.
BH3FR_F00032	16	■ 0.940	$\mathrm{Z}^{\{\circ\}}$	Z°	Gluonen und die schwache durch das $W^\pm$ - und Z^0 -Boson vermittelt.
BH3FR_F00033	19	■ 1.000	τ	τ	Am Ende der 70er Jahre wurde das τ , ein zur Gruppe der Leptonen
BH3FR_F00034	19	■ 0.933	$W^{\{\ \pm \}}$	$W^\pm$	gehöriges Teilchen entdeckt und 1984 wurden die $W^\pm$ und Z^0
BH3FR_F00035	19	■ 0.933	$Z^{\{0^{\{-\}}\}}$	Z^{0^-}	gehöriges Teilchen entdeckt und 1984 wurden die $W^\pm$ und Z^0
BH3FR_F00036	20	■ 0.662	$\mathrm{W}\ \pm, \mathrm{Z}^{\{\mathrm{o}\}}$	$W^\pm, Z^\circ$	wirkung ($W^\pm, Z^0$ -Bosonen) und für eine verborgene Symmetrie die far-
BH3FR_F00037	21	■ 1.000	$S\ U(2)\ \times\ U(1)$	$SU(2) \times U(1)$	die Gruppe $SU(2) \times U(1)$ ist. Durch den empirischen Nachweis der
BH3FR_F00038	21	■ 1.000	$Z^{\{o\}}$	Z°	$W^\pm$ und Z^0 -Bosonen, welche Träger der schwachen Wechselwirkung

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
BH3FR_F00039	21	■ 0.991	$S\ U(5)$	$SU(5)$	Die $SU(5)$ -Theorie kann aber das beobachtete kosmologische Baryon-
BH3FR_F00040	21	■ 1.000	$e, \ \mu$	e, μ	denen Leptonen e, μ und τ und die zugehörigen Neutrinos ν_e, ν_μ, ν_τ
BH3FR_F00041	21	■ 1.000	$v_{\{\backslash varepsilon\}}, v_{\{\backslash mu\}}, v_{\{\backslash tau\}}$	$v_\varepsilon, v_\mu, v_\tau$	denen Leptonen e, μ und τ und die zugehörigen Neutrinos ν_e, ν_μ, ν_τ
BH3FR_F00042	22	■ 1.000	$S\ U(3)$	$SU(3)$	der Teilchen ergeben. Die Eichgruppe $SU(3)$ der starken Wechsel-
BH3FR_F00043	22	■ 0.991	$S\ O(3)$	$SO(3)$	nicht der Gruppe $SU(3)$ mit 8 Gluonen, sondern der Gruppe $SO(3)$
BH3FR_F00044	23	■ 0.944	$10^{\{-33\}}\ c\ m$	$10^{-33}cm$	den im Bereich der <i>Planckschen Länge</i> ($10^{-33}cm$) ständig <i>Wurm</i> -
BH3FR_F00045	24	■ 1.000	N	N	durch die Zahl N bestimmt sind. Unter der Annahme von $N = 8$ er-
BH3FR_F00046	24	■ 1.000	$N=8$	$N = 8$	durch die Zahl N bestimmt sind. Unter der Annahme von $N = 8$ er-
BH3FR_F00047	24	■ 0.996	$s=0,56$	$s = 0,56$	hält man 70 Teilchen mit Spin $s = 0$, 56 Teilchen mit $s = 1/2$, 28
BH3FR_F00048	24	■ 0.996	$s=1\ /\ 2,28$	$s = 1/2,28$	hält man 70 Teilchen mit Spin $s = 0$, 56 Teilchen mit $s = 1/2$, 28
BH3FR_F00049	24	■ 1.000	$s=1,8$	$s = 1,8$	Teilchen mit $s = 1,8$ Teilchen mit $s = 3/2$ und 1 Teilchen mit $s = 2$.
BH3FR_F00050	24	■ 1.000	$s=3\ /\ 2$	$s = 3/2$	Teilchen mit $s = 1,8$ Teilchen mit $s = 3/2$ und 1 Teilchen mit $s = 2$.
BH3FR_F00051	24	■ 1.000	$s=2$	$s = 2$	Teilchen mit $s = 1,8$ Teilchen mit $s = 3/2$ und 1 Teilchen mit $s = 2$.
BH3FR_F00052	24	■ 1.000	$N>8$	$N > 8$	noch immer zu klein ist. Für $N > 8$ treten mindestens zwei Gravito-
BH3FR_F00053	24	■ 1.000	c	c	nicht mit der Lichtgeschwindigkeit c , sondern wahrscheinlicherweise
BH3FR_F00054	24	■ 1.000	$\omega=4\ /\ 3\ c$	$\omega = 4/3c$	mit $\omega = 4/3c$ in einem vierdimensionalen Raum mit den Koordina-
BH3FR_F00055	24	■ 1.000	$x_{\{1\}}, x_{\{2\}}, x_{\{3\}}, \ \omega\epsilon\ t$	$x_1, x_2, x_3, \omega t$	ten $x_1, x_2, x_3, \omega t$, der als R_{+4} bezeichnet wird, aus. Der R_{+4} ist aus-
BH3FR_F00056	24	■ 1.000	$R_{\{+4\}}$	R_{+4}	ten $x_1, x_2, x_3, \omega t$, der als R_{+4} bezeichnet wird, aus. Der R_{+4} ist aus-
BH3FR_F00057	25	■ 1.000	$R_{\{-4\}}$	R_{-4}	kowski-Raum R_{-4} , dessen Koordinaten $x_1, x_2, x_3, \ i\epsilon\ t$ lauten, alle an-
BH3FR_F00058	25	■ 1.000	$x_{\{1\}}, x_{\{2\}}, x_{\{3\}}$	x_1, x_2, x_3	kowski-Raum R_{-4} , dessen Koordinaten $x_1, x_2, x_3, \ i\epsilon\ t$ lauten, alle an-
BH3FR_F00059	25	■ 1.000	$R_{\{6\}}$	R_6	Raum R_6 . Der allgemeinen Relativitätstheorie nach sollten sich Gra-
BH3FR_F00060	25	■ 1.000	$g_{\{i\ k\}}$	g_{ik}	Tensor g_{ik} und interpretiert wie EINSTEIN dessen symmetrischen Teil
BH3FR_F00061	25	■ 1.000	$g_{\{i\ k+\}}$	g_{ik+}	g_{ik+} als Gravitationspotential bzw. den antisymmetrischen Teil g_{ik-}
BH3FR_F00062	25	■ 1.000	$g_{\{i\ k-\}}$	g_{ik-}	g_{ik+} als Gravitationspotential bzw. den antisymmetrischen Teil g_{ik-}
BH3FR_F00063	25	■ 1.000	$\backslash\mathrm{bar}\{\backslash\kappa\}^{\{i\}}$	$\bar{\kappa}^i$	strukturen $\bar{\kappa}^i$ auf. Wegen der Existenz von einer nicht unterschreitba-
BH3FR_F00064	25	■ 1.000	i	i	Die Zuordnung von n zu den Indizes i und k , um n_i und
BH3FR_F00065	25	■ 1.000	k	k	Die Zuordnung von n zu den Indizes i und k , um n_i und
BH3FR_F00066	25	■ 1.000	$n_{\{i\}}$	n_i	Die Zuordnung von n zu den Indizes i und k , um n_i und
BH3FR_F00067	25	■ 1.000	$n_{\{k\}}$	n_k	n_k zu bilden, ist hier bereits im Selektor (Operator) $\gamma_{(\mu\nu)}^{ik}$ enthalten.
BH3FR_F00068	25	■ 1.000	$\gamma_{\{(\backslash\mu\ v)\}}^{\{i\ k\}}$	$\gamma_{(\mu\nu)}^{ik}$	n_k zu bilden, ist hier bereits im Selektor (Operator) $\gamma_{(\mu\nu)}^{ik}$ enthalten.
BH3FR_F00069	26	■ 0.419	$\backslash\mathrm{left}[\backslash\mathrm{begin}\{\mathrm{array}\}\{\mathrm{c}\}\backslash\mathrm{widehat}\{\backslash\kappa\}\ \backslash\mathrm{lambda}\}\ \backslash\backslash\ -\mathrm{t}\ \backslash\backslash\ \backslash\mathrm{mu}\ \backslash\mathrm{nu}\backslash\mathrm{end}\{\mathrm{array}\}\backslash\mathrm{right}]$	$\left[\begin{array}{c}\widehat{\kappa\lambda}\\-t\\\mu\nu\end{array}\right]$	talkondensoren $\left[\begin{array}{c}\widehat{\kappa\lambda}\\-+\\\mu\nu\end{array}\right]$ bilden. Wegen $\mu, \nu = 1$ bis 3 entsteht eine
BH3FR_F00070	26	■ 0.419	$\backslash\mathrm{mu},\ \backslash\mathrm{nu}=1$	$\mu, \nu = 1$	talkondensoren $\left[\begin{array}{c}\widehat{\kappa\lambda}\\-+\\\mu\nu\end{array}\right]$ bilden. Wegen $\mu, \nu = 1$ bis 3 entsteht eine
BH3FR_F00071	26	■ 1.000	$R_{\{4\}}$	R_4	vierdimensionale Raum-Zeit R_4 eingebettet liegt, wird gequantelt.
BH3FR_F00072	27	■ 0.884	$R_{\{6\}}\ \backslash\mathrm{mathrm}\{\mathrm{ab}\}$	$R_6\mathrm{ab}$	in einem R_6 ab. Die zeitartigen Transkoordinaten x_5 und x_6 , die
BH3FR_F00073	27	■ 0.884	$x_{\{5\}}$	x_5	in einem R_6 ab. Die zeitartigen Transkoordinaten x_5 und x_6 , die
BH3FR_F00074	27	■ 0.884	$x_{\{6\}}$	x_6	in einem R_6 ab. Die zeitartigen Transkoordinaten x_5 und x_6 , die
BH3FR_F00075	27	■ 1.000	$x_{\{1\}}$	x_1	koordinaten x_1 bis x_6 wird x_5 als <i>entelechale</i> und x_6 als <i>äonische Di-</i>
BH3FR_F00076	27	■ 1.000	$x_{\{4\}},\ x_{\{5\}},\ x_{\{6\}}$	x_4, x_5, x_6	<i>mension</i> bezeichnet, wobei x_4, x_5, x_6 imaginärer Natur sind. $x_5 = i\epsilon$
BH3FR_F00077	27	■ 1.000	$x_{\{5\}}=i\ \backslash\mathrm{varepsilon}$	$x_5 = i\varepsilon$	<i>mension</i> bezeichnet, wobei x_4, x_5, x_6 imaginärer Natur sind. $x_5 = i\epsilon$
BH3FR_F00078	27	■ 1.000	$x_{\{6\}}=i\ \backslash\mathrm{eta}$	$x_6 = i\eta$	ganisation), wogegen $x_6 = i\eta$ diejenige Koordinate ist, durch welche
BH3FR_F00079	27	■ 1.000	$x_{\{4\}}$	x_4	und demnach, getrennt durch eine über x_4 vermittelte Zeitspanne, ein
BH3FR_F00080	27	■ 1.000	$\backslash\mathrm{tau}\ \backslash\mathrm{rightarrow}\ 0$	$\tau \rightarrow 0$	$\tau \rightarrow 0$ erfüllt sein. Infolgedessen rechnet HEIM anstelle von Wahr-

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
BH3FR_F00081	29	■ 1.000	D	D	messer des Universums D und τ der funktionale Zusammenhang
BH3FR_F00082	29	■ 1.000	D=D(\tau)	$D = D(\tau)$	$D = D(\tau)$ besteht. D ist hier ebenfalls größer, als bisher bestimmt
BH3FR_F00083	29	■ 0.959	$e^2 / \hbar c$	$e^2 / \hbar c$	kung $e^2 / \hbar c$ ist hingegen bei HEIM ein von D unabhängiger Zahlen-
BH3FR_F00084	29	■ 1.000	γ, h, ε_o	γ, h, ε_o	men. Als empirische Naturkonstanten werden nur γ, h, ε_o und μ_o ver-
BH3FR_F00085	29	■ 1.000	μ_o	μ_o	men. Als empirische Naturkonstanten werden nur γ, h, ε_o und μ_o ver-
BH3FR_F00086	32	■ 1.000	$n \geq 4$	$n \geq 4$	kungsfelder nur $n \geq 4$ gesetzt werden, so daß der tatsächlich noch unbe-
BH3FR_F00087	32	■ 1.000	$m \geq 1$	$m \geq 1$	kann man also $m \geq 1$ nicht eichinvariante und $n - m > 0$ eichinvariante
BH3FR_F00088	32	■ 1.000	$n - m > 0$	$n - m > 0$	kann man also $m \geq 1$ nicht eichinvariante und $n - m > 0$ eichinvariante
BH3FR_F00089	32	■ 0.999	$1 \leq m < n$	$1 \leq m < n$	Felder konzipieren, wobei n und m in $1 \leq m < n$ und $4 \leq n < \infty$ liegen,
BH3FR_F00090	32	■ 0.999	$4 \leq n < \infty$	$4 \leq n < \infty$	Felder konzipieren, wobei n und m in $1 \leq m < n$ und $4 \leq n < \infty$ liegen,
BH3FR_F00091	34	■ 1.000	$\pm \infty$	$\pm \infty$	gegen $\pm \infty$ divergieren, woraus folgt, daß die Einführung des Quanten-
BH3FR_F00092	35	■ 1.000	$4^3 = 64$	$4^3 = 64$	Ziffern 1 bis 4 der Raumzeitkoordinaten durchlaufen, gibt es $4^3 = 64$
BH3FR_F00093	35	■ 1.000	$64 - 28 = 36$	$64 - 28 = 36$	werden brauchen, so daß mit $64 - 28 = 36$ Spektren zu rechnen ist.
BH3FR_F00094	36	■ 1.000	β	β	Lösung (11) bis (11c) die Feldfunktion implizit enthält und einer β -
BH3FR_F00095	37	■ 0.860	∞	∞	schranke gegen 0, aber die Wellenlänge gegen ∞ geht. Nach Substitu-
BH3FR_F00096	38	■ 1.000	p	p	sionalen Raum mit p -dimensionalen Metronen. Da hier der In-
BH3FR_F00097	38	■ 1.000	$\tau =$	$\tau =$	Raum projiziert, dann würden wegen $\tau = \text{const}$ die Metronen im Be-
BH3FR_F00098	39	■ 1.000	a	a	fen wäre also die Hermetrieform a der Selbstkondensationen der beiden
BH3FR_F00099	40	■ 1.000	b	b	nen liefert die Lösungsmannigfaltigkeit der Hermetrieform b als Zeit-
BH3FR_F00100	40	■ 1.000	d	d	form d liefert. Auch hier handelt es sich um Terme mit Ruhemasse, bei
BH3FR_F00101	43	■ 1.000	m_L	m_L	c -Spektrums als m_L und die angenäherte Masse $m_e > m_L$ als die untere
BH3FR_F00102	43	■ 1.000	$m_e > m_L$	$m_e > m_L$	c -Spektrums als m_L und die angenäherte Masse $m_e > m_L$ als die untere
BH3FR_F00103	43	■ 1.000	m_e	m_e	(27) und (27a) wäre zu m_e noch ein neutrales Komplement m_B denk-
BH3FR_F00104	43	■ 1.000	m_B	m_B	(27) und (27a) wäre zu m_e noch ein neutrales Komplement m_B denk-
BH3FR_F00105	43	■ 1.000	1%	1%	um ca. 1% von m_e unterscheiden. Es sei hier bemerkt, daß sich aus die-
BH3FR_F00106	46	■ 1.000	π	π	Zahlen und die beiden natürlichen Grenzwerte π und e (Basis natürli-
BH3FR_F00107	46	■ 1.000	e	e	Zahlen und die beiden natürlichen Grenzwerte π und e (Basis natürli-
BH3FR_F00108	46	■ 1.000	A	A	Verhältnis A in (38) nur die Möglichkeiten $A \neq 0$ oder $A = 0$ gibt,
BH3FR_F00109	46	■ 1.000	$A \neq 0$	$A \neq 0$	Verhältnis A in (38) nur die Möglichkeiten $A \neq 0$ oder $A = 0$ gibt,
BH3FR_F00110	46	■ 1.000	$A = 0$	$A = 0$	Verhältnis A in (38) nur die Möglichkeiten $A \neq 0$ oder $A = 0$ gibt,
BH3FR_F00111	47	■ 1.000	$D / 2$	$D / 2$	aber zur Folge, daß die beschriebene Diskrepanz zwischen $D / 2$ und
BH3FR_F00112	50	■ 1.000	v	v	und v im zeitlichen Nullpunkt einsetzen und mit der Kugelflächenbe-
BH3FR_F00113	50	■ 1.000	η	η	Gleichung höheren Grades, die jedoch mit einer Substitution η für die-
BH3FR_F00114	58	■ 1.000	(a, b)	(a, b)	diesem Sachverhalt. Die Eigenschaft der Imponderabilität (a, b) oder
BH3FR_F00115	58	■ 1.000	(c, d)	(c, d)	die der Ponderabilität (c, d) wird allein vom algebraischen Verhalten
BH3FR_F00116	61	■ 0.984	$1 / 2$	$1 / 2$	ist. Dieser Faktor $1 / 2$ entsteht dadurch, daß bei der Protosimplexkor-
BH3FR_F00117	62	■ 0.999	Q	Q	doppelte Spinquantenzahl Q für den Raumspin und die doppelte Spin-
BH3FR_F00118	62	■ 1.000	P	P	quantenzahl P für die imaginäre Stratonspinkomponente (Isomorphie-
BH3FR_F00119	63	■ 1.000	± 1	± 1	Vielfachen von π , so daß die Zeithelizität nur die Werte ± 1 haben
BH3FR_F00120	64	■ 1.000	k, P, Q	k, P, Q	zung von invarianten Parametern, also von Quantenzahlen (wie k, P, Q
BH3FR_F00121	64	■ 1.000	q	q	und q als elektrische Ladungszahl) bestimmt werden. Da die Eigen-
BH3FR_F00122	64	■ 1.000	$\beta \approx 1$	$\beta \approx 1$	$\beta \approx 1$ gesetzt werden kann. Als Massenbeiträge der möglichen Proto-
BH3FR_F00123	65	■ 1.000	$k = 1$	$k = 1$	nach nur die Möglichkeiten $k = 1$ oder $k = 2$, während die elektrische
BH3FR_F00124	65	■ 1.000	$k = 2$	$k = 2$	nach nur die Möglichkeiten $k = 1$ oder $k = 2$, während die elektrische
BH3FR_F00125	66	■ 1.000	ε	ε	mus), sowie dem doppelten Raumspin Q und der Zeithelizität ε nach
BH3FR_F00126	66	■ 1.000	κ	κ	(93) noch eine Doublettziffer κ nach (99a) und einen Strukturdistribu-

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
BH3FR_F00127	66	■ 1.000	$q_{\{x\}}$	q_x	quantenzahl q_x (mit Ladungsvorzeichen) der Komponente x eines sol-
BH3FR_F00128	67	■ 1.000	$P / 2$	$P/2$	schen Gründen eingeführten Baryonenzahl, aber $P / 2$ mit der ebenfalls
BH3FR_F00129	67	■ 1.000	$Q / 2$	$Q/2$	sprechend ist $Q / 2$ mit der empirischen Spinquantenzahl und der
BH3FR_F00130	67	■ 1.000	Δ	Δ	tisch. Das baryonische Δ -Quartett erscheint empirisch als Anfang der
BH3FR_F00131	67	■ 1.000	o	o	Δ -Resonanzen, während das o -Quartett bis auf o^{--} durchaus empi-
BH3FR_F00132	67	■ 1.000	$o^{\{- - \}}$	o^{--}	Δ -Resonanzen, während das o -Quartett bis auf o^{--} durchaus empi-
BH3FR_F00133	67	■ 1.000	Ξ	Ξ	risch entsprechende Ξ -Resonanzen vortäuschen kann. Die Interpreta-
BH3FR_F00134	68	■ 1.000	$G=k+1$	$G = k + 1$	wie eine solche des Isospins. Unterstellt man hingegen die $G=k+1$
BH3FR_F00135	69	■ 0.700	e^-	e^-	nächst wurde die Wechselbeziehung eines e^- im s -Term eines p -Feldes
BH3FR_F00136	69	■ 0.700	s	s	nächst wurde die Wechselbeziehung eines e^- im s -Term eines p -Feldes
BH3FR_F00137	69	■ 1.000	H	H	im H -Atom untersucht. Das elektrische Feld erscheint wegen seiner
BH3FR_F00138	69	■ 0.749	$e^{\{- \}}$	e^-	Eichinvarianz als Folge der Kondensorflüsse nur zwischen e^- und p ,
BH3FR_F00139	70	■ 0.731	$(+2)$	$(+2)$	$(+2)$ verursachte Feld nicht mehr relativer Natur i. B. auf den rotieren-
BH3FR_F00140	73	■ 1.000	ξ	ξ	bonacci-Limes ξ zurückgehen. Schließlich konnte noch der auf die
BH3FR_F00141	73	■ 1.000	$k, P, Q, \kappa, C, q_{\{x\}}$	k, P, Q, κ, C, q_x	Quantenzahlen k, P, Q, κ, C, q_x und der Zeithelizität ε , sowie durch 4
BH3FR_F00142	74	■ 1.000	G	G	mengesetzt aus den G Partialaggregaten) betragen (117) . Würde ein tief
BH3FR_F00143	79	■ 1.000	π, e	π, e	nen auf die natürlichen Grenzwerte π, e und ζ nach (110d) und zum an-
BH3FR_F00144	79	■ 1.000	ζ	ζ	nen auf die natürlichen Grenzwerte π, e und ζ nach (110d) und zum an-
BH3FR_F00145	79	■ 1.000	$B=k-1$	$B = k - 1$	$B=k-1$ substituiert werden kann, für die es wegen (98a) nur die bei-
BH3FR_F00146	80	■ 1.000	$(2, 21)$	$(2, 21)$	tionsintervall der physischen Zeit) gesteuert wird. $(2, 21)$
BH3FR_F00147	80	■ 1.000	$(2, 24)$	$(2, 24)$	fen kommt. $(2, 24)$
BH3FR_F00148	80	■ 1.000	$(2, 83)$	$(2, 83)$	schen $\rightarrow$ Fundamentalselektors. $(2, 83)$
BH3FR_F00149	80	■ 1.000	$(2, 220)$	$(2, 220)$	junktor. $(2, 220)$
BH3FR_F00150	80	■ 1.000	$(2, 67)$	$(2, 67)$	tervalles des Unterraumes physischer Raumzeit. $(2, 67)$
BH3FR_F00151	80	■ 0.996	$(2, 13)$	$(2, 13)$	kommt. $(2, 13)$
BH3FR_F00152	80	■ 1.000	$(2, 325)$	$(2, 325)$	Grundbesetzung als Gerüststruktur. $(2, 325)$
BH3FR_F00153	81	■ 1.000	$(2, 27)$	$(2, 27)$	teilbare Zeitelement. $(2, 27)$
BH3FR_F00154	81	■ 1.000	$(2, 285)$	$(2, 285)$	empirischen Seltsamkeitszahl identisch ist. $(2, 285)$
BH3FR_F00155	81	■ 1.000	$(2, 283)$	$(2, 283)$	mehrfachen Isospindoublets verständlich macht. $(2, 283)$
BH3FR_F00156	81	■ 1.000	$(2, 62)$	$(2, 62)$	Sphären (räumlich) als Endereignis der Raumzeit. $(2, 62)$
BH3FR_F00157	82	■ 1.000	$(2, 262)$	$(2, 262)$	xer Hermetrie. $(2, 262)$
BH3FR_F00158	82	■ 1.000	$(2, 82)$	$(2, 82)$	damentaltensors. $(2, 82)$
BH3FR_F00159	82	■ 1.000	$(2, 186)$	$(2, 186)$	$\rightarrow$ metronischer Kondensationen. $(2, 186)$
BH3FR_F00160	82	■ 1.000	$(2, 201)$	$(2, 201)$	des $\rightarrow$ Fluktons. $(2, 201)$
BH3FR_F00161	82	■ 0.992	$(2, 197)$	$(2, 197)$	Fluktonkonjugation: Zyklischer Austausch von $\rightarrow$ Fluktonen. $(2, 197)$
BH3FR_F00162	82	■ 0.979	$(2, 158)$	$(2, 158)$	$\rightarrow$ Fluktonen. $(2, 158)$
BH3FR_F00163	82	■ 0.978	$(2, 112)$	$(2, 112)$	reich durch den $\rightarrow$ Korrelationsexponenten bestimmt wird. $(2, 112)$
BH3FR_F00164	82	■ 1.000	$(2, 115)$	$(2, 115)$	beschreibt. $(2, 115)$
BH3FR_F00165	82	■ 1.000	$(2, 108)$	$(2, 108)$	$\rightarrow$ Korrelationstensor ausgedrückt wird. $(2, 108)$
BH3FR_F00166	83	■ 1.000	$(2, 58)$	$(2, 58)$	$\rightarrow$ eschatologischen Sphärentrinität. $(2, 58)$
BH3FR_F00167	84	■ 0.999	$(2, 261)$	$(2, 261)$	zwischen der $\rightarrow$ Zentralzone und der $\rightarrow$ Mesozone liegt. $(2, 261)$
BH3FR_F00168	85	■ 1.000	$(2, 213)$	$(2, 213)$	schen Isospin identisch ist. $(2, 213)$
BH3FR_F00169	85	■ 1.000	$(2, 353)$	$(2, 353)$	$\rightarrow$ Isomorphiespin bestimmt wird. $(2, 353)$
BH3FR_F00170	85	■ 1.000	$(2, 122)$	$(2, 122)$	$(2, 122)$
BH3FR_F00171	85	■ 1.000	$(2, 156)$	$(2, 156)$	ximum erfolgt. $(2, 156)$
BH3FR_F00172	86	■ 0.999	$(2, 25)$	$(2, 25)$	keit vom momentanen $\rightarrow$ Weltalter kompensiert wird. $(2, 25)$
BH3FR_F00173	86	■ 1.000	$(2, 123)$	$(2, 123)$	$(2, 123)$

Identifier	Page	Conf.	LaTeX source	Rendered	Image
BH3FR_F00174	86	■ 1.000	(2,263)	(2,263)	ist. (2, 263)
BH3FR_F00175	86	■ 1.000	(2,203)	(2,203)	(2, 203)
BH3FR_F00176	86	■ 0.983	(2,196)	(2,196)	ver Art zwischen $\rightarrow$ Protosimplexen. (2, 196)
BH3FR_F00177	86	■ 1.000	(2,202)	(2,202)	(2, 202)
BH3FR_F00178	86	■ 1.000	(2,198)	(2,198)	rien dieser Struktur. (2, 198)
BH3FR_F00179	87	■ 0.797	(2,91)	(2,91)	$\rightarrow$ kompositiven Term einer $\rightarrow$ komplexen Hermetrieform. (2, 91)
BH3FR_F00180	88	■ 1.000	(2,119)	(2,119)	(2, 119)
BH3FR_F00181	88	■ 0.615	(2,233)	(2,233)	Richtung der übergreifenden $\rightarrow$ Kondensorflüsse anzeigt. (2, 233)
BH3FR_F00182	89	■ 1.000	(2,40)	(2,40)	schraken liegt. (2, 40)
BH3FR_F00183	91	■ 0.777	(2,190)	(2,190)	des $\rightarrow$ Fluktons und der $\rightarrow$ Schirmfelder aufgebaut ist. (2, 190)
BH3FR_F00184	91	■ 1.000	(2,324)	(2,324)	kann. (2, 324)
BH3FR_F00185	91	■ 0.995	(2,195)	(2,195)	stets die Protosimplexladung 1 zukommt. (2, 195)
BH3FR_F00186	91	■ 0.999	(2,341)	(2,341)	der $\rightarrow$ Mesozone in die $\rightarrow$ Externzone als Folge einer Linearität. (2, 341)
BH3FR_F00187	91	■ 1.000	(2,191)	(2,191)	fe strukturieren. (2, 191)
BH3FR_F00188	92	■ 1.000	(2,23)	(2,23)	terraumes der Raumzeit in den physischen Raum. (2, 23)
BH3FR_F00189	92	■ 1.000	(2,211)	(2,211)	Spinquantenzahl beschrieben wird. (2, 211)
BH3FR_F00190	92	■ 1.000	(2,230)	(2,230)	selwirkung. (2,230)
BH3FR_F00191	92	■ 1.000	(2,337)	(2,337)	Massenterms des betreffenden Grundmusters markiert. (2, 337)
BH3FR_F00192	92	■ 1.000	(2,329)	(2,329)	sters abhängt. (2, 329)
BH3FR_F00193	93	■ 1.000	(2,187)	(2,187)	menten der Hypermatrix des $\rightarrow$ Korrelators stammen. (2, 187)
BH3FR_F00194	93	■ 1.000	(2,232)	(2,232)	folgt. (2, 232)
BH3FR_F00195	94	■ 1.000	(2,231)	(2,231)	antiparallele $\rightarrow$ Raumpinfelder. (2, 231)
BH3FR_F00196	94	■ 1.000	(2,216)	(2,216)	zahl des $\rightarrow$ Raumpins (Fermionen). (2, 216)
BH3FR_F00197	94	■ 1.000	(2,188)	(2,188)	exponentiell steil abklingt. (2, 188)
BH3FR_F00198	94	■ 1.000	(2,348)	(2,348)	plexer Hermetrie wiedergibt. (2, 348)
BH3FR_F00199	94	■ 1.000	(2,209)	(2,209)	tensoriums wiedergibt. (2, 209)
BH3FR_F00200	94	■ 1.000	(2,80)	(2,80)	nischen Korrelators bilden. (2, 80)
BH3FR_F00201	95	■ 1.000	(2,75)	(2,75)	soriums. (2, 75)
BH3FR_F00202	96	■ 0.996	(2,215)	(2,215)	Quantenzahl des $\rightarrow$ Raumpins (Boson). (2, 215)
BH3FR_F00203	96	■ 1.000	(2,243)	(2,243)	trie als Partialspektren auswählt und separiert. (2, 243)
BH3FR_F00204	97	■ 1.000	(2,189)	(2,189)	$\rightarrow$ Raumzeitkondensationen kennzeichnet. (2, 189)
BH3FR_F00205	99	■ 1.000	(2,225)	(2,225)	$\rightarrow$ Kopplungsstruktur i. B. auf die Zeitdimension. (2, 225)
BH3FR_F00206	130	■ 0.511	$\emptyset, -1$	$0, -1$	$(2)(1110)0(0, -1),$
BH3FR_F00207	130	■ 0.844	$\emptyset(-1)$	$0(-1)$	$(3)(1111)0(-1),$
BH3FR_F00208	130	■ 0.997	$(1200) \ \emptyset(+1, \emptyset, -1)$	$(1200)0(+1, 0, -1)$	$(5)(1200)0(+1, 0, -1),$
BH3FR_F00209	130	■ 0.538	$(2111) - 2(\emptyset, -1)$	$(2111) - 2(0, -1)$	$(9)(2111) - 2(0, -1),$
BH3FR_F00210	130	■ 0.993	$(2310) - 2(+1, \emptyset, -1, -2)$	$(2310) - 2(+1, 0, -1, -2)$	$(11)(2310) - 2(+1, 0, -1, -2),$
BH3FR_F00211	130	■ 1.000	$(2330) \ \emptyset(+2, +1, \emptyset, -1)$	$(2330)0(+2, +1, 0, -1)$	$(12)(2330)0(+2, +1, 0, -1)$
BH3FR_F00212	130	■ 0.645	$(4)(1101)+1(+1, \emptyset)$	$(4)(1101) + 1(+1, 0)$	$(4)(1101) + 1(+1, 0),$
BH3FR_F00213	130	■ 0.823	$(6)(2010) - 1(\emptyset)$	$(6)(2010) - 1(0)$	$(6)(2010) - 1(0),$