

**ESAME DI MATEMATICA DISCRETA**  
**01/09/2022**

III APPELLO SESSIONE ESTIVA

ISTRUZIONI,  
leggere attentamente.

- (1) Tempo massimo: **2 ore**.
- (2) Voto massimo: **30/30**.
- (3) È possibile ritirarsi dall'esame, ma non prima di un'ora dall'inizio.
- (4) Dove richiesto è necessario spiegare le risposte. Risposte corrette senza spiegazioni o con spiegazioni errate o incoerenti saranno valutate 0.
- (5) Si è ammessi all'orale con un punteggio di almeno 15/30.
- (6) Non è permessa nessuna forma di comunicazione con l'esterno o con gli altri partecipanti all'esame.
- (7) **Buon lavoro!**

**Esercizio 1** (6 punti). Sia  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -12 \leq x \leq 12\}$ . Descrivere, elencandone gli elementi, i seguenti insiemi:

$$(2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}) \cap A \quad (2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}) \cap A \quad (2\mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}) \cap A \quad (3\mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}) \cap A$$

*Soluzione:* Si ha

$$(2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}) \cap A = \{-12, -10, -9, -8, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$$

$$(2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}) \cap A = \{-12, -6, 0, 6, 12\}$$

$$(2\mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}) \cap A = \{-10, -8, -4, -2, 2, 4, 8, 10\}$$

$$(3\mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}) \cap A = \{-9, -3, 3, 9\}$$

**Esercizio 2** (8 punti). Usando uno tra i due metodi visti a lezione, si descrivano gli interi  $a$  tali che simultaneamente si abbia  $\text{rest}(a, 19) = 16$ ,  $\text{rest}(a, 20) = 17$ , e se ne determini l'unico compreso tra 1000 e 1500.

*Soluzione:* Le condizioni sono equivalenti al sistema

$$\begin{cases} a \equiv 16 \pmod{19} \\ a \equiv 17 \pmod{20} \end{cases}$$

Quindi, le soluzioni della prima equazione sono  $a = 16 + 19k$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ . Sostituendo nella seconda otteniamo  $16 + 19k \equiv 17 \pmod{20}$ , che si riduce a  $19k \equiv 1 \pmod{20}$ , la cui soluzione è  $k \equiv 19 \pmod{20}$ . Sostituendo al posto  $k$  otteniamo  $a = 16 + 19 \cdot 19 = 377$ .

L'insieme di tutte le soluzioni è quindi  $S = [377]_{380}$ . L'unica soluzione compresa tra 1000 e 1500 è 1137 ottenuta come  $377 + 2 \cdot 380$ .

**Esercizio 3** (8 punti). Si consideri, nell'insieme  $5\mathbb{N}$ , l'operazione  $\perp$  definita ponendo per ogni  $n, m \in 5\mathbb{N}$ ,

$$n \perp m = \frac{nm}{5}$$

Si verifichi che tale operazione non rende  $(5\mathbb{N}, \perp)$  un gruppo abeliano. Di che struttura algebrica si tratta?

*Soluzione:*

- $\perp$  è commutativa:

$$n \perp m = \frac{nm}{5} = \frac{mn}{5} = m \perp n;$$

- $\perp$  è associativa:

$$(n \perp m) \perp \ell = \frac{nm}{5} \perp \ell = \frac{nm \ell}{5 \cdot 5} = \frac{m n \ell}{25} = \frac{m}{5} \frac{n \ell}{5} = \frac{m}{5} (n \perp \ell) = m \perp (n \perp \ell);$$

- $\perp$  ha elemento neutro:

$$5 \perp n = \frac{5n}{5} = n \quad \text{e} \quad n \perp 5 = \frac{n5}{5} = n;$$

- Nessun elemento è simmetrizzabile:

$$n \perp m = 5 \Leftrightarrow \frac{nm}{5} = 5 \Leftrightarrow nm = 1,$$

poichè  $n, m \in 5\mathbb{N}$ , l'equazione  $nm = 1$  non è mai verificata.

Di conseguenza,  $(5\mathbb{N}, \perp)$  è un monoide abeliano.

**Esercizio 4** (8 punti). Dimostrare per induzione su  $n$  che il determinante di una matrice triangolare superiore  $n \times n$  è uguale al prodotto dei suoi elementi diagonali.

*Soluzione:* La base di induzione è facilmente verificata. Infatti, se  $A = (a)$ , allora il suo determinante coincide con  $a$ . Se  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ , allora  $\det(A) = ad - b \cdot 0 = ad$ .

Supponiamo quindi la tesi vera per  $n > 2$  e dimostriamolo per  $n + 1$ . Sia  $A$  la matrice triangolare superiore data da

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Usando la regola di Lapalce sull'ultima riga, si ha che

$$\det(A) = (-1)^{2n} a_{nn} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2,n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Per ipotesi di induzione,

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,n-1} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2,n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \cdot \dots \cdot a_{n-1,n-1},$$

da cui segue la tesi.