

Coding_w06-02

หัวข้อ: Arithmetic Operators

1. จงหาค่าของตัวแปร i, j, k ตามคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ (คำนวณมือ)

w06-02-01

บรรทัดที่	นิพจน์	i	j	k
1	int i = 1, j = 2, k;	1	2	
2	k = i + j;	1	2	3
3	i = i + (k * j);	7	2	3
4	j = i / 2;	7	3	3
5	k = i % 2;	7	3	1
6	i = (j + k) * 3;	12	3	1

w06-02-02

บรรทัดที่	นิพจน์	x	y	z
1	double x=1.0, y=2.0;	1.0	2.0	
2	x = y + 5.0;	7.0	2.0	
3	y = x / 2.0;	7.0	3.5	
4	y = (x * 3.0) + 4.0;	7.0	25.0	
5	x = -0.5 - y;	-25.5	25.0	
6	z = x + y	-25.5	25.0	-0.5

Coding_w06-03

หัวข้อ: Relational & Logical Operators

โจทย์: กำหนดให้ $x = 12$, $y = 7$, $z = 12$;

ลำดับ	เงื่อนไขเปรียบเทียบ (Expression)	ผลลัพธ์ + วิธีคิด
1	$x > y$	$12 > 7$ true
2	$x < z$	$12 < 12$ false
3	$x == z$	$12 == 12$ true
4	$x != y$	$12 != 7$ true
5	$!(2*5 >= y) \parallel (5 != (5/3))$	$2*5 >= 7$ คือ, ! คือ \rightarrow ไม่คือ $5 != 5/3$ คือ false \parallel true \rightarrow true
6	$!(x < y)$	$(12 < 7)$ ไม่เป็นคือ !false \rightarrow true
7	$(x + y) > (z * 2)$	$(12 + 7) > (12 * 2) \rightarrow 19 > 24$ false
8	$(x \% 2 == 0) \parallel (y \% 2 == 1)$	$(12 \% 2 == 0) \parallel (7 \% 2 == 1)$ true \parallel true \rightarrow true
9	$(x > y) \&\& (z < y)$	$(12 > 7) \&\& (12 < 7)$ true $\&\&$ false \rightarrow false

Coding_w06-05

หัวข้อ: ลำดับการประเมินผลของนิพจน์ (Order of Evaluation in C Expressions)

1. จงคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ พร้อมวิธีคิด/คำอธิบายประกอบ ของนิพจน์ต่อไปนี้ (คำนวณมือ)

นิพจน์	ผลลัพธ์ + วิธีคิด
$A = -2 + 5 * 2;$	$A = -2 + (5 \times 2); = -2 + 10 = 8$ ✗
$B = 10 / 2 * 3;$	$B = (10 \div 2) \times 3; = 5 \times 3 = 15$ ✗
$C = 6 / 2 + 3 * (4 \% 2);$	$C = 6 \div 2 + 3 \times (4 \% 2) = (6 \div 2) + 3 \times (0) = 3 + 3 \times 0 = 3$ ✗
$D = (5 + 2) * 15 \% 4;$	$D = (5 + 2) \times 15 \% 4 = (7 \times 15) \% 4 = 105 \% 4 = 1$ ✗
$E = 6 + 2 * 2 - 6 / 2$	$E = 6 + (2 \times 2) - (6 / 2) = 6 + 4 - 3 = 7$ ✗
$F = 5 + 3 * 2 - 8 / 4 + (6 \% 5);$	$F = 5 + 3 \times 2 - 8 / 4 + (6 \% 5) = 5 + (3 \times 2) - (8 / 4) + 1 = 5 + 6 - 2 + 1 = 10$ ✗
$G = (4 + 3) * 2 - 10 / (2 + 3);$	$G = (4 + 3) \times 2 - 10 / (2 + 3) = 7 \times 2 - 10 / 5 = 14 - 10 \div 5 = 14 - 2 = 12$ ✗

Coding_w06-06

หัวข้อ: การใช้ตัวดำเนินการหลายชนิดร่วมกัน + วิเคราะห์ผล (Advanced Practice with Discussion)

โจทย์: กำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรดังนี้: $a = 5$, $b = 2$, $x = 3.0$, $y = 4.5$

1. จงหาผลลัพธ์ พร้อมแสดงวิธีคิด ของนิพจน์ ดังนี้ (คำนวณมือ):

นิพจน์	ผลลัพธ์ + วิธีคิด
<code>int r1 = a++ * b + (int)y % 3;</code>	$5 \times 2 + (4 \% 3) = 10 + 1 = 11$ (a เป็น 6)
<code>int r2 = (a > b) && ((int)x / b < 2);</code>	$(6 > 2) \ \&\& \ (3/2 < 2)$ true && true \rightarrow true
<code>float r3 = ++x * y - a / 2;</code>	$4.0 \times 4.5 - 6/2 = 18 - 3 = 15.0$ (x เป็น 4)
<code>float r4 = ((x += 1.5) > y) (b-- > 0);</code>	$((4 += 1.5) > 4.5) \ \ (2 > 0) \rightarrow (5.5 > 4.5) \ \ (2 > 0)$ true true \rightarrow true