

高等线性代数 Homework 05

Due: Oct. 12, 2024

姓名: 雍崔扬

学号: 21307140051

Problem 1

给定正整数 n

试证明: 若 \mathbb{F} 是一个域, 则 \mathbb{F}^n 不能表示为它的两个真子空间的并.

当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, \mathbb{F}^n 不能表示为其有限个真子空间的并.

Proof:

(反证法) 假设存在 \mathbb{F}^n 的两个真子空间 S_1, S_2 使得 $\mathbb{F}^n = S_1 \cup S_2$.

由于 S_1, S_2 是真子空间, 故存在 s_1, s_2 满足 $\begin{cases} s_1 \in S_1, s_1 \notin S_2 \\ s_2 \notin S_1, s_2 \in S_2 \end{cases}$

根据线性空间对向量加法的封闭性, 有 $s_1 + s_2 \in \mathbb{F}^n$, 则 $s_1 + s_2$ 势必属于 S_1, S_2 中的一个.

- 若 $s_1 + s_2 \in S_1$
则 $s_2 = (s_1 + s_2) + (-s_1) \in S_1$ (注意到 S_1 是子空间, 故 $(-s_1) \in S_1$), 与假设矛盾;
- 若 $s_1 + s_2 \in S_2$
则 $s_1 = (s_1 + s_2) + (-s_2) \in S_2$ (注意到 S_2 是子空间, 故 $(-s_2) \in S_2$), 与假设矛盾;

因此 \mathbb{F}^n 不能表示为它的两个真子空间的并.

当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, 我们使用数学归纳法证明 \mathbb{F}^n 不能表示为其有限个真子空间的并.

对真子空间数量 m 进行数学归纳:

① 当 $m = 1, 2$ 时, 命题显然成立.

② 现假设命题对正整数 m 成立

则对于 \mathbb{F}^n 的任意给定的 m 个真子空间 S_1, \dots, S_m 都有 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \subset \mathbb{F}^n$ 成立.

根据归纳假设可知 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 不是 \mathbb{F}^n 的真子空间, 仅仅是真子集.

下面证明在归纳假设下, 命题对正整数 $m + 1$ 也成立.

(反证法) 假设存在 \mathbb{F}^n 的一个真子空间 S_{m+1} 使得 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \cup S_{m+1} = \mathbb{F}^n$

由于 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \subset \mathbb{F}^n$ 和 $S_{m+1} \subset \mathbb{F}^n$, 故存在 s_1, s_2 满足 $\begin{cases} s_1 \in S_{m+1}, s_1 \notin (\bigcup_{i=1}^m S_i) \\ s_2 \notin S_{m+1}, s_2 \in (\bigcup_{i=1}^m S_i) \end{cases}$

根据线性空间对向量加法的封闭性, 对于任意 k 都有 $ks_1 + s_2 \in \mathbb{F}^n$ 成立

因此对于任意给定的标量 $\alpha \in \mathbb{F}$, $\alpha s_1 + s_2$ 势必属于 S_{m+1} 和 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 中的一个.

若 $\alpha s_1 + s_2 \in S_{m+1}$

则 $s_2 = (\alpha s_1 + s_2) + \alpha(-s_1) \in S_{m+1}$ (注意到 S_{m+1} 是子空间, 故 $\alpha(-s_1) \in S_{m+1}$), 与假设矛盾;

因此我们有 $\alpha s_1 + s_2 \in (\bigcup_{i=1}^m S_i)$ ($\forall \alpha \in \mathbb{F}$) 成立.

设 $0_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}}$ 分别是域 \mathbb{F} 的加法单位元和数乘单位元.

考虑 $\alpha = k1_{\mathbb{F}}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 的情况:

显然我们有无限个形如 $(k1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2$ ($\forall k \in \mathbb{Z}$) 的向量在 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ (它是有限个真子空间 S_1, \dots, S_m 的并集)

根据**抽屉原理**可知, 对于真子空间 S_1 ,

至少存在两个不同的整数 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ (不妨设 $k_2 > k_1$) 使得 $\begin{cases} (k_1 1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2 \in S_1 \\ (k_2 1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2 \in S_1 \end{cases}$

故我们有 $[(k_2 - k_1)1_{\mathbb{F}}] \cdot s_1 \in S_1$

注意到域 \mathbb{F} 的特征 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, 故 $(k_2 - k_1)1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$, 从而有 $s_1 \in S_1$

这与 $s_1 \notin (\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 的假设相矛盾.

因此在归纳假设下, 命题对正整数 $m+1$ 也成立.

根据数学归纳法可知, 命题对任意正整数 $m \in \mathbb{Z}_+$ 都成立,

即当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, \mathbb{F}^n 不能表示为其有限个真子空间的并.

Problem 2

(Cauchy 函数方程)

设 $f: \mathbb{Q} \mapsto \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{Q}$)

试证明 f 是线性映射.

- 注: 对于连续函数 $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ (由有理点完全决定), 我们也有线性可加性

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y \in \mathbb{R})$$

可以证明 f 不可能为线性映射, 它只对有理数乘有线性性:

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \quad (\alpha \in \mathbb{Q}) \quad (\checkmark)$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \quad (\times)$$

Proof:

根据 $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$ 可知 $f(0) = 0$

根据 $f(x) + f(-x) = f(x+(-x)) = f(0) = 0$ 可知对于任意 $x \in \mathbb{Q}$ 都有 $f(-x) = -f(x)$ 成立.

对于任意整数 $k \in \mathbb{Z}$ 和有理数 $x \in \mathbb{Q}$, 我们有:

$$f(kx) = \begin{cases} f(\underbrace{x+\cdots+x}_k) = kf(x) & \text{if } k > 0 \\ f(0) = 0 = 0f(x) & \text{if } k = 0 \\ f(\underbrace{(-x)+\cdots+(-x)}_{-k}) = (-k)f(-x) = kf(x) & \text{if } k < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(kx) = kf(x) \text{ for all } k \in \mathbb{Z} \text{ and } x \in \mathbb{Q}$$

对于任意 $\alpha, x \in \mathbb{Q}$ (记 $\alpha = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 而 $q \neq 0$) 我们都有:

$$\begin{aligned} f(\alpha x) &= f\left(\frac{p}{q}x\right) \\ &= f\left(p\frac{x}{q}\right) \\ &= p \cdot f\left(\frac{x}{q}\right) \\ &= \frac{p}{q} \cdot qf\left(\frac{x}{q}\right) \\ &= \frac{p}{q} f\left(q\frac{x}{q}\right) \\ &= \frac{p}{q} f(x) \\ &= \alpha f(x) \end{aligned}$$

再结合 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ($\forall x, y \in \mathbb{Q}$) 便可知 f 是一个线性映射.

有点小错误的解法:

(其错误原因是 p, q 有可能是负整数, 这让我们的论述有点逻辑不严谨)

对于任意 $\alpha, x \in \mathbb{Q}$ (记 $\alpha = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 而 $q \neq 0$) 我们都有:

$$\begin{aligned} f(\alpha x) &= f\left(\frac{p}{q}x\right) \\ &= f\left(p\frac{x}{q}\right) \\ &= f\left(\underbrace{\frac{x}{q} + \cdots + \frac{x}{q}}_p\right) \quad (\text{use } f(x+y) = f(x) + f(y) \ (\forall x, y \in \mathbb{Q})) \\ &= p \cdot f\left(\frac{x}{q}\right) \\ &= \frac{p}{q} \cdot qf\left(\frac{x}{q}\right) \quad (\text{use } f(x+y) = f(x) + f(y) \ (\forall x, y \in \mathbb{Q})) \\ &= \frac{p}{q} \cdot f\left(\underbrace{\frac{x}{q} + \cdots + \frac{x}{q}}_q\right) \\ &= \frac{p}{q} f(x) \\ &= \alpha f(x) \end{aligned}$$

再结合 $f(x+y) = f(x) + f(y) \ (\forall x, y \in \mathbb{Q})$ 便可知 f 是一个线性映射.

Problem 3

设 V 是 \mathbb{R} 上不超过 5 次的多项式全体构成的向量空间, D 是 V 上的求导算子.

试选取 V 的一组基, 在这组基下写出 D 的表示矩阵, 并求出其所有特征值.

利用上述结论求解常微分方程 $y'' - 2y' + y = x^5$ 的通解.

Solution:

$B_{\text{polynomial}} = [1, x, x^2, x^3, x^4, x^5]^T$ 是 V 的一组基.

根据 $\begin{cases} D(1) = 0 \\ D(x) = 1 \\ D(x^2) = 2x \\ D(x^3) = 3x^2 \\ D(x^4) = 4x^3 \\ D(x^5) = 5x^4 \end{cases}$ 可知求导算子 D 在基 $[1, x, x^2, x^3, x^4, x^5]$ 下的表示矩阵为

$$[D]_{B_{\text{polynomial}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & 0 & 2 & & & \\ & & 0 & 3 & & \\ & & & 0 & 4 & \\ & & & & 0 & 5 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

显然其所有特征值均为 0

设 $y = a^T B_{\text{polynomial}}$ (其中 $a \in \mathbb{R}^6$)

则求解常微分方程 $y'' - 2y' + y = x^5$ 的问题就等价于求解以下线性方程组:

$$([D]_{B_{\text{polynomial}}})^2 a - 2[D]_{B_{\text{polynomial}}} a + a = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & & & \\ & 1 & -4 & 6 & & \\ & & 1 & -6 & 12 & \\ & & & 1 & -8 & 20 \\ & & & & 1 & -10 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解得:

$$\begin{cases} a_5 = 1 \\ a_4 = 10a_5 = 10 \\ a_3 = 8a_4 - 20a_5 = 8 \times 10 - 20 \times 1 = 60 \\ a_2 = 6a_3 - 12a_4 = 6 \times 60 - 12 \times 10 = 240 \\ a_1 = 4a_2 - 6a_3 = 4 \times 240 - 6 \times 60 = 600 \\ a_0 = 2a_1 - 2a_2 = 2 \times 600 - 2 \times 240 = 720 \end{cases}$$

因此我们有:

$$\begin{aligned} y(x) &= a^T B_{\text{polynomial}} \\ &= a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \\ &= x^5 + 10x^4 + 60x^3 + 240x^2 + 600x + 720 \end{aligned}$$

于是通解形式为:

$$y(x) = x^5 + 10x^4 + 60x^3 + 240x^2 + 600x + 720 + C \text{ (where } C \text{ is a constant)}$$

Problem 4

设 \mathbb{F} 是 \mathbb{C} 的子域, n_1, n_2, n_3, n_4 是正整数, $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}, B \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_3}, C \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_4}$
试证明 Frobenius 不等式:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$$

当且仅当存在矩阵 $X \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_3}$ 使得 $B = XAB + BCY$ 时取等.

- **Lemma 1: (秩-零度定理)**

对于线性空间 V, W 上任意一个线性映射 $T: V \mapsto W$, 我们都有

$$\text{rank}(T) + \text{null}(T) = \dim(V)$$

其中 $\text{null}(T) := \dim(\text{Ker}(T))$ 为线性映射 T 的零度.

- **Lemma 2:**

对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}, B \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_3}$ 都有

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B) - \dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Range}(B)) \text{ 成立.}$$

Proof of lemma 2:

考虑定义为 $T(x) := Ax$ ($\forall x \in \text{Range}(B)$) 的映射 $T: \text{Range}(B) \mapsto \text{Range}(AB)$

对于任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 和 $y_1, y_2 \in \text{Range}(B)$ (设 $y_1 = Bx_1, y_2 = Bx_2$) 我们都有:

$$\begin{aligned} T(\alpha y_1 + \beta y_2) &= T(B(\alpha x_1 + \beta x_2)) \\ &= AB(\alpha x_1 + \beta x_2) \\ &= \alpha ABx_1 + \beta ABx_2 \\ &= \alpha T(Bx_1) + \beta T(Bx_2) \\ &= \alpha T(y_1) + \beta T(y_2) \end{aligned}$$

因此 T 是线性映射.

$$\text{显然我们有 } \begin{cases} \text{Ker}(T) = \text{Ker}(A) \cap \text{Range}(B) \\ \text{Range}(T) = \text{Range}(AB) \cap \text{Range}(A) = \text{Range}(AB) \end{cases}$$

故根据秩-零度定理我们有:

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &= \dim(\text{Range}(T)) \quad (\text{utilize rank-nullity theorem}) \\ &= \dim(\text{Range}(B)) - \dim(\text{Ker}(T)) \\ &= \text{rank}(B) - \dim(\text{Ker}(A) \cap \text{Range}(B)) \end{aligned}$$

引理得证.

Proof:

根据 $\text{Range}(BC) \subseteq \text{Range}(B)$ 我们有:

$$\begin{aligned} \text{Range}(BC) \cap \text{Ker}(A) &\subseteq \text{Range}(B) \cap \text{Ker}(A) \\ \dim(\text{Range}(BC) \cap \text{Ker}(A)) &\leq \dim(\text{Range}(B) \cap \text{Ker}(A)) \end{aligned}$$

根据 **Lemma 2** 可知:

$$\begin{aligned} \text{rank}(ABC) &= \text{rank}(BC) - \dim(\text{Range}(BC) \cap \text{Ker}(A)) \quad (\text{utilize lemma 2}) \\ &\geq \text{rank}(BC) - \dim(\text{Range}(B) \cap \text{Ker}(A)) \\ &= \text{rank}(BC) - [\text{rank}(B) - \text{rank}(AB)] \quad (\text{utilize lemma 2}) \end{aligned}$$

即有 $\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$ 成立.

显然上述不等式当且仅当 $\text{Range}(BC) = \text{Range}(B)$ 时取等, 但这样似乎证不出取等条件.

另一种证明:

• **Lemma 3: (Schur 补不等式)**

对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}, B \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_2}, C \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_4}$ 我们都有:

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & \\ B & C \end{bmatrix}\right) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$$

当且仅当存在 $X \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_2}$ 使得 $XA + CY = B$ 时取等.

(存疑, 有更简单的证明吗?)

Proof:

设非奇异阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_1}, P_2 \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_2}, P_3 \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_3}, P_4 \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_4}$ 使得:

$$\begin{aligned} P_1 A P_2 &= \begin{bmatrix} I_{r_A} & 0_{r_A \times (n_2 - r_A)} \\ 0_{(n_1 - r_A) \times r_A} & 0_{(n_1 - r_A) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \\ P_3 C P_4 &= \begin{bmatrix} I_{r_C} & 0_{r_C \times (n_4 - r_C)} \\ 0_{(n_3 - r_C) \times r_C} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_4 - r_C)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中 $r_A = \text{rank}(A), r_C = \text{rank}(C)$

我们将 $P_3 B P_2$ 划分为:

$$P_3 B P_2 = \begin{bmatrix} \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} \\ \tilde{B}_{21} & \tilde{B}_{22} \end{bmatrix} \text{ where } \begin{cases} \tilde{B}_{11} \in \mathbb{F}^{r_A \times r_C} \\ \tilde{B}_{12} \in \mathbb{F}^{r_A \times (n_2 - r_C)} \\ \tilde{B}_{21} \in \mathbb{F}^{(n_3 - r_A) \times r_C} \\ \tilde{B}_{22} \in \mathbb{F}^{(n_3 - r_A) \times (n_2 - r_C)} \end{cases}$$

则我们有:

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} P_1 & \\ & P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_2 & \\ & P_4 \end{bmatrix} &\geq \begin{bmatrix} P_1 A P_2 & \\ P_3 B P_2 & P_3 C P_4 \end{bmatrix} \\
&= \left[\begin{array}{cc|cc} I_{r_A} & 0_{r_A \times (n_2 - r_A)} & & \\ 0_{(n_1 - r_A) \times r_A} & 0_{(n_1 - r_A) \times (n_2 - r_A)} & & \\ \hline \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} & I_{r_C} & 0_{r_C \times (n_4 - r_C)} \\ \tilde{B}_{21} & \tilde{B}_{22} & 0_{(n_3 - r_C) \times r_C} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_4 - r_C)} \end{array} \right] \\
&= P^{(1)} \begin{bmatrix} I_{r_A} & & & \\ & I_{r_C} & & \\ & & \tilde{B}_{22} & \\ & & & 0_{(n_1 - r_C) \times (n_4 - r_A)} \end{bmatrix} P^{(2)}
\end{aligned}$$

其中 $P^{(1)} \in \mathbb{F}^{(n_1+n_3) \times (n_1+n_3)}$ 和 $P^{(2)} \in \mathbb{F}^{(n_2+n_4) \times (n_2+n_4)}$

因此我们有:

$$\begin{aligned}
\text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & \\ B & C \end{bmatrix} \right) &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} I_{r_A} & & & \\ & I_{r_C} & & \\ & & \tilde{B}_{22} & \\ & & & 0_{(n_1 - r_C) \times (n_4 - r_A)} \end{bmatrix} \right) \\
&= \text{rank}(I_{r_A}) + \text{rank}(I_{r_C}) + \text{rank}(\tilde{B}_{22}) \\
&= \text{rank}(A) + \text{rank}(C) + \text{rank}(\tilde{B}_{22}) \\
&\geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)
\end{aligned}$$

其取等条件为:

$$\begin{aligned}
&\text{rank}(\tilde{B}_{22}) = 0 \\
&\Leftrightarrow \\
&\tilde{B}_{22} = 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \\
&\Leftrightarrow \\
P_3 B P_2 = \tilde{B} &= \begin{bmatrix} \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} \\ \tilde{B}_{21} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0_{r_C \times r_A} & 0_{r_C \times (n_2 - r_A)} \\ \tilde{B}_{21} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{r_A} & 0_{r_A \times (n_2 - r_A)} \\ 0_{(n_1 - r_A) \times r_A} & 0_{(n_1 - r_A) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \\
&\quad + \begin{bmatrix} I_{r_C} & 0_{r_C \times (n_4 - r_C)} \\ 0_{(n_3 - r_C) \times r_C} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_4 - r_C)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} \\ 0_{(n_3 - r_C) \times r_A} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0_{r_C \times r_A} & 0_{r_C \times (n_2 - r_A)} \\ \tilde{B}_{21} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} P_1 A P_2 + P_3 C P_4 \begin{bmatrix} \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} \\ 0_{(n_3 - r_C) \times r_A} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} \\
&\Leftrightarrow \\
B = XA + CY \text{ where } &\begin{cases} X = P_3^{-1} \begin{bmatrix} 0_{r_C \times r_A} & 0_{r_C \times (n_2 - r_A)} \\ \tilde{B}_{21} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} P_1 \\ Y = P_4 \begin{bmatrix} \tilde{B}_{11} & \tilde{B}_{12} \\ 0_{(n_3 - r_C) \times r_A} & 0_{(n_3 - r_C) \times (n_2 - r_A)} \end{bmatrix} P_2^{-1} \end{cases}
\end{aligned}$$

因此取等条件为存在 $X \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_2}$ 使得 $XA + CY = B$
引理得证.

(Problem 4 题干)

设 \mathbb{F} 是 \mathbb{C} 的子域, n_1, n_2, n_3, n_4 是正整数, $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}, B \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_3}, C \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_4}$
试证明 Frobenius 不等式:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$$

当且仅当存在矩阵 $X \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_3}$ 使得 $B = XAB + BCY$ 时取等.

Proof:

首先注意到:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_{n_1} & -A \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABC & \\ & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n_4} & \\ & I_{n_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_{n_1} & -A \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABC & \\ BC & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{n_1 \times n_4} & -AB \\ BC & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} AB & 0_{n_1 \times n_4} \\ -B & BC \end{bmatrix} \end{aligned}$$

根据 Lemma 3 (Schur 补不等式) 可知:

$$\begin{aligned} \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B) &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} ABC & \\ & B \end{bmatrix} \right) \\ &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} AB & 0_{n_1 \times n_4} \\ -B & BC \end{bmatrix} \right) \quad (\text{utilize lemme 3}) \\ &\geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \end{aligned}$$

当且仅当存在矩阵 $X \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_3}$ 使得 $B = XAB + BCY$ 时取等.

Problem 5

已知 V_1, V_2 是有限维向量空间 V 上的子空间, 满足 $\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V)$
试证明存在 V 上的线性变换 T 使得 $\text{Range}(T) = V_1$ 且 $\text{Ker}(T) = V_2$

- **Lemma: (线性映射由其基的作用所唯一确定)**

考虑定义在域 \mathbb{F} 上的线性空间 V, W

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 而 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 是线性空间 W 中的任意向量组.

则存在唯一的线性映射 $T: V \rightarrow W$ 使得 $T(v_i) = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

Proof:

我们定义映射 $T: V \rightarrow W$ 为:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \mapsto \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n \quad (\text{for all } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F})$$

这个映射是定义良好的, 因为任意 $v \in V$ 都可以表示为 v_1, \dots, v_n 的线性组合.

而且显然它满足 $Tv_i = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

下面我们证明它是线性映射.

对于任意 $x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \in V$ 和 $y = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n \in V$ 我们都有:

$$\begin{aligned} T(x+y) &= T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) \\ &= T((\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)v_n) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1)w_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)w_n \\ &= (\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n) + (\beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n) \\ &= T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) \\ &= T(x) + T(y) \end{aligned}$$

对于任意 $x = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in V$ 和 $\gamma \in \mathbb{F}$ 我们都有:

$$\begin{aligned} T(\gamma x) &= T(\gamma(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)) \\ &= T(\gamma \alpha_1 v_1 + \cdots + \gamma \alpha_n v_n) \\ &= \gamma \alpha_1 w_1 + \cdots + \gamma \alpha_n w_n \\ &= \gamma(\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n) \\ &= \gamma T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= \gamma T(x) \end{aligned}$$

因此映射 $T: V \mapsto W$ 是一个线性映射.

为证明线性映射 $T: V \mapsto W$ 是唯一的, 假设 \tilde{T} 是一个满足 $\tilde{T}v_i = w_i$ ($i = 1, \dots, n$) 的线性映射.

由于任意 $v \in V$ 都可以唯一表示为 $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$, 故我们有:

$$\begin{aligned} \tilde{T}(v) &= \tilde{T}(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= \alpha_1 \tilde{T}(v_1) + \cdots + \alpha_n \tilde{T}(v_n) \quad (\text{note that } \tilde{T} \text{ is a linear map}) \\ &= \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n \\ &= T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= T(v) \end{aligned}$$

因此 $\tilde{T} \equiv T$, 表明线性映射 $T: V \mapsto W$ 是唯一的.
引理得证.

Proof:

记 $\begin{cases} n := \dim(V) \\ r := \dim(V_1) \end{cases}$ 并记 0_V 为向量空间 V 的加法单位元.

① 若 $r = 0$, 则 $\begin{cases} V_1 = \{0_V\} \\ V_2 = V \end{cases}$, 从而 V 上的零变换 Z_V 满足 $\begin{cases} \text{Range}(Z_V) = \{0_V\} = V_1 \\ \text{Ker}(Z_V) = V = V_2 \end{cases}$

② 若 $r = n$, 则 $\begin{cases} V_1 = V \\ V_2 = \{0_V\} \end{cases}$, 从而 V 上的恒等变换 I_V 满足 $\begin{cases} \text{Range}(I_V) = V = V_1 \\ \text{Ker}(I_V) = \{0_V\} = V_2 \end{cases}$

③ 若 $n \geq 2$ 且 $1 \leq r \leq n-1$, 则可设 V_2 的一组基为 $\{e_1, \dots, e_{n-r}\}$ 而 V_1 的一组基为 $\{f_1, \dots, f_r\}$

由**基扩张定理**可知, 存在 $e_{n-r+1}, \dots, e_n \in V$ 使得 $\{e_1, \dots, e_{n-r}, e_{n-r+1}, \dots, e_n\}$ 构成 V 的一组基.

将 f_1, \dots, f_r 扩充为 V 的一个 n 元向量组 $\underbrace{\{0_V, \dots, 0_V\}}_{n-r}, f_1, \dots, f_r\}$

根据 **Lemma (线性映射由其对基的作用所唯一确定)** (此引理在考试中可以直接使用) 可知, 存在唯一的线性映射 $T: V \mapsto V_1$ 使得:

$$T(e_i) := \begin{cases} 0_V & i = 1, \dots, n-r \\ f_{i-r} & i = n-r+1, \dots, n \end{cases}$$

换言之, 它将 V_2 映射到 $\{0_V\}$, 而把 V_2^\perp 映射到 V_1

因此有:

$$\begin{aligned}
\text{Range}(T) &= T(\text{span}\{e_1, \dots, e_{n-r}, e_{n-r+1}, \dots, e_n\}) \\
&= \text{span}\{T(e_1), \dots, T(e_{n-r}), T(e_{n-r+1}), \dots, T(e_n)\} \\
&= \text{span}\{\underbrace{0_V, \dots, 0_V}_{n-r}, f_1, \dots, f_r\} \\
&= \text{span}\{f_1, \dots, f_r\} \\
&= V_1 \\
\hline
\text{Ker}(T) &= T^{-1}(\{0_V\}) \\
&= T^{-1}(\text{span}\{T(e_1), \dots, T(e_{n-r})\}) \\
&= \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-r}\} \\
&= V_2
\end{aligned}$$

命题得证.

Problem 6 (optional)

已知 n 为正整数, $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足 $AB = BA$

试证明:

$$\text{rank}(A + B) + \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

当且仅当存在 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $Y \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $X(A + B) + (AB)Y = B$ 时取等.

Proof:

注意到 A, B 均为 n 阶方阵, 因此我们有 $\text{Range}(A + B) \subseteq \text{Range}(A) + \text{Range}(B)$

于是我们有:

$$\begin{aligned}
\text{rank}(A + B) &= \dim(\text{Range}(A + B)) \\
&\leq \dim(\text{Range}(A) + \text{Range}(B)) \\
&= \dim(\text{Range}(A)) + \dim(\text{Range}(B)) - \dim(\text{Range}(A) \cap \text{Range}(B)) \quad (6-1) \\
&= \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - \dim(\text{Range}(A) \cap \text{Range}(B))
\end{aligned}$$

$$\text{注意到 } \begin{cases} \text{Range}(AB) \subseteq \text{Range}(A) \\ \text{Range}(BA) \subseteq \text{Range}(B) \end{cases}$$

根据 $AB = BA$ 可知:

$$\begin{aligned}
\text{Range}(AB) &= \text{Range}(AB) \cap \text{Range}(AB) \quad (\text{use } AB = BA) \\
&= \text{Range}(AB) \cap \text{Range}(BA) \\
&\subseteq \text{Range}(A) \cap \text{Range}(B)
\end{aligned}$$

因此有 $\text{rank}(AB) = \dim(\text{Range}(AB)) \leq \dim(\text{Range}(A) \cap \text{Range}(B))$

代入 (6-1) 式即有:

$$\begin{aligned}
\text{rank}(A + B) &= \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - \dim(\text{Range}(A) \cap \text{Range}(B)) \\
&\leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - \text{rank}(AB)
\end{aligned}$$

命题得证.

• Lemma: (Schur 补不等式)

对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}, B \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_2}, C \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_4}$ 我们都有:

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & \\ B & C \end{bmatrix}\right) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$$

当且仅当存在 $X \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_2}$ 使得 $XA + CY = B$ 时取等.

(证明参见 Problem 4)

现在给出证明:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -B \\ I_n & A \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & B \\ & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -B \\ I_n & A \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} A+B & -AB+AB \\ B & BA \end{bmatrix} \quad (\text{note that } AB=BA) \\
 &= \begin{bmatrix} A+B & \\ B & AB \end{bmatrix} \\
 \hline
 \text{rank}(A) + \text{rank}(B) &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix} \right) \\
 &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} A+B & \\ B & AB \end{bmatrix} \right) \\
 &\geq \text{rank}(A+B) + \text{rank}(AB)
 \end{aligned}$$

当且仅当存在 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $Y \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 使得 $X(A+B) + (AB)Y = B$ 时取等.

Problem 7 (optional)

已知 n, m, k 为正整数, V 是 \mathbb{R} 上的 n 维向量空间.

现有 V 中 m 组向量, 每组中均含有 k 个线性无关的向量.

试证明在 V 中必存在 $n-k$ 个向量, 使得它们与上面任意一组向量合在一起都能构成 V 的一组基.

- 这是符合直觉的, 任意给定 k 个线性无关的向量, 再随机生成 $n-k$ 个向量构成一个 n 阶方阵通常来说这个 n 阶方阵是有 (很大) 可能是非奇异的.
- 考虑题干中的 m 组向量, 每组中均含有 k 个线性无关的向量. 即使它们分别张成不同真子空间, 它们的并集也无法覆盖全空间 V 因此 \mathbb{R} 是特征为 0 的域, V 作为 \mathbb{R} 上的向量空间不能表示为有限个真子空间的并, 这是 Problem 1 的结论.

Proof:

设这 m 组向量张成的 k 维子空间为 S_1, \dots, S_m .

由于 V 作为 \mathbb{R} 上的向量空间不能表示为有限个真子空间的并, 故我们有:

$$V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m S_i \right) \neq \emptyset$$

因此存在 $x_1 \in V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m S_i \right)$

它使得 $S_1 \oplus \text{span}\{x_1\}, \dots, S_m \oplus \text{span}\{x_1\}$ 成为 $k+1$ 维子空间.

依此类推可知存在 $n-k$ 个线性无关的向量 $x_1, \dots, x_{n-k} \in V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m S_i \right)$ 使得:

$$S_1 \oplus \text{span}\{x_1, \dots, x_{n-k}\} = V$$

$$\vdots$$

$$S_m \oplus \text{span}\{x_1, \dots, x_{n-k}\} = V$$

即它们与给定的 m 组向量中的任意一组合在一起都能构成 V 的一组基.

命题得证.

Problem 8 (optional)

设正整数 $n > 1$, 试证明不存在 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\text{tr}(A) = y^T A x$ 对一切 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 恒成立.

Proof:

记 E_{ij} 为 (i, j) 位置上为 1, 其余位置为 0 的 n 阶实方阵.

(反证法) 假设存在 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\text{tr}(A) = y^T A x$ 对一切 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 恒成立, 则我们有:

$$y_i x_j = y^T E_{ij} x = \text{tr}(E_{ij}) = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

显然上述结论是自相矛盾的:

根据 $y_i x_i = 1$ ($\forall i = 1, \dots, n$) 可知 $x_i, y_i \neq 0$ ($\forall i = 1, \dots, n$)

这与 $y_i x_j = 0$ ($\forall i, j = 1, \dots, n$ such that $i \neq j$) 相矛盾.

因此不存在 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\text{tr}(A) = y^T A x$ 对一切 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 恒成立.

命题得证.

- **一点观察:**

显然 E_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的一组基.

由任意给定的 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 定义的 $\mathbb{R}^{n \times n} \mapsto \mathbb{R}$ 的线性映射 $A \mapsto y^T A x$ (如果存在的话)

必然由它对基 E_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) 的作用唯一确定.

我们便是通过它对基 E_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) 的作用导出的矛盾.

The End