（4）缓慢去除变性条件才可能复性

①若由于加热使 DNA 发生变性，缓慢冷却后可能复性（退火）；若迅速冷却至 4℃以下不能复性（该方法可用于保存 DNA 单链）

②GC 高、溶液离子强度高、均一→易复性

③复性过程中若在溶液加入其它核酸单链，只要两种核酸单链之间存在一定程度的碱基配对关系，都可能形成 ttsx 杂化双链




图 3-27　DNA 解链过程的示意图




图 3-28　DNA 解链过程中的增色效应和对应的解链曲线

只要两条链之间有一定的碱基配对关系,就可能发生配对




图 3-29　核酸分子复性和杂交的示意图

来自不同样品的双链 DNA1 和双链 DNA2 解离后，如果它们的序列具有互补性，当温度缓慢降低时，单链的 DNA1 可以和单链的 DNA2 形成互补的杂化双链。

四、RNA

（一）翻译的直接模板——mRNA（编码 RNA）

只有mRNA是编码RNA,
编码RNA只有一个




图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

1.mRNA 种类最多、代谢最活跃、寿命最短、含量最少、最不稳定

mRNA指导蛋白质合成(蛋白质种类多)