C语言-信号

2.信号肽参与的靶向输送：胞质小 RNA（scRNA）与蛋白质组成信号识别颗粒，信号识别颗粒识别结合信号肽，引导含信号肽的蛋白质进入内质网继续合成

SRP






图 16-14　分泌蛋白质的加工与靶向输送

## 六、翻译的干扰




（1）针对原核和真核的：一瓢汰渍把人（真核）衣服上的细菌（原核）洗掉

| | |
|---|---|
| 伊短菌素 | 抑制翻译起始复合物 伊-起始 |
| 嘌呤霉素 | 抑制成肽（与酪氨酰 tRNA 结构相似、取代它进位） |

糖基化：AA化学修饰、白喉毒素、霍乱（GTP酶失活）

（2）只针对真核的：放毒（只搞真核）

| | | |
|---|---|---|
| 毒素 | 白喉毒素 | 使 eEF2 糖基化失活 白岩松吃糖 |
| | 蓖麻毒蛋白 | 降解 28S rRNA（转肽酶）使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态（转肽酶） |
| 放线菌酮 | | 结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大 |

大亚基

（3）作用于大亚基的：

| | |
|---|---|
| 蓖麻毒蛋白 | 降解 28S rRNA 使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态 |
| 放线菌酮 | 结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大 |
| 氯霉素、林可霉素、红霉素 原核 | 结合原核 50S 亚基而抑制成肽 颜色 |

真核

不能合用，因为会相互竞争结合位点

（4）作用于小亚基的（小医大四）：

| | | |
|---|---|---|
| 伊短菌素 | | 抑制翻译起始复合物 |
| 结合原核 30S 亚基 | 氨基糖苷类（卡那/巴龙/新/链霉素等） | 读码错误 玛卡巴卡小心脸 |
| | 四环素 | 抑制进位 使劲 |
| | 大观霉素 | 抑制转位 大赚 |

（5）作用于蛋白因子的：

| | |
|---|---|
| 伊短菌素 | 抑制翻译起始复合物 |
| 白喉毒素 | 抑制 eEF2 延长因子 白岩松吃糖 |
| 黄色霉素、粉霉素 | 抑制 EF-Tu 黄粪土 |
| 夫西地酸、微球菌素 | 抑制 EF-G 抚慰金 |
| 干扰素 interferon ttsx | ①抑制 eIF2（诱导 eIF2 磷酸化失活）<br>②降解病毒 mRNA（间接激活核酸内切酶） |