B.P 位
C.E 位
D.核糖体结合位点

11. 2020N144 X 蛋白质常发生磷酸化的氨基酸残基有老鼠屎
A.苏氨酸
B.酪氨酸
C.丝氨酸
D.苯丙氨酸

12. 2021N24 A 由 RNA 发挥催化作用的酶是=核酶
A.氨基酰-tRNA 合成酶
B.二硫键异构酶
C.肽酰转移酶
D.脱甲酰基酶

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5'端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组Ⅰ型、组Ⅱ型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

2022N25 A 蛋白质生物合成时的肽酰转移酶的化学本质是
A.脂肪酸
B.RNA
C.DNA
D.多糖


没有密码子的氨基酸不是原料,包括了①不存在于蛋白质的(鸟瓜同行惊呆虎");②存在于蛋白质中,没有密码子("甲乙羟糖硫磷酸化")
如:苏氨酸有密码子,磷酸化后就没有密码子了

14. 2022N144 X 可以作为蛋白质生物合成原料掺入多肽链中的氨基酸有
A.羟脯氨酸　编码氨基酸(20+1),有密码子的氨基酸
B.半胱氨酸 胱氨酸、同型半胱氨酸不选
C.硒代半胱氨酸 特定情况下UGA就是它的密码子
D.甲硫氨酸

同型半胱氨酸和羟脯氨酸区别:
前者没有密码子且不存在于蛋白质;后者也没有密码子,但存在于蛋白质(羟脯氨酸是蛋白质合成后加工修饰而来的)

15. 2025N24 A 多肽链合成时延长因子 EF-G 所起的作用是
A.分子伴侣
B.转录因子
C.辅酶
D.转位

细胞壁 ⊗ β-内酰胺类抗生素(青霉素类、头孢菌素类)
细胞膜 ⊗ 多黏菌素



复方新诺明:磺胺+甲氧苄啶

16. 2025N120-121 B
A.半胱氨酸残基
B.丝氨酸残基
C.亮氨酸残基
D.甲硫氨酸残基
被磷酸化修饰的常见氨基酸残基是
能够形成二硫键的氨基酸残基是

翻译后加工修饰常发生磷酸化的有哪些?
酪、苏、丝
常发生磷酸化的氨基酸?
"老鼠屎拌蒜尖"

答案:11-16 ABC C B BCD D BA