

7. 2016N39 A 在乳糖操纵子中分解物基因激活蛋白结合的结构是
CAP结合位点
A.启动序列
B.操纵序列
C.编码序列
D.CAP 结合序列

8. 2016N157 X 以下核酸中，具有降解 mRNA 功能的有
pi、si、mi参与RNA干扰(RNAi,转录后基因沉默)
A.hnRNA
B.siRNA
C.miRNA
D.snoRNA

9. 2017N24 A 真核生物与原核生物转录的相同点
A.都以操纵子模式进行调控 原核生物转录起始调控
B.RNA 聚合酶相同 原核:RNApol($\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$) vs 真核:RNApol Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
C.转录都具有不对称性
D.产物都需要在胞核加工 真核才需要加工

10. 2017N146 X 与 TATA 盒结合的蛋白质有


A.RNA 聚合酶II
B.TFII D
C.拓扑异构酶 参与复制全过程
D.组蛋白 (解开超螺旋,松解DNA链,避免打结)

11. 2018N24 A RNA 生物合成时，转录因子 TFII D 结合的部位是
A.TATA 盒
B.GC 盒
C.ATG (DNA编码链)→mRNA起始密码子(AUG)
D.poly A


12. 2018N26 A 在生物个体中几乎所有细胞都表达的基因是
A.管家基因 时空特异性差
B.阻遏基因
C.突变基因
D.可诱导基因

改原核/真核
13. 2018N145 X 参与基因转录调控的主要结构有 改成原核生物不选C 改成真核生物不选B
A.启动子
B.衰减子
C.增强子
D.密码子