真题解析·COPD

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N141-142 B

A.FEV_1/FVC 减低

B.TLC 减低

C.RV/TLC 升高

D.FEV_1 占预计值百分比减低

慢性阻塞性肺疾病的典型肺容量和通气功能的特征性变化是

特发性肺纤维化的典型肺容量和通气功能的特征性变化是

阻塞 牙膏孔小 FEV1↓ FVC↓或正常 FEV1↓/FVC 限制 牙膏小 FVC↓ FEV1↓或正常

阻塞性 FEV1↓ FEV1/FVC↓ MMFR↓ PEF↓ FVC↓或正常 RV↑ FRC↑ TLC↑或正常 RV/TLC↑

限制性 FEV1↓或正常 FEV1/FVC正常或↑ MMFR↓或正常 FVC↓ RV、FRC、TLC↓ RV/TLC正常或↑

间质性肺疾病

胶原纤维：特发性肺纤维化时较多，主要是“硬”；瘢痕旁肺气肿时较少，主要是“收缩”

越吸越容易 越呼越困难


	阻塞性通气障碍/气流受限性疾病	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
呼吸困难	**呼**气性呼吸困难	**吸**气性呼吸困难
常见疾病	**COPD**、**支气管哮喘**、支扩、细支气管炎	**间质性肺病**如特发性肺间质纤维化、**胸膜病变**如胸腔积液/气胸、**ARDS**
特点	气流**流速下降**为主 （牙膏孔小了、找字母 f） **FEV_1**、**FEV_1/FVC**、最大呼气中期流速 **MMFR**、呼吸流量峰值 **PEF**↓	肺**容积下降**为主 （牙膏小了、找字母 vc） **RV 和 FRC、TLC、FVC**↓
FEV_1/FVC	FVC减小程度较FEV1小↓ （FEV_1↓、FVC↓或正常） FEV1↓/FVC↓或正常	FEV1下降程度小于FVC下降程度 正常或↑不能下降 ↓或正常 （FEV_1↓或正常、FVC↓） FEV1/FVC↓正常或↑
RV/TLC	**明显↑（＞40%为肺气肿）** （RV 和 FRC↑、TLC↑或正常）	正常或略↑


RV↑ → TLC↑ ↑(关键) ↑或正常

复习《生理学》限制性通气障碍：

FEV_1/FVC 基本不变

TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓





2. 2016N96-98 A 男性，75 岁。反复咳嗽，咳痰，喘息 30 年，活动后气短 2 年，加重 1 周。既往高血压病史 25 年，吸烟史 30 年，平均 1 包/日，已戒烟 2 年。查体：R 22 次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干啰音，双下肺可闻及少许湿啰音。有辅助检查先看辅助检查 不要想着排除，比较选项找可能可能最可能

96.该患者最可能的诊断是

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管扩张症 大量浓痰(痰盂)、常咯血、小时候麻疹、百日咳

C.慢性心力衰竭 典型特征：夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸

D.支气管哮喘 发作性呼吸困难、常接触过敏原、夜间凌晨发作

97.对诊断价值最大的检查是

A.血气分析 肺性脑病 自发性气胸-X线

B.肺功能

C.超声心动图

答案：1-2 AB ABC