7.2022N43 A 肺功能检查确定持续性阻塞性通气功能障碍的标准是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.无需气道内给药，在静息状态下测得的 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量>35%

8.2022N154 X 肺功能检查可以表现为阻塞性通气功能障碍的疾病有
A.慢性阻塞性肺疾病
B.闭塞性细支气管炎
C.弥漫性泛细支气管炎
D.支气管扩张症

9.2023N73-75 A 男性，61 岁。反复咳嗽、咳痰 10 余年，活动后气短 1 年，1 周前受凉后出现气短加重，咳黄痰，伴发热，体温最高 39 度，夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体：T 38.2 度，P 96 次/分，R 23 次/分，BP 150/80mmHg，神志清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 pH 7.31，$PaCO_2$ 78mmHg，PaO_2 52mmHg。

急性加重

73.该患者出现 $PaCO_2$ 升高的原因不包括

>50 <60 II型呼衰

A.肺泡通气量下降
B.无效腔通气增加 V/Q↑(大大,无效腔↑)
C.内源性 PEEP ↓(短小,肺内分流↑)
D.弥散功能障碍只会导致缺氧

74.引起该患者病情加重最不可能的病原体是
A.流感嗜血杆菌
B.肺炎链球菌
C.肺炎支原体 煎饼之一 为间质性肺炎 但COPD为实质性病变
D.铜绿假单胞菌

支扩常见的病原体不包括支原体(实质)

AECOPD级 III级

75.该患者经治疗后出现嗜睡，意识模糊。复查动脉血气分析（吸氧 2L/min）：pH 7.24，$PaCO_2$ 85mmHg，PaO_2 62mmHg，首选的治疗措施是
A.气管插管有创机械通气
B.无创机械通气
C.经鼻高流量氧疗
D.上调吸氧流量至 5L/min

10.2025N44 A 慢性阻塞性肺疾病患者，可确定存在不完全可逆气流受限的肺功能检查结果是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.静息状态下测得 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量>35%

专题串联 • 呼吸系统疾病重要体征（上）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案：7-10 B ABCD DCA B