二、特发性肺动脉高压

找不到原因

1.检查

①首选超声心动图：肺动脉收缩压＞50mmHg

②金标准右心导管：平均肺动脉压≥25mmHg 有创,临床上用的少

血管压力影响因素:①血流量②循环系统容积

2.血管扩张剂（乞丐用一地钱买了西瓜糖）

二氢吡啶类对血管扩张更明显→血压↓→反射性加快心率

①钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（急性血管反应试验阳性）：心动过缓用硝苯地平，心动过速用地尔硫卓

二氢吡啶类（加快心率） 非二氢吡啶类（减慢心率） eg.维拉帕米

前列环素PGI2(前体是花生四烯酸)可舒张血管、抗血小板、抗重构


②前列环素：不仅扩血管降低肺动脉压、长期用还可逆转肺血管重构


③磷酸二酯酶 PDE 抑制剂（如西地那非伟哥）：血管平滑肌 cAMP↑→血管平滑肌 Ca^{2+}↓→平滑肌舒张

④一氧化氮 NO

⑤可溶性鸟苷酸环化酶 sGC 激动剂（如利奥西呱）

⑥内皮素受体拮抗剂（如波生坦）





真题解析·肺动脉高压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N64 A 慢性肺源性心脏病心力衰竭最重要的治疗是

治肺不治心

A.利尿药

B.血管扩张药

C.控制感染、改善呼吸功能

D.正性肌力药

2.2017N154 X 以下选项中，属于慢性肺源性心脏病急性加重期的治疗原则有

治肺不治心

A.积极利尿

B.积极控制感染 急性加重最常见的就是感染

C.积极应用正性肌力药

D.积极处理并发症

3.2020N43 A 慢性阻塞性肺疾病患者发生肺动脉高压最重要的机制是

A.肺微小动脉广泛血栓形成

B.红细胞增多，血液黏稠度增加 缺氧→HIF(缺氧诱导因子)↑→EPO↑→红细胞↑→血液比较黏稠

C.肺小静脉管壁增厚

D.缺氧致肺小动脉收缩，肺血管重构

无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束等等

4.2016N59 A 女性，32 岁。患有特发性肺动脉高压，可能出现的体征是

A.心尖博动呈抬举样 抬举样搏动→心脏增大[心尖部:左心室 心前区/剑突下:右心室

B.心尖搏动向左侧移位

C.心尖部可闻及收缩期杂音 心尖部-二尖瓣听诊区

D.心底部第 2 心音逆分裂 通常分裂

心前区/剑突下抬举样搏动[右心室肥大 腹主动脉大了(如腹主动脉瘤)

⇓

鉴别:吸气→回心血↑,若是右心室肥大则抬举样搏动↑

右心室大→心尖向左移位,负性心尖搏动

左心室大→心尖向左下移位

右心室大→三尖瓣收缩期杂音

左心室大→二尖瓣收缩期杂音

答案:1-4 C BD D B