内科学含诊断学 呼吸系统疾病


核心精讲·急性肺血栓栓塞症

（性感认识：溶不溶栓看危险分层）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.栓塞和栓子：循环血液中不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔称为栓塞，阻塞血管腔的异常物质称为栓子（如血栓、ttsx 脂肪、羊水、气体）



2.肺血栓栓塞症是最常见的肺栓塞：

①来自静脉系统或右心的血栓栓子阻塞肺动脉或其分支

②血栓栓子主要来源于下肢深静脉血栓形成





图 2-11-1　PTE 的形成机制

外周深静脉血栓形成后脱落，随静脉血流移行至肺动脉内，形成肺动脉内血栓栓塞。

下肢深静脉血栓形成可以和肺血栓栓塞症看成一种疾病

当下肢深静脉长血栓→脱落后就可以堵住肺动脉

同一种病在不同部位不同阶段的表现



血栓形成机制

1、内皮细胞损伤(最常见):内皮下胶原暴露

2、血流缓慢、涡流形成。因此静脉比动脉,下肢比上肢更易形成血栓

3、血液凝固性增加(恶性肿瘤等)

3.静脉血栓栓塞症的危险因素

内皮损伤⭐　缓慢、涡流　凝固性增加

表 2-11-1　静脉血栓栓塞症常见危险因素

遗传性危险因素	获得性危险因素		
	血液高凝状态	血管内皮损伤	静脉血流淤滞
抗凝血酶缺乏	高龄	手术(多见于全髋关节或膝关节置换)	瘫痪
蛋白 S 缺乏	恶性肿瘤 释放促凝物质		长途航空或乘车旅行
蛋白 C 缺乏	抗磷脂综合征 易形成血栓	创伤/骨折	急性内科疾病住院 长期卧床、制动
V 因子 Leiden 突变	口服避孕药	中心静脉置管	居家养老护理
凝血酶原 20210A 基因变异	妊娠/产褥期 雌激素使血液处于一种高凝状态	吸烟 直接损害内皮细胞	
纤溶酶原缺乏	静脉血栓个人史	高同型半胱氨酸血症 与高血压、血栓栓塞、心衰息息相关	
异常纤维蛋白原血症	静脉血栓家族史	肿瘤静脉化疗	
凝血酶调节蛋白异常	炎症性肠病		
纤溶酶原激活物抑制因子过量	肥胖		
Ⅷ因子水平升高	肾病综合征 大量蛋白尿低蛋白血症水肿高脂血症		
Ⅸ因子水平升高	真性红细胞增多症		
Ⅺ因子水平升高	巨球蛋白血症		
非“O”血型	植入人工假体		

重点关注：高龄、肥胖、吸烟、避孕药、高同型半胱氨酸血症、肿瘤、创伤（手术/骨折等）、制动、炎症性肠病、肾病综合征、抗磷脂综合征