真题解析·急性肺血栓栓塞症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2017N73-75 A 女性，45 岁，术后卧床 3 天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA 诊断为肺栓塞。查体：R 24 次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清，$P_2>A_2$，左下肢肿胀。

不对称肿胀

73.该患者最可能的血气分析结果是

A.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 降低　动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快

B.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 升高

C.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 降低

D.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 升高

①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

74.以下选项中，对决定患者是否采取溶栓治疗意义最大的是

A.血压与右心功能情况

B.低氧血症程度

C.呼吸困难程度

D.发病时间长短

溶栓看危险程度
低危→抗凝,不溶栓
中危→抗凝,考虑溶栓
高危→先溶栓再抗凝

75.该患者抗凝治疗的疗程是

A.3-6 个月 危险因素短期可以消除　动次撒

B.大于 6 个月，小于 12 个月

C.12-24 个月

D.终生接受抗凝治疗 肿瘤

2. 2018N70-72 A 男性，21 岁，2 小时前在举起杠铃时突发左胸痛，随即出现进行性呼吸困难、出汗、心悸，急送校医院。查体：脉搏微弱，频率 120 次/分，呼吸浅而快，频率 24-30 次/分，BP 90/60mmHg，神清，烦躁不安，高枕右侧位，口唇轻绀，颈静脉怒张。

看主诉　运动时胸腔负压变正

70.患者应考虑的主要疾病是

A.急性胸膜炎

B.肺气肿

C.肺栓塞 无深静脉血栓形成的主诉

D.气胸 有运动的主诉

气胸破坏了胸腔负压→又吸气又吸血↓→颈静脉怒张

颈静脉怒张说明颈静脉回流障碍
eg.右心衰、心包积液、缩窄性心包炎、气胸、肺气肿、肺癌(浸润上腔静脉)

71.以下最能支持患者主要疾病的体征是

A.左肺叩诊浊音，呼吸音减弱

B.双肺叩诊过清音 COPD、哮喘

C.左肺呼吸音消失

D.气管左偏 气胸纵隔偏向健侧

突发呼吸困难
胸痛
颈静脉怒张
- 下肢深V血栓形成 ← 危险因素 / 不对称下肢肿痛 → 肺栓塞
- 运动或COPD/肺结核等
强调顺序:先突发胸痛继之呼吸困难,可出现鼓音 → 气胸

72.为明确诊断，应首选的辅助检查是

A.胸部 X 线片

B.胸部 B 超

C.胸部 CT

D.肺动脉造影

以题带动
知识点复习

答案1-2 AAA DCA