3. 2019N44 A 男性，50 岁，呼吸困难、胸痛 3 天。查体：P 96 次/分，BP 125/75mmHg，双肺呼吸音清，心率 96 次/分，心律整。右下肢肿胀。超声心动图示右室功能障碍，cTnT 0.2ng/ml。CT 肺动脉造影示“右下、左上多发肺动脉内充盈缺损”。该患者首选的治疗药物为

A.重组组织型纤溶酶原激活剂 溶栓
B.低分子肝素 抗凝
C.阿司匹林 抗板
D.氯吡格雷 抗板

说到肺栓塞治疗,就要想到低危中危高危
该患者血压正常,但右室功能障碍→中危

4.2023N128-129 B

A.慢性阻塞性肺疾病
B.特发性肺纤维化
C.急性肺血栓栓塞症
D.重症肺炎

上述疾病中，急性肺源性心脏病最常见的病因是
上述疾病中，慢性肺源性心脏病最常见的病因是

长期卧床→可能形成深静脉血栓

5. 2024N73-75 A 女性，68 岁。股骨颈骨折术后第 7 天，突发呼吸困难 1 小时。查体：P 90 次/分，R 24 次/分，BP 120/80mmHg，神清，右肺呼吸音低，偶闻及湿啰音。临床疑诊为肺血栓栓塞症。血生化检查 Cr 366μmol/L。肾功不全→选MRPA或V/Q显像

73.目前情况下，对确诊最适合的辅助检查是 有辅助检查先看辅助检查

A.胸部 X 线片
B.超声心动图
C.放射性核素肺通气/血流灌注显像
D.CTPA

74.该患者行心电图检查，可能出现的改变是

A.电轴左偏 右偏
B.$S_IQ_{III}T_{III}$
C.完全左束支传导阻滞 右束支传导阻滞
D.逆钟向转位 顺钟向转位

右心出现改变

75.目前首选的治疗是

A.即刻给予 rt-PA 100mg，持续 2 小时静脉滴注
B.低分子量肝素抗凝治疗
C.华法林抗凝治疗
D.抗血小板治疗

肝素抗凝更快-多用于肺栓塞
华法林抗凝-更多用于房颤
肺栓塞可将华法林与肝素重叠使用5天以上,换成华法林

思维导图 • 急性肺血栓栓塞症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心


微信搜一搜
天天师兄

答案:3-5 B CA CBB