

4.肺结节病 VS 肺结核 注意看到发热、体重减轻、盗汗最可能为肺结核,也可能为结节病,需要看辅助检查

	肺结节病	肺结核
相似 一般看到病变在肺的上叶第一反应:结核	①CD4 T 细胞相关 ②肉芽肿 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩 ③肺上叶多见，肺门淋巴结肿大，蜂窝肺 没有特异性 ④发热、体重减轻、盗汗、结节性红斑、关节炎 ⑤治疗时间至少 6 个月 （肺结核初治：强化期 2 个月、巩固期 4 个月）	发生坏死→局部肺组织液化→经支气管引流后充入空气→形成空洞
肉芽肿	非干酪性 没空洞 ——在影像上鉴别——有空洞 干酪性	
肺门淋巴结肿大	多为双侧	多为单侧
PPD 试验	多(-)	多(+)

表面活性物质清除障碍→堆积在肺泡内,有血无气→功能性动静脉短路（肺内分流）

四、其它间质性肺疾病

肺泡蛋白沉着症 间质性肺疾病:低氧血症最主要机制一般回答弥散障碍 肺泡蛋白沉着症是肺内分流	过敏性肺炎 （依靠检查与哮喘鉴别）	嗜酸性粒细胞性肺炎
牛奶撒了一地、吸引蝴蝶 ①影像学：磨玻璃影与正常组织截然分开呈地图样、铺路石样、蝴蝶样（肺门周围的肺泡渗出） VS 细菌性痢疾:不规则地图状浅溃疡 ②BALF：奶白色、稠厚、分层、PAS(+)	①影像学：磨玻璃斑片影的马赛克征（对马赛克过敏） ②BALF：CD8 T 细胞↑为主 （不再爱过）再障 ITP 吹空调最容易导致军团菌肺炎、过敏性肺炎 ③鸽子/农民/空调肺	①影像学：肺水肿反转形状（反酸） 一般肺水肿集中在肺门 ②BALF：嗜酸性粒细胞明显↑
全肺灌洗 衣服/肺丢到洗衣机里	根本措施：避免接触抗原 糖皮质激素	糖皮质激素
		

磨玻璃影密度高于正常肺组织,低于肺血管

铺路石头样 ┌ 肺泡蛋白沉着症的影像学特征
　　└ 结节病:通过支气管镜在支气管内看到黏膜上长满了结节

真题解析·间质性肺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N63 A 特发性肺纤维化的 HRCT 典型表现是
A.双肺斑片状磨玻璃影 过敏性肺炎
B.双下肺和胸膜下分布为主的网状改变
C.病灶与周围正常组织形成鲜明对照的“地图状”改变 肺泡蛋白沉着症
D.双肺结节状阴影

看主诉找关键词

2. 2015N96-98 A 女性，45 岁。干咳、活动后气短、乏力 2 个月。2 年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部 CT 提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门、纵隔淋巴结无肿大。
皮肤结节性红斑　病变进展IV期无肺门淋巴结肿大

答案:1-2 B BDD