随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·急性肺脓肿

（性感认识：空洞）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸入性肺脓肿（最常见）

1.**厌氧菌**等多见

右主支气管更粗短:吸入性肺脓肿好发于右肺


病理学继发性肺结核好发于右肺尖

2.好发于**右**肺：

①**仰卧位**：上叶**后**段或下叶**背**段（后背）

②坐位：下叶后基底段 重力原因

③右侧卧位：右上叶前段或后段



3.治疗 厌氧菌感染常合并需氧菌感染(消耗氧气有利于厌氧菌生存)

①**青霉素**。但**脆弱拟杆菌**用**甲硝唑+林可霉素类**（脆弱的甲壳虫）

②疗程 **6-8 周**：空洞周围炎症吸收，空洞缩小消失、最后残留少量纤维条索影（**停药**）

停药的指征看影像学

细菌6-8周后呈指数生长 神奇的"6-8"

天天师兄


可能可能最可能：早期可能空洞并未形成,不能排除肺脓肿

①昏迷（如醉酒/脑卒中/麻醉/癫痫/药物过量）、鼻窦炎、牙槽脓肿等**误吸病史**

②**高热**、咳大量**脓臭痰（之后体温可降低）**、可咯血 厌氧菌-臭　咳痰(自行引流)-体温降低

③**X 线**早期大片边缘不清的浓密模糊浸润影，之后出现伴**液气平的空洞**

炎性渗出



小凯笔记自行整理

醉酒后相关疾病:吸入性肺脓肿、胰腺炎、前列腺增生、霍奇金淋巴瘤、痛风

二、血源性肺脓肿


具有丰富的层粘连蛋白受体

可能可能最可能：**金葡菌**多见，皮肤外伤、疖、痈、骨髓炎、右心心内膜炎等病史，双肺外野**多发空洞**及液气囊腔

菌栓栓塞小血管

右心室→肺动脉　VS 吸入性肺脓肿单发

一个脓点　多个脓点



（1）检查：血培养

（2）治疗：**苯唑西林**或头孢呋辛

耐酶青霉素　一、二代头孢

金葡菌对青霉素往往耐药

血源性肺脓肿先全身问题,再到肺,所以痰量不多,咯血概率低

原发灶引起寒战高热

三、继发性肺脓肿

砖红色胶冻样痰

薄壁囊腔 液性空洞 干酪样坏死

①金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌等肺炎

同个疾病的不同阶段

②**支扩**、肺癌、肺结核等继发感染

本身不导致肺脓肿形成

③支气管异物阻塞（尤其 ttsx 小儿）

④邻近病变（如阿米巴肝脓肿累及右肺下叶）