二、继发性肺结核

一般内源性复发已形成特异性免疫力

1.概念：机体再次感染结核杆菌，好发成人 感染结核杆菌不等于得结核病

结核杆菌播散到全身各器官后可暂时休眠，机体抵抗力下降使休眠的原发病灶再度活化




图 2-8-5 浸润性肺结核 CT 改变

双上肺渗出影，沿支气管走行，可见空洞形成，内壁光滑。

2.**常伴空洞**：空洞与结核杆菌细胞壁的蜡质所引起的变态反应相关

（变态反应和免疫力常同时发生）

VS 原发性肺结核：初次感染，无特异性免疫力→很少空洞

3.继发性肺结核的类型

（1）局灶型肺结核（非活动性）

↓ 沿支气管播散

（2）**浸润型**肺结核（**最常见**的活动性继发性肺结核）： 渗出表现：范围小→大

①境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影（呈斑点、斑片、实变等）** 不均匀

②浸润型肺结核可形成**薄壁空洞**：经支气管播散→干酪性肺炎；空洞经久不愈→慢纤空

↳ 主要是以渗出为主，故边缘模糊不清

（3）**干酪性肺炎（病情危重）**

①严重的干酪性肺炎呈大叶性实变、可有急性高热 VS 一般结核：多为长期低中热，尤其是午后低热

②**虫蚀样空洞**（无壁空洞）（VS 肺炎链球菌肺炎绝无空洞） 不产生毒素，荚膜致病





图 2-8-6 干酪性肺炎 CT 改变

右上肺见大片状实变影，可见支气管充气相，局部见钙化灶。

（4）慢性纤维空洞型肺结核

病变部位主要好发上叶，胶原纤维一收缩，肺门就被提上去了


①**厚壁空洞**，肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形，**肺门抬高**、肺纹理呈**垂柳样**，**纵隔向患侧移位** 慢性→纤维化 胶原纤维收缩 eg.慢性肺脓肿（病程长）

②并发症：肺气肿、胸膜增厚粘连、气胸或脓气胸（破溃）、大咯血（破坏血管）、喉结核、肠结核、**慢性肺心病**（慢性纤维化肺循环阻力↑）

代偿性







（5）结核球/结核瘤 学姐钙化


①结节内有**钙化**，可分叶和形成空洞，**边界清楚**（纤维包绕），周围**卫星灶** 肺癌钙化相对少见，但肺癌癌组织也可以出现钙化；卫星灶在肺癌少见，结核多见


②结核球需与周围型肺癌鉴别、且药物不易发挥作用→多**手术**切除（纤维包裹的定时炸弹）



图 18-6 肺结核球







卫星灶



（6）结核性胸膜炎：湿性（结核性胸腔积液，多见），干性