2.复治涂阳肺结核（**先做药敏**）

（1）利福平敏感者：按照初治方案

（2）**RR-TB**（利福平耐药）和 **MDR-TB**（至少耐异烟肼和利福平）的**耐药治疗方案**

①**短程**治疗方案（**首选**）：**9-12 个月**（就要儿子）



②**长程**治疗方案：**≥4** 种抗结核药，**18-20 个月**（180 的 20 个儿子）

所有 A 组药（你来北大散心啊）+**≥1 种 B 组药**（法医秦明环视暗算）
当 A 组药只能选用 1-2 种时则选择所有 B 组药
当 A 组和 B 组药不能组成方案时可添加 C 组药

组别	药物（缩写）
A 组：首选药物	左氧氟沙星（Lfx）/莫西沙星（Mfx）
	贝达喹啉（Bdq）
	利奈唑胺（Lzd）
B 组：次选药物	氯法齐明（Cfz）
	环丝氨酸（Cs）
C 组：备选药物	乙胺丁醇（E）
	德拉马尼（Dlm）
	吡嗪酰胺（Z）
	亚胺培南-西司他丁（Ipm-Cln）
	美罗培南（Mpm）
	阿米卡星（Am）
	链霉素（S）
	卷曲霉素（Cm）
	丙硫异烟胺（Pto）
	对氨基水杨酸（PAS）

磺胺是抑菌药，但磺胺和甲氧苄啶复合剂（如复方新诺明）是杀菌剂

《生物化学》：对氨基水杨酸的机制同磺胺：对氨基水杨酸与对氨基苯甲酸结构相似→竞争性抑制二氢蝶酸合酶→四氢叶酸生成障碍→抑制细菌核苷酸代谢（四氢叶酸是一碳单位的载体、一碳单位参与核苷酸代谢）。因此抗结核药中的**抑菌剂**有**乙胺丁醇和对氨基水杨酸**（一对抑菌剂）

一碳单位：只有一个碳原子的有机基团，核苷酸代谢（合成核苷酸）的原料，不能游离存在

可以理解为没有一碳单位核苷酸就不能合成

没有四氢叶酸就没有一碳单位

专题串联·热型

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

热型	特点	常见疾病
稽留热	体温在高热水平（＞39 度），24 小时内波动范围**不超过 1 度**	**大叶性肺炎**、结核、**伤寒**、斑疹伤寒（鸡大姐上班）
弛张热	体温在高热水平，24 小时内波动范围超过 2 度	败血症、风湿热、重症结核、化脓性炎症（张飞拜师结盟）
间歇热	高热期与无热期各持续数小时后反复交替出现	急性肾盂肾炎、疟疾（生煎疟疾）
回归热	高热期与无热期各持续数天后反复交替出现	霍奇金淋巴瘤（挥霍）
波状热	体温逐渐上升、数天后逐渐下降、后又逐渐上升	布氏杆菌病（跑步波涛汹涌）
不规则热	无一定规律	结核等