



稽留热 

弛张热 


间歇热


回归热


波状热

真题解析·肺结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N141-142 B

A.肺炎 默认是大叶性肺炎

B.肺脓肿

C.肺结核

D.支气管扩张症 有误吸的可能

吸入性肺炎和吸入性肺脓肿是一种疾病的不同阶段
吸入性肺脓肿早期可以没有空洞。
大片的边缘不清的浓密模糊浸润影,之后在这个浓密模糊浸润里面再出现带液平的空洞

男性，45 岁。醉酒后出现发热、咳嗽，1 周后咳黏液脓性痰伴胸痛，胸部 CT 示下叶背段大片模糊阴影，密度不均匀，最可能的诊断是

男性，38 岁。受凉后出现发热、咳嗽、痰少 3 天，查体：口周疱疹，右下肺叩浊，可闻及支气管呼吸音，最可能的诊断是 主诉:青壮年受凉后

异常

异常支气管呼吸音:实变、空洞、胸腔积液的积液上方
肺里面听不到支气管呼吸音,最多在上叶听到支气管肺泡呼吸音

2. 2015N141-142 B

A.异烟肼

B.利福平

C.吡嗪酰胺

D.乙胺丁醇 阿姨

对结核分枝杆菌 A 菌群作用最强的是

对结核分枝杆菌 B 菌群作用最强的是 B-吡

3. 2015N170 X 结核菌素试验阴性可见于

A.结核性脑膜炎

B.儿童结核

C.癌症合并结核

D.营养不良合并结核

感染了TB {理论上来说PPD应该(+)
但阴性(假阴性)

4. 2016N170 X HIV/AIDS 并发肺结核的特点有

结核性胸腔积液的ADA>45
ADA(腺苷脱氨酶),主要在淋巴细胞里,合并艾滋后,晚期淋巴细胞消失殆尽,所以ADA不升高

A.容易出现空洞 免疫力下降不容易出现空洞

B.肺下叶病变多见 AIDS时免疫力↓,TB可以存活,顺血流、重力到达下叶

C.结核菌素试验常为阴性 变态反应与免疫反应通常同时发生

D.出现药物不良反应较多

合并艾滋的肺结核患者表现趋于原发性肺结核(初次感染结核杆菌,没有特异免疫力),肉芽肿少见
原发性肺结核:原发综合征(原发灶、淋巴管炎、肺门淋巴结的肿大)

答案:1-4BA AC ACD BCD