6. 2024N43 A 关于支气管哮喘疾病本质的叙述，正确的是

A.气道不可逆性功能下降

B.气道平滑肌 β_2 受体功能低下

C.肥大细胞 M 胆碱能受体功能亢进

D.慢性气道炎症性疾病

专题串联·支气管哮喘的鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

COPD	支气管哮喘
桶状胸、过清音、语音震颤减弱、呼吸音减弱、呼气音延长（**呼气性呼吸困难**） X 线可有双肺透亮度增加，**肺泡通气量↓（低氧血症最主要机制-易发展为II型呼衰）**、内源性 PEEP、V_A/Q 失调、**阻塞性通气障碍（$FEV_1/FVC<70\%$、RV↑）**	
吸烟史、中老年、**反复**咳痰喘	过敏史、青年多见、**发作性**干咳喘息
多为湿啰音、干湿啰音共存	多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺
持续气流受限 肺泡通气量↓ 肺大疱破坏肺泡壁CAP→Q↓	**可逆**气流受限 （**支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大**）
V_A/Q↓、V_A/Q↑、弥散障碍呼吸膜扩散面积↓	**V_A/Q↓**哮喘不累及肺泡CAP
支气管扩张剂必用 ①稳定期 分组 A组(挑一种),B组(LABA+LAMA) E组(LABA+LAMA或LABA+LAMA+ICS) ②急性加重期	支气管扩张剂 ①**迅速缓解症状：首选 SABA** ②长期控制炎症：LABA（不能单用）
糖皮质激素 COPD气道高反应性没有支哮这么明显,且主要问题是中性粒细胞 ①**稳定期：ICS（高风险+血嗜酸性粒细胞≥300）** ②急性加重期：需要住院治疗者	糖皮质激素必用 ①**迅速缓解症状：严重哮喘尽早静脉用激素** ②**长期控制炎症：首选 ICS 或 ICS+LABA**

不服呗

严重支气管哮喘	心源性哮喘
膈肌上移	
咳痰喘、多在夜间发作、**端坐呼吸**	左心衰→肺淤血肺水肿
呼气性呼吸困难	**混合性呼吸困难**影响到了呼吸面积
过敏史、青年多见 发作性干咳喘息	高血压/冠心病/风心病等、中老年多见 **咳粉红色泡沫样痰**
多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺	多为湿啰音、干湿啰音共存
心脏多正常	多有左心扩大、**奔马律**
X 线多无异常或双肺透亮度增加	X 线多有左心扩大、**肺淤血水肿** 肺门蝴蝶征
ttsx **禁用吗啡** 中枢性镇咳剂	**禁用肾上腺素**（肾上腺素收缩血管）增加后负荷
若难以鉴别：吸入 SABA 或静注短效茶碱	

吗啡→缓解氧耗、扩血管→可用于心源性哮喘

肾上腺素→激动β2-R→可用于支气管哮喘

茶碱抑制PDE→cAMP↑ ┌支气管平滑肌Ca^{2+}↓→支气管舒张 └心肌Ca^{2+}↑→心肌收缩能力↑(活化的横桥数目↑)

思维导图·支气管哮喘

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄