
（3）小潮气量 呼吸系统疾病最终都会导致呼吸肌疲劳→CO2潴留
①4-8ml/kg→控制吸气平台压≤30cmH_2O 防止肺泡过度扩张
②可允许一定程度的 CO_2 潴留和呼酸（允许性高碳酸血症/pH 7.25-7.3）
小潮气量不利于CO2的排出所以ARDS的治疗允许一定的高碳酸血症的存在



（4）俯卧位通气：ARDS 病变分布不均匀
①重力依赖区（仰卧位靠近背部的肺区）以肺水肿、肺不张为主
②非重力依赖区（仰卧位靠近前胸壁的肺区）肺泡功能基本正常

复习《生理学》：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用俯卧位改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

PEEP会导致回心血量↓,若大量利尿,血容量完全不够
3.保持肺相对干：限制液体入量（入量＜出量），可用利尿剂（适当）
VS 严重支气管哮喘急性发作大汗淋漓→补液 过量使用利尿剂:痰液黏稠、低钾低氯碱中毒、导致氧解离曲线左移、加重缺氧

真题解析·ARDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N63 A 以下选项中，诊断 ARDS 的必要条件是
A.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≤18mmHg
B.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≤18mmHg
C.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≥18mmHg
D.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≥18mmHg

PAWP:肺小动脉楔压
PCWP:肺毛细血管楔压

2. 2019N154 X 急性呼吸窘迫综合征机械通气的治疗原则有
A.保持尽量大的潮气量，维持 $PaCO_2$ 在正常范围内 小潮气量→允许性的高碳酸血症
B.给予一定量的 PEEP，使萎陷的肺泡开放
C.初始上机给予高水平的 PEEP，保证 PaO_2 尽快达到 60mmHg 以上 我爸是吧
D.吸气平台压控制在 30-35cmH_2O 以下，防止肺泡过度扩张

3. 2022N73-75 A 男，55 岁。急性胰腺炎三天后出现进行性加重的呼吸困难。既往体健。吸烟史 30 年。查体：T 37.5℃，P 110 次/分，R 32 次/分，BP 130/80mmHg。口唇发绀，双肺可闻及少许湿啰音。胸片检查示双肺多发斑片状影。严重的呼吸系统疾病
73.该患者最可能的诊断是
A.医院获得性肺炎
B.肺不张
C.急性呼吸窘迫综合征
D.心力衰竭
74.对该患者疾病诊断意义最大的检查是
A.痰培养
B.胸部 CT
C.动脉血气分析
D.心脏超声

答案:1-3 B BD CCA