专题串联·判断酸碱失衡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①**pH**：**＜7.35→酸**中毒**失代偿**、**＞7.45→碱**中毒**失代偿**

②**$PaCO_2$**：**＜35→呼碱、＞45→呼酸**

③**碱剩余 BE**：**＜-2.3→代酸、＞+2.3→代碱**

④HCO_3^-：＜22→代酸、＞27→代碱

⑤**K^+**：＜3.5→多合并代碱、＞5.5→多合并代酸

CO2结合力(CO2CP)
CO2+H2O ⇌ HCO3- + H+
代偿:向右→CO2CP↑,失代偿:向左→CO2CP↓

AB实际碳酸氢盐　SB标准碳酸氢盐

BE↑即正值↑,BE↓即负值↑

AB=SB [>27→代碱 <22→代酸
AB≠SB [AB>SB→呼酸 AB<SB→呼碱

真题解析·呼吸衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N96-98 A 男性，60 岁。反复咳喘 40 余年，活动后气短 10 余年，间断双下肢水肿 5 年，加重 1 天入院，吸烟史 40 年。查体：嗜睡、口唇发绀、颈静脉怒张，桶状胸，双肺可闻及干湿啰音，心率 110 次/分，心律整，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿。血气分析示：pH 7.26，PaO_2 45mmHg，$PaCO_2$ 75mmHg。

COPD并发慢性肺心病

96.以下治疗措施中，错误的是

A.积极控制感染

B.应用无创呼吸机改善通气 嗜睡是一种程度最轻的意识障碍,可以先用无创呼吸机

C.应用 5%碳酸氢钠纠正酸中毒 <7.2才补碱

D.应用支气管舒张剂 无论是急性加重期还是稳定期,都要使用支气管舒张剂

97.经治疗后病情有好转，神志清醒。数日后出现烦躁，有时抽搐，血气分析示：pH 7.49，PaO_2 66mmHg，$PaCO_2$ 55mmHg，BE +15mmol/L，上述情况最可能是

失代偿碱中毒　呼酸　代碱　Ca^{2+}减少,屏障作用减弱,阈电位靠近膜电位→低钙惊厥

A.失代偿性代谢性碱中毒

B.失代偿性呼吸性酸中毒

C.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

最标准答案:失代偿的呼酸合并代碱
AB没错,但D更好

98.经治疗后症状好转出院，出院后应采取的措施不包括

A.长期口服小剂量糖皮质激素 稳定期

B.长期使用长效支气管舒张剂


C.长期家庭氧疗

D.戒烟

思维导图·呼吸衰竭（含酸碱失衡判断小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄



答案:1 CDA