四、胸腔闭式引流



图 27-3　胸腔闭式引流术

1.位置

①气胸：前胸壁锁骨中线第 2 肋间

②胸水：腋中线与腋后线间第 6-7 肋间

8-10肋形成肋弓,肋间隙狭小且从8肋开始接近上腹部,穿刺易损伤上腹部脏器

2.插管：深呼气后屏气

3.拔管：深吸气后屏气（阿西吧）

①肺扩张好+无气液排出→拔

②肺不张或有气液排出→不拔 有气液排出说明残留液体还比较多,胸膜腔内压力高

③肺扩张好+残留少量气液：引流管通畅→不拔；引流管堵塞→拔

自行吸收




图 2-13-8　负压吸引水瓶装置

1、引流管插入水中太深,排气阻力↑,引流效率↓
2、引流管插入水中太浅,引流管容易离开水面




图 2-13-7　水封瓶胸腔闭式引流装置

真题解析·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

大量胸腔积液:第2前肋以上
中量积液:2-4前肋
少量积液:第4前肋以下

内科学

1. 2013N91-92 A 男性，48 岁。1 个月来气短，呼吸困难，1 周来发热、咳嗽，B 超发现“右侧大量胸腔积液”。近半年日渐消瘦。查体：T 37.5°C，R 21 次/分，轻度贫血貌，高枕右侧卧位。

91.该患者胸部叩诊不可能出现的体征是

A.右肺叩诊呈实音/浊音

B.右肺肝界下移右肺肝界/肺下界上移

C.右侧肺底移动度消失

D.心界叩诊向左侧移位纵隔推向健侧

少量胸腔积液时积液最高点在第4前肋以下,积液的上方不能叫上肺
大量胸腔积液时积液最高点在第2前肋以上,积液的上方能叫上肺
中等量胸腔积液看情况


92.该患者胸部听诊不可能出现的体征是


A.左上肺可闻及支气管肺泡呼吸音正常情况就能听到　改为:左上肺闻及支气管呼吸音→应该是右上肺

B.右下腋前线部可闻及胸膜摩擦音大量胸腔积液听不到胸膜摩擦音

C.右上肺可闻及支气管呼吸音 异常的支气管呼吸音

D.右中下肺语音共振消失





异常:不该听到此声音的地方听到声音
支气管呼吸音本应肺外听,在肺内听到就是异常支气管呼吸音(传导增强)
见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方

答案:1、BB