2. 2015N63 A 女性，45 岁。呼吸困难、胸痛 1 个月。胸部 B 超示右侧中等量胸腔积液。化验：血性胸水，比重 1.020，蛋白定量 35g/L，WBC 680×10⁶/L，ADA 25U/L，最可能的诊断是

血性胸水:结核、肿瘤、肺栓塞

>1.018 >30 >500 渗出液

<45→肿瘤可能性最大 肿瘤也可以是漏出液

A.结核性胸腔积液

B.癌性胸腔积液

C.肺栓塞所致胸腔积液

D.肺炎伴胸腔积液

排除不了慢性肺栓塞
慢性肺栓塞:反复呼吸困难、胸痛、胸水为渗出液、血性胸水
但没有深静脉血栓形成的病史和表现,没有肺心病的表现,如肺动脉高压、右心衰的表现

①ADA>45→考虑结核,ADA<45→不优先考虑结核但不能排除结核
eg.合并艾滋病的结核患者淋巴细胞↓↓↓,此时ADA<45
②ADA<45→考虑肿瘤,ADA>45→不优先考虑肿瘤,但不能排除肿瘤
eg.胸膜的淋巴瘤(无痛的淋巴肿大)→胸腔积液→ADA>45(会非常高)
但做题时刻谨记可能可能最可能

3. 2017N44 A 男性，46 岁，发热伴咳嗽咳痰 3 天，右侧胸痛 2 天，既往“关节炎”病史。查体：T 38.7℃，右下肺呼吸音减低，可闻及少许湿性啰音，胸片示右侧胸腔积液，胸水示：白细胞 15000×10⁶/L，单核 10%，pH 6.9，LDH 986U/L，ADA 90U/L。该患者胸腔积液最可能是

>10x10⁹ 淋巴细胞 <7 >500 >45

A.结核性胸膜炎

B.肺癌

C.类风湿关节炎

D.脓胸 若题目的pH为7.1不能排除脓胸

结核、肿瘤的胸水以单个核细胞(淋巴细胞)为主
急性脓胸以多个核细胞(中性粒细胞)为主

4. 2020N154 X 胸水中葡萄糖含量可降低的疾病有

渗出液

A.脓胸

B.类风湿关节炎

C.恶性胸腔积液

D.系统性红斑狼疮

说恶性胸腔积液就是渗出液的意思

肺癌→胸腔积液 ┌蛋白>30,细胞>500x10⁶ →渗出液→恶性胸腔积液
└蛋白<30,细胞<500x10⁶ →漏出液→不是恶性胸腔积液

5. 2021N73-75 A 女性，56 岁。劳累后发热一周，体温最高 39.5℃，伴多汗、纳差，体重下降 2kg，同时出现右侧季肋部疼痛，疼痛较剧烈，夜间无法安睡，在外院输注哌拉西林/他唑巴坦三天无效入院。既往史：类风湿关节炎 20 年，平素每日服用来氟米特及强的松治疗，病情稳定。入院时胸片示右侧胸腔积液。胸腔穿刺化验结果：胸水比重 1.038，白细胞 16800×10⁶/L，单核细胞 20%，多核细胞 80%，ADA 116U/L，LDH 3367U/L。

高热

>1.018 >10x10⁹ 多核80% >45 >500

急性脓胸不引流只用抗生素效果不好

73.该患者最可能的诊断是

A.结核性胸腔积液

B.恶性胸腔积液

C.脓胸

D.类风湿相关胸腔积液 胸水是黄绿色、ADA>45(类风湿:淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞)、G↓↓↓↓↓

CD4T(主)

74.为明确诊断，首选的检查是

A.胸水细菌培养+药敏试验

B.胸水结核菌培养

C.胸水类风湿因子检查

D.胸水找肿瘤细胞

ADA>45 ┌结核
脓胸 ┐最优先考虑
淋巴瘤(ADA↑↑↑↑)
└类风湿

G↓↓↓↓↓ ┌类风湿
└胸腔感染,如脓胸

75.最重要的治疗是

A.胸腔积液引流

B.全身化疗

C.使用 4 联抗结核药物治疗

D.增加强的松剂量或加用免疫抑制剂治疗

以题带动 知识点复习

答案:2-5 B D ABCD CAA