9. 2023N154 X 男性，76 岁。慢性咳嗽、咳痰 30 余年，活动后气短 5 年，加重伴发热 3 天入院。入院后经抗感染对症治疗后症状减轻，今晨突感左胸疼痛，呼吸困难，查体发现左肺呼吸音明显减低。正确的处理措施有　COPD并发自发性气胸
A.胸片及心电图检查
B.吸氧　氧疗只能解决氧的问题,不能解决CO2潴留　COPD低浓度吸氧
C.使用镇静药物治疗　肺性脑病禁用镇静药　呼吸系统疾病禁用吗啡(抑制呼吸中枢)
D.无创呼吸机辅助通气　会加重气胸

10. 2025N154 X 根据 Light 标准，确定渗出性胸腔积液的标准有
A.胸腔积液有核细胞数＜500×10^6/L　不在Light标准里
B.胸腔积液蛋白/血清蛋白＞0.5
C.胸腔积液 LDH/血清 LDH＞0.6
D.胸腔积液 LDH 大于血清 LDH 正常值高限的 2/3

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别(Light 标准)

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注:符合任意 1 项可判断为渗出液。

外科学

11. 2013N79 A 以下胸部损伤中，对生命威胁最大的是
A.血气胸
B.闭合性气胸
C.开放性气胸
D.张力性气胸　活瓣,气体只进不出

12. 2018N162 X 拔除胸腔闭式引流管的指征有
A.胸腔内气液无残留，肺扩张好，引流管通畅
B.胸腔内气体少量残留，肺扩张好，引流管不通畅
C.胸腔内气液无残留，肺不张，引流管通畅
D.胸腔内气体少量残留，引流管内间断有气体逸出　有气体逸出说明胸膜腔内压力高

13. 2019N61 A 可能发生纵隔扑动的胸部损伤是　开摆
A.开放性气胸
B.闭合性气胸
C.张力性气胸
D.进行性血胸

14. 2023N61 A 男性，23 岁。因胸部钝挫伤 2 小时来诊。自诉呼吸困难。听诊右侧肺呼吸音消失，胸片提示右侧大量胸腔积液。为明确诊断，最有价值的检查是
A.胸部 CT
B.胸部超声
C.胸腔穿刺
D.胸部 MRI

15. 2024N62 A 张力性气胸时，首选的急救措施是
A.剖胸探查

答案:9-15 ABC BCD D AB A C B