
可能可能最可能：
①A 型胃炎：胃底胃体萎缩、壁细胞和内因子抗体、胃酸缺乏、胃泌素增加、常合并巨幼贫（MCV＞100）
②B 型胃炎：胃窦萎缩、胃泌素减少、Hp(+)

胃酸小结：
①胃酸明显减少/缺乏（MAO=0）：A 型胃炎、胃癌　最大胃酸分泌　肿瘤细胞破坏壁细胞,肿瘤细胞具有异型性,分化差,不能产生胃酸→胃酸明显减少/缺乏
②胃酸减少：B 型胃炎伴大量 G 细胞丧失
③胃酸正常或减少：B 型胃炎、胃溃疡I/IV型　屏障功能↓
④胃酸增加：十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型（123）十二指肠溃疡患者壁细胞数量↑(侵袭因素↑)→胃酸增多
⑤胃酸明显 ttsx 增加：胃泌素瘤


平时说的溃疡是胃溃疡I型
胃溃疡II、III、IV型是特殊的消化性溃疡

专题串联 • Hp

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网




1.幽门螺杆菌的致病机制
①Hp 依靠鞭毛穿过胃粘液层，定居在粘液层与消化道黏膜上皮细胞之间，避免胃酸杀灭和被机体免疫功能清除
②Hp 释放尿素酶分解尿素产生 NH_3，NH_3 中和胃酸后形成利于它定居的局部微环境，使感染慢性化
③Hp 通过产生 NH_3、空泡毒素、细胞毒素类相关蛋白，加之菌体细胞壁作为抗原诱导免疫反应，加重炎症反应



2.与 Hp 有关的疾病：**慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤**
注意：大部分急性胃炎、胃食管反流病、A 型慢性萎缩性胃炎与 Hp 无关

3.检查
①**非侵入性的尿素呼气试验：首选、金标准、复查**
②快速尿素酶试验：侵入性检查首选　需要胃镜
③Hp 抗**原**：简单准确　检测大便
④Hp 抗**体**：复查不出现假阴性（**不能**判断根除）抗体存在时间很长,可能HP已根除但抗体仍存在实际有感染,但检测结果为阴性

4.治疗　做HP根除治疗时做检查,此时PPI可能把HP抑制了,检查结果可能是阴性(假阳性),但Hp抗体的检查不会出现阴性,所以也不会有假阳性
①**四**联疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素**
（四克拉的镉子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星



②疗程 **10-14** 天；根除 Hp 至少 **4** 周后复查　减少假阴性的出现
若做根除Hp治疗的一开始就做检查,PPI会抑制Hp,可能会出现阴性结果,但Hp并没有被完全清除,即假阴性

真题解析 • 胃炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N171 X　根除胃幽门螺杆菌治疗时，常用的药物有
A.雷尼替丁
B.奥美拉唑

4.治疗
①四联疗法：PPI+铋剂+2 种抗生素
（四克拉的镉子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星