
A.胃镜
B.上消化道造影
C.^{13}C-尿素呼气试验
D.血清 CEA
81.目前最主要的治疗是
A.抗 Hp 治疗
B.止血药物治疗 PPI本身可以止血
C.应用质子泵抑制剂
D.手术治疗

外科学

15.2013N80 A 女性，55 岁。10 天前行胃癌根治术，术后 3 天拔出胃管开始进流食。3 天来进食后半小时出现右上腹胀痛，伴呕吐，吐出物为大量胆汁，吐后症状缓解。该患者最可能的诊断为

	胆汁	食物
A.急性输入袢梗阻	×	✓（频繁、量少、不缓解、闭袢）
B.慢性输入袢梗阻	✓	×
C.输出袢梗阻	✓	✓
D.吻合口梗阻	×	✓



16.2016N82 A 以下关于幽门梗阻患者术前准备的措施中，不恰当的是
A.应用广谱抗生素
B.禁食、胃肠减压
C.纠正水电解质失衡
D.温盐水洗胃

不代表胃溃疡、十二指肠溃疡也可以叫胃病史

17.2017N95-96 A 男性，25 岁，突发上腹剧痛 6 小时，既往有“胃病史”。查体：P 110 次/分，BP 130/80mmHg，全腹压痛，上腹部为主，板样腹，肠鸣音减弱。实验室检查：Hb 120g/L，WBC 10.5×10^9/L。
95.以下选项中，最有价值的检查是
A.腹部立位腹平片 从价值角度，X线永远不可能比CT有价值
B.腹部 B 超
C.腹腔穿刺
D.腹部 CT 慢性穿透性溃疡
96.对该患者最有效的治疗措施是
A.胃肠减压，补液 基本首要措施
B.镇静镇痛治疗
C.大量抗生素
D.手术探查

18.2020N57 A 在上消化道大出血的病因中，肝硬化食管胃底静脉曲张破裂所占比例是
A.20%-25%
B.26%-30%
C.31%-35%
D.36%-40%

答案：15-18 B 无答案 A D A-96-