eg.比重<1.018,李凡他试验阴性,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11

（2）**腹腔穿刺抽液**　可能患者有低蛋白血症(不要逮着一个点开跑)　一定是渗出液

①腹水呈草黄色＞淡血性＞乳糜性　VS 渗出性胸水:血清-胸水白蛋白梯度<12

②**渗出液**：**血清-腹水白蛋白梯度 SAAG＜11**、**细胞＞500×10⁶/L**，多数比重＞1.018、李凡他试验(+)、蛋白＞30g/L

③**单个核细胞（淋巴细胞）为主，腺苷脱氨酶 ADA＞45 尤其 ADA2 对本病诊断有一定特异性**

④腹水培养结核杆菌阳性率很低，但可排除普通细菌、肿瘤
结核杆菌长得慢　痰涂片是确诊肺结核的首选,痰培养是确诊肺结核的金标准

（3）X 线：并发肠梗阻　阶梯状液气平

3.治疗关键：抗结核治疗，多用短程疗法

4.分型（√代表主要见于）　结核杆菌毒力较弱,机体免疫占优势,以局限修复为主　多由渗出型或粘连型 变严重→ 干酪型

	渗出型	粘连型	干酪型
发病率	√	√	
腹水	√		
明显毒血症	√		√
急腹症、穿孔、肠瘘 慢性穿孔			√
腹部肿块、延长疗程		√	√
肠梗阻		√	

腹部肿块一般是大量纤维组织包裹而来,药物不易进入→延长疗程

最常见的肠梗阻-粘连型肠梗阻　肠结核、克罗恩、结核性腹膜炎最常见的并发症就是肠梗阻

真题解析 • 肠结核 & 结核性腹膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N51 A 女性，41 岁。腹胀、低热 3 个月。既往有右侧附件区结核病史 2 年。查体：T 37.8℃，心肺未见异常，腹壁柔韧感，轻压痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)。对确诊最有价值的检查是　优先考虑结核
A.腹腔穿刺抽液检查　首先考虑结核性腹膜炎
B.腹部 CT　金标准:腹腔镜　直接蔓延导致结核性腹膜炎
C.腹部 B 超
D.妇科检查

2. 2024N51 A 男性，58 岁。右下腹痛、腹泻伴关节酸痛、低热半年。查体：T 37.5 度，心肺检查未见异常，腹软，右下腹触及可疑肿块。钡剂灌肠检查提示回盲部跳跃征。最可能的诊断是　关注部位　首先考虑结核　肠结核
A.肠结核
B.克罗恩病
C.阿米巴肠炎
D.肠淋巴瘤

3. 2025N51 A 肠结核最常见的病变部位是
A.乙状结肠
B.降结肠
C.升结肠及横结肠
D.回肠及盲肠

答案:1-3 A A D