| | | | |
|---|---|---|---|
| 肠梗阻 | **最常见并发症** | **最常见并发症** | 少见 |
| 急性肠穿孔 | 可有 | 可有 | 少见 浅溃疡<br>（发生多见于中毒性巨结肠） |
| 瘘管<br>腹腔脓肿<br>肛周病变 | 可有 | **多见**<br>（腹腔脓肿是次常见并发症<br>有时肛周病变可为首发症状） | 少见<br>ttsx |
| 肠外表现* | 少见 | 可有 | 可有 |
| **结肠镜<br>（首选和金标准）** | **环/横形溃疡<br>干酪肉芽肿** | **节段分布的纵行裂隙状溃疡、鹅卵石/铺路石样、非干酪肉芽肿** | **连续分布的浅溃疡**<br>与中毒性巨结肠不共存 |
| 钡灌肠 | **跳跃征** | 线样征、鹅卵石征、铺路石征 | 可有铅管征 |
| 治疗 | **抗结核** | **ASA（UC）→泼尼松→硫唑嘌呤→英夫利昔单抗** | |

*肠外表现：

①与**病情无关**（与**疾病共存**）：原发性硬化性胆管炎、强直性脊柱炎、淀粉样变性、骶髂关节炎

（胆子垫底、与君共存）不管炎症性肠病的严重程度怎样，只要没治愈，肠外表现就存在

②控制病情后可缓解恢复：**杵状指**、结节性红斑、坏疽性脓皮病、口腔溃疡、外周关节炎、巩膜外层炎、前葡萄膜炎/虹膜睫状体炎

## 真题解析·炎症性肠病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N143-144 B

A.肠梗阻

B.肠出血

C.肠穿孔

D.中毒性巨结肠

克罗恩病患者最常见的并发症是

暴发型或重型溃疡性结肠炎患者最易发生的并发症是

2. 2014N68 A 男性，32 岁。3 个多月来低热、乏力、大便稀、右下腹痛、体重减轻。查体：T 37.6℃，P 84 次/分，BP 110/70mmHg，心肺检查未见异常，腹软，右下腹轻压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音活跃。化验血 Hb 125g/L，WBC $5.4\times10^9$/L，Plt $252\times10^9$/L，粪常规偶见 WBC。结肠镜检查示回盲部肠黏膜充血水肿，横行溃疡形成，肠腔狭窄，大小及形态各异的炎性息肉。该患者最可能的诊断是

优先考虑结核　回盲部　肠内因素刺激→肠鸣音↑　有辅助检查先看辅助检查

把横行溃疡改为纵行溃疡→有辅助检查先看辅助检查→克罗恩

可以长期低热，常发生于回肠末端及邻近结肠（包含了回盲部），并且克罗恩全消化道都可以受累

A.克罗恩病

B.肠结核

C.结肠癌

D.阿米巴肉芽肿

3. 2017N156 X 溃疡性结肠炎的并发症可有

A.癌变 UC是大肠癌的癌前病变

B.肠穿孔 并发中毒性巨结肠

答案:1-3 AD B ABCD