（五）其它治疗

γ-氨基丁酸/苯二氮卓类/巴比妥

1.**氟马西尼**（GABA/BZ/BAR 拮抗剂）：对部分昏睡期（3）、昏迷期（4）患者有促醒作用


2.阻断门-体分流：断流术联合 TIPS→明显缓解门脉高压→明显减少腹水→肝性脑病诱因被解决→肝性脑病概率↓

肝性脑病中枢多巴胺减少,中枢Ach亢进

3.补充左旋多巴、东莨菪碱 中东的海

多巴胺前体

肝性脑病也会影响基底神经节→出现定向障碍



4.人工肝清除血中有害物质

5.脑水肿时可降低颅内压

①过度通气→CO_2 减少→脑血流量下降

②惊厥明显时可短期用硫喷妥钠 超短效巴比妥

也会抑制中枢

真题解析·肝性脑病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N66 A 对早期肝性脑病诊断价值最大的检查结果是

A.定向力障碍

B.心理智能检查异常

C.病理征阳性

D.扑翼样震颤

2. 2015N99-101 A 男性，56 岁。2 年来消瘦、乏力，近 5 天来发热、嗜睡，1 天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史 20 年。查体：T 37.5℃，P 86 次/分，BP 120/80mmHg，神志不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下 4cm，移动性浊音阳性，尿常规无异常，化验血 Hb 110g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 92×10^9/L。肝硬化(肝肋下未及),门脉高压最早表现就是脾大

99.该患者最可能的诊断是

A.肺性脑病

B.肝性脑病

C.尿毒症昏迷

D.脑血管意外

100.为明确诊断，应首选的检查是

A.血氨 首选　　脑电图判断预后/严重程度

B.血气分析

C.头颅 CT

D.肝肾功能

氨中毒→只有A能解决

101.针对该患者的发病机制，应选择的治疗是 病例题技巧:对应关系

A.降血氨药物如谷氨酸钾 肝性脑病

B.纠正水、电解质紊乱 尿毒症昏迷

C.降颅压治疗 脑血管

D.机械通气 肺性脑病

以题带点 知识点复习

答案:1-2 B BAA