内科学含诊断学 消化系统疾病


核心精讲·肝硬化

（性感认识：肝功能减退和门静脉高压）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

1.肝细胞坏死：我国以**乙肝**最常见；欧美以**丙肝、酒精肝**最常见





2.胆汁淤积

①原发性：抗线粒体抗体 AMA 阳性

②继发性：胆管结石、胆管肿瘤、华支睾吸虫等

虫卵在门管区,对肝细胞破坏不明显→肝功能减退不明显,主要表现为门脉压力↑↑

3.血吸虫：虫卵沉积于**门管区（窦前阻塞）**→肝内门静脉周围纤维化、树枝状纤维组织（干线型）→门脉压力显著增高




小叶间静脉

复习《病理学》：胆汁、淤血、血吸虫性肝纤维化主要是纤维组织增生，少有肝细胞再生结节、假小叶

大量肝细胞坏死→需要修复→胶原纤维增生→胶原纤维分割形成假小叶

4.**肝后**型门脉高压（**淤血性肝硬化**）：**Budd-Chiari 综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）、右心衰、缩窄性心包炎**

淤胆:门管区有小叶间胆管
淤血:门管区有小叶间静脉
淤虫:虫卵在门管区
都主要在门管区,对肝小叶破坏较少→修复↓→再生结节↓、假小叶↓
没有酒精:酒精会对肝细胞造成破坏→肝细胞会再生,当网状支架塌陷会有再生结节;胶原纤维再分割肝小叶形成假小叶



5.遗传和代谢性疾病

①铜代谢紊乱：肝豆状核变性/Wilson 病

②铁代谢紊乱：血色病

③α-抗胰蛋白酶缺乏症　全腺泡型肺气肿、支扩

6.病因不明（隐源性肝硬化）

二、肝脏体积

（1）抓规律：肝硬化**早期/代偿期**体积**可正常或稍增大**，**后期/失代偿期体积多变小**

胶原纤维少,炎症引起细胞水肿　　胶原纤维收缩

（2）记特殊

①坏死后性肝硬化早期体积缩小　由亚急性重型肝炎发展而来,肝细胞明显坏死(已有肝缩小,其发展而来的坏死后性肝硬化也有肝缩小)

②酒精性、胆汁性、淤血性、血吸虫性肝硬化体积**可增大**