（六）胆石症

胆盐、卵磷脂2-3:1时对胆固醇的溶解性最好

①胆汁分泌减少降低了对胆固醇、胆色素的溶解性 胆汁↓(溶剂↓)→胆固醇析出→结石

②库普弗细胞减少易致胆道感染、加剧结石形成 库普弗细胞是肝脏的巨噬细胞,可抗感染

③**雌激素增高**可抑制胆囊收缩使胆汁排空障碍 胆系结石更容易见于女性

④脾功能亢进引起慢性溶血致胆色素产生增多 脾亢→破坏红细胞→溶血→产生很多胆色素

（七）原发性肝细胞癌

肝脏肿大或触及**不规则质硬结节**、**肝区疼痛**、常有血性腹水、**AFP↑**

肝硬化:肝脏缩小、一般不痛
肝癌:肋下可触及肝脏(不规则质硬结节)、肝区疼痛(牵拉到了肝包膜的神经)

（八）肝性脑病/肝昏迷（最严重并发症/最主要死因）

与肝功能障碍致**氨中毒**、门脉高压致门-腔侧支循环分流等有关

五、营养治疗

①尽量用肠内营养 肠外营养并发症多,如肠粘膜废用性萎缩→肠粘膜屏障功能进一步减退

②代偿期：高蛋白、高热量饮食；失代偿期低蛋白饮食；并发肝性脑病急性期禁蛋白饮食

③补充**支链氨基酸；减少假性递质**

真题解析·肝硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N57 A 肝硬化失代偿期患者发生大呕血后出现的体征变化，正确的是
A.肝脏缩小
B.脾脏缩小 侧支循环减轻
C.腹水量明显减少 不会变少,腹水进展变慢
D.腹壁静脉曲张加重

2. 2013N67 A 以下对诊断肝硬化门脉高压症最有价值的体征是
侧支循环开放
A.蜘蛛痣
B.脾脏肿大
C.肝脏质地坚硬
D.腹壁静脉曲张

3. 2014N67 A 肝硬化患者发生肝肾综合征时的特点
肚子有水、尿少、低头看蛋呐
A.血 BUN 升高、血钠升高、尿钠降低
B.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠升高
C.血 BUN 降低、血钠降低、尿钠升高
D.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠降低

4. 2016N99-101 A 女性，26 岁。腹胀、腹痛伴低热、盗汗 3 个月。查体：腹部移动性浊音阳性。化验血 HBsAg(+)。腹水常规：比重＞1.023，蛋白定量 38g/L，WBC 610×10⁶/L，其中单核细胞为 80%。以单个核细胞为主
99.该患者最可能的诊断是
A.肝硬化合并自发性腹膜炎

答案:1-4 B D D CAC