D.食管静脉曲张破裂出血

69.对判断该患者是否继续存在活动性出血最有价值的体征是

A.肠鸣音活跃

B.巩膜轻度黄染 胆色素代谢问题

C.移动性浊音(+)

D.面色晦暗 促黑素

9. 2021N41 A 符合肝细胞性黄疸检验特点的是

A.尿胆原降低 不定

B.尿胆红素阳性

C.血结合胆红素显著减少

D.血非结合胆红素显著减少

UCB↑ CB/TB 0.2-0.5
CB↑↑→尿CB↑(尿胆红素+)
尿胆素原不定

尿胆素原=尿胆原(空气)→尿胆素
血CB→尿CB(尿胆红素)

10. 2022N156 X 食管胃底静脉曲张破裂出血的一级预防措施包括

A.对因治疗

B.应用生长抑素和垂体加压素 治疗

C.应用非选择性 β 受体拮抗剂

D.内镜结扎治疗可用于中度食管静脉曲张

3P治生态、EVL全都有

11. 2023N50 A 对诊断门脉高压性腹水最有价值的检查是

A.腹水 ADA

B.腹水 LDH

C.腹水白细胞

D.血清腹腔积液清蛋白梯度

腹水→循环血量↓→尿少
但还没有发展为肝肾综合征的程度

12. 2023N70-72 A 男性，45 岁。因 4 个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1 个月来低热、活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5 度，P 98 次/分，R 18 次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血 Hb 106g/L，WBC 7.4×$10^9$/L，N 0.88，Plt 70×$10^9$/L，↓尿胆红素(+)，血 ALT 110U/L，AST 130U/L，TBil 98μmol/L，DBil 65μmol/L。

此为血常规里的中性粒细胞，应看腹水中的中性粒细胞

不满意≠没摸到，腹水影响了对肝脾的触诊

题目是感染但白细胞却不高，因为脾亢会破坏白细胞

AC鉴别：腹水中以单个核细胞为主还是多个核细胞为主

70.应首先考虑的诊断是

A.肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎

B.肝硬化并发门静脉血栓 脾脏短期迅速增大

C.肝硬化并发结核性腹膜炎 排除不了

D.肝硬化并发肝癌 血性腹水，对腹膜刺激最轻

71.对该患者进行腹腔穿刺做腹水检查的最主要适应证是

这里做腹穿的原因是因为腹水性质发生了改变，要诊断并发的自发性腹膜炎→看腹膜刺激征

A.T 37.5 度，巩膜黄染，肝功能异常

B.T 37.5 度，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音(+) 无论有无自发性腹膜炎，移动性浊音都可(+)

C.巩膜黄染，肝脾触诊不满意

D.肝炎病史，可见蜘蛛痣，巩膜黄染

72.下列支持该患者诊断的腹水检查结果是

A.外观透明浅黄，比重 1.012，蛋白定量 15g/L