103.该患者目前不适宜选用的治疗药物是
A.卡托普利
B.硝苯地平
C.氢氯噻嗪
D.呋塞米
104.病情稳定后，为明确诊断，最重要的检查是
A.眼底检查
B.肾动态显像
C.肾穿刺活检
D.双肾 B 超

慢性肾衰竭
2.2013N102-104 A 男性，45 岁。间断双下肢水肿伴蛋白尿 10 年，乏力、纳差、恶心 1 周，刷牙时牙龈出血伴皮肤碰后发青 3 天入院。入院时测血压 150/90mmHg，化验血 Hb 80g/L，WBC 6.4×10^9/L，Plt 192×10^9/L。蛋白尿(++)，尿比重 1.010，尿糖(±)，偶见颗粒管型。血 Cr 707μmol/L。
102.该患者血肌酐升高最可能的原因
A.慢性肾小球肾炎 我国慢性肾衰最常见慢性肾炎
B.肾病综合征 必须得蛋白尿(+++)
C.高血压病肾损害 题目是先有肾脏病变引起高血压
D.糖尿病肾病 糖尿病病史至少十年
103.该患者贫血最可能的原因
A.慢性溶血
B.失血因素
C.红细胞生成素减少
D.营养性造血原料不足
104.该患者出血倾向最可能的原因
A.血管脆性增加
B.血小板功能减低
C.凝血因子缺乏
D.纤溶亢进

以题带动
知识点复习

3.2015N172 X 以下选项中，属于尿毒症肾性骨营养不良的有
A.纤维囊性骨炎
B.骨生成不良
C.骨硬化症
D.骨软化症

ATN 重吸收↓
4.2016N69 A 急性肾小管坏死维持期出现的实验室检查异常是
A.血尿素氮与肌酐的比值减低
B.血红蛋白中度以上减低 轻度减轻
C.血钾浓度减低
D.尿钠浓度减低
三高三低两中毒、贾玲美爱吃醋

答案：2-4 ACB ABD A