随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.系膜增生性肾炎

①**系膜细胞和基质增生** 病变发生在系膜区

②青少年最常见的肾病综合征，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿 带“炎”




图 5-2-7　系膜增生性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

4.系膜毛细血管性肾炎


基膜　内皮细胞　系膜细胞

（1）又称为**膜增生性肾炎**：　肾小囊脏层上皮

系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征

外侧为原有的基底膜，内侧为新形成的基膜样物质（其内有系膜细胞、内皮细胞、白细胞突起的嵌入）

内



（2）根据超微结构和免疫荧光分为：　外　肾小囊脏层上皮

I型（最常见）：循环免疫复合物型，在系膜区和内皮下有电子致密物沉积

II型（致密沉积物病）：补体替代途径异常激活，可见大量块状电子致密物在基膜致密层呈带状沉积

III型：包括免疫复合物介导的肾小球肾炎及 C_3 肾小球病：在内皮下和上皮下有电子致密物沉积

（3）青少年多见，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿，补体 C_3 持续↓

又有原位又有循环免疫复合物

C_3↓如循环免疫复合物型+替代途径：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎

吸引补体和白细胞过来　　持续↓




图 5-2-10　系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物；6. 基底膜样物质。





图 13-18　膜增生性肾小球肾炎示意图



5.局灶性节段性肾小球硬化“部分”

①**部分**肾小球的**部分**毛细血管袢硬化

注意：局灶性指病变累及少数肾小球（<50%），与之相对的是弥漫性；节段性指病变累及肾小球的少数毛细血管袢（<50%），与之相对的是球性。除了局灶节段性肾小球硬化以外，其余的原发性肾小球疾病均是弥漫性改变，解题时避免受其干扰

②可有脏层足细胞**足突融合消失**

注意：足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）　VS 初治单用激素:自己吸激

七、IgA 肾病（Berger 病）

1.我国最常见的肾小球疾病；**肾小球源性血尿最常见的原因**

2.**可表现为各种病理类型：以系膜增生性肾炎最常见、以系膜区 IgA 沉积 ttsx 最特征**

在系膜区毛细血管袢开放，所以抗体(分子量大)更容易沉积在系膜区(无毛细血管封闭)

3.青少年多见，发病前 1-3 **天**有前驱感染（**特征**），30-50%患者血 IgA 升高，但与疾病严重程度**不**完全相关

IgA主要参与黏膜免疫(如发生上呼吸道感染时就会增多)

重要的1-3周前驱感染:病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病（以天为单位）