


（三）临床表现

血管性疾病	血小板性疾病 可浅(大部分)可深	凝血障碍性疾病 (机关枪 ji yi qi)
女性多见	男女都可以	男性多见、与遗传密切 约等于血友病
紫癜多见	紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、浅的出血 Plt维持血管壁完整性 内脏出血多见	手术或外伤后渗血不止、脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血多见 (深)

注意：创伤、手术后延迟性出血考虑与纤溶异常有关 纤溶酶激活后发挥作用需要一定时间
牙龈出血属于黏膜出血非深部出血 常见于血小板减少

（四）止血药

①收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：维生素 C、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素 允许作用
(C 级丁克锁喉)

②合成凝血相关成分所需：维生素 K 儿妻就是家

③抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸 (蒜蓉)

④促进VIII、vWF 止血因子释放：去氨加压素 (学友释放假牙) 类似抗利尿激素

抗利尿激素作用
①增加集合管顶端膜对H2O通透性
②大剂量缩血管
③作用不完全会增加内髓尿素的通道
④促进止血因子释放

⑤rhFVIIa 外源性凝血途径-快

⑥局部止血：凝血酶、巴曲酶、明胶海绵(吸附)