A.IgG 型 最常见
B.IgE 型
C.IgD 型 容易导致肾功能损害
D.轻链型

86.根据 Durie-Salmon 分期，该患者的分期和亚型是

A.II期 A 亚型
B.II期 B 亚型
C.III期 A 亚型
D.III期 B 亚型

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

87.该患者宜选用自体造血干细胞移植，目前诱导治疗不宜选用的药物是

A.硼替佐米
B.美法仑
C.来那度胺
D.地塞米松

以题带动 知识点复习

2. **执业医师** 2015U3-129～131 A 男性，70 岁。乏力、腰痛半个月，既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2-4 腰椎局部压痛。实验室检查：Hb 80g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 156×10^9/L；血清总蛋白 108g/L，白蛋白 30g/L，血肌酐 177umol/L。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45，腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。溶骨损害有腰痛　球蛋白高导致总蛋白高　≥177　≥10%→多发性骨髓瘤　只有一个溶骨性损害

129.为进一步明确诊断，下一步应做的检查是

A.血清 β_2 微球蛋白测定
B.尿本-周蛋白测定
C.尿常规
D.血清钙测定
E.血、尿免疫球蛋白鉴定

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Salmon 临床分期标准，该患者最可能的临床分期是

A.I期 B 组
B.II期 A 组
C.II期 B 组
D.III期 A 组
E.III期 B 组

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

131.该患者疾病最可能的类型是

A.IgD 型
B.IgG 型
C.IgE 型
D.轻链型
E.不分泌型

思维导图·骨髓瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 ACB EEB