C.IgHV 基因突变 CLL
D.PML-RARA 融合基因 M3

8. 2023N53 A 男性，25 岁。发热伴皮肤瘀斑 1 周。查体：T 38.5 度，贫血貌，皮肤可见数处瘀斑，胸骨压痛(+)。血常规：Hb 75g/L↓，WBC 16.2×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞学检查见原始细胞 87%（>30%），原始细胞的 MPO 弱阳性，NSE 阳性，NaF 可抑制。该患者最可能有的特异性临床表现是

A.浅表淋巴结肿大 急单
B.脾大
C.睾丸无痛性肿大
D.牙龈增生、肿胀

2绿3D我是鸭皮

MPO主要是粒细胞里面的酶
NSE主要是单核细胞里面的酶
急单:MPO(-)~(+)

9. 2025N85-87 A 男性，19 岁。6 天来鼻出血及牙龈渗血、皮肤瘀斑。血常规：Hb 88g/L↓，WBC 12.5×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞增生明显活跃，原始细胞占 80%，组化染色示 MPO(-)-(+)不等，PAS 呈弥漫性淡红色，NSE(+)，可被 NaF 抑制。急单

急性白血病

不是急淋,急淋的PAS(+)且成块或粗颗粒状

85.该患者最可能的诊断是
A.急性早幼粒细胞白血病
B.急性淋巴细胞白血病
C.急性粒-单核细胞白血病
D.急性单核细胞白血病

86.该患者临床最常出现的异常是
A.牙龈肿胀
B.弥散性血管内凝血
C.睾丸肿大
D.中枢神经系统受侵犯

87.该患者目前的首选治疗是
A.DA 方案化疗
B.口服全反式维 A 酸
C.DVLP 方案化疗
D.骨髓移植

	粒-单核 M4 各阶段的粒细胞>20%,各阶段的单核细胞>20%	单核 M5 各阶段的单核细胞>80%
MPO/POX	部分细胞(粒细胞):(+) 部分细胞(单核):(-)~(+)	
NSE	部分细胞(粒细胞):(-)~(+) 部分细胞(单核):(+)	
NaF抑制试验	单核:(+)	

专题串联·血液系统疾病鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	急性白血病	CML
性感认识	细胞分化停滞在较早阶段 （多为原始及早幼细胞）	细胞分化停滞在较晚阶段 （多为中晚幼及成熟细胞）
病情发展	快	慢
常见血象	**红细胞和血小板↓** **白细胞↑**	慢性期：白细胞↑（多>20、可>100）、血小板可↑ 加速期：红细胞↓、血小板↓或↑ 进行性
常见骨髓象	**原始细胞≥30%**（FAB 分型） **或≥20%**（WHO 分型） 到达急性白血病WHO分型的门槛	**慢性期：原始细胞<10%** **加速期：原始细胞≥10%** **急变期：原始细胞>20%**

骨髓里的原始细胞小于10%,不能排除白血病,但能排除急性白血病
本质:分化停滞在较早阶段和较晚阶段

答案:8-9 D DAA