二、非霍奇金淋巴瘤 NHL 不会出现RS细胞

（一）化疗为主

急淋化疗方案:VP、DVP、DVLP(V代表长春新碱)


①**CHOP**（环磷酰胺+阿霉素/多柔比星+长春新碱+泼尼松）。其中I、II期惰性淋巴瘤化疗+放疗 绝大多数都是靠化疗为主

②**CD20⁺加用利妥昔单抗**/美罗华（**R-CHOP**） 二美丽

③胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 **MALT** 还需要**抗 Hp** 治疗（麻辣烫伤胃）

Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃的淋巴瘤有关 边缘区相当于"蛋壳"易与外界微生物接触

（二）病理类型



有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病就是同一种疾病在不同阶段不同部位的表现。
①若前体细胞让骨髓中的原始细胞>20%或30%→急性白血病(急淋)
②若主要集中在淋巴结、结外器官→淋巴瘤

卡在生发中心:滤泡性淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤、一部分弥漫大B细胞淋巴瘤

图 12-3　淋巴细胞分化成熟模式图及与各种类型淋巴瘤之间的关系

弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（ABC 型）—活化 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤；弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（GCB 型）—生发中心 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。

1.弥漫大 B

①我国成人最常见（人口大国）

②双表达（myc+BCL2 高表达）、双打击（myc+BCL2 或 BCL6 异位）→预后差　D-double:G-像6

③可由滤泡性淋巴瘤转变而来（*p53* 失活）
惰性淋巴瘤　基因组卫士




图 12-7　弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
体积较大的肿瘤性淋巴细胞弥漫分布，核大，染色质块状，形态各异，可见小核仁，右上插图为 CD20 免疫组织化学染色。

2.滤泡性

①多累及脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结（屁股沟）

②区分反应增生滤泡和肿瘤滤泡：**肿瘤单克隆**、**18** 号染色体的 **BCL2** 基因**转位**致 BCL2 蛋白高表达（二人转）
炎症多克隆