3.小淋巴/CLL（越小越成熟）　抓规律:血细胞随着分化成熟,细胞体积逐渐减小
记特殊:巨核细胞(随着分化成熟,细胞体积逐渐增大)



①欧美成人最常见

②幼淋巴细胞灶性成团形成"假的增殖中心"（**无 CD10 和 BCL6**）长头发实属666

注意：常考的无 CD10 和 BCL6 的 NHL 是套、小淋巴、边缘区（没头发套小辫）

③外周血 B 淋巴细胞≥5×10^9/L、骨髓淋巴细胞≥40%（五四）、以成熟淋巴细胞为主

④属于**惰性**淋巴瘤

注意：淋巴瘤均为恶性，根据恶性程度分为惰性、侵袭性、高度侵袭性淋巴瘤。**高度侵袭性 NHL 有 Burkitt、淋巴母/前体**（伯母）。**惰性 NHL 有小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆**（不是浆细胞骨髓瘤）、**皮肤 T**（小便泡姜皮）。惰性淋巴瘤的淋巴细胞分化好、成熟、恶性度低

注意：《病理学》10 版教材 P230 指出"套细胞淋巴瘤属于惰性淋巴瘤中侵袭性最强的"

前体细胞是骨髓中非常早期阶段的淋巴瘤,数量达到了急性白血病的标准时→急淋(儿童最常见)

4.淋巴母/前体（15 岁以下最常见）

①**B**-ALL：**儿童**更多见，常表现为**白血病**（**血 WBC↑**、但一般不超过 100）baby

②**T**-ALL：**青少年**更多见，常表现为**胸腺肿块** teenage 发育

T细胞在胸腺成熟→T-ALL常表现为胸腺肿块

5.**Burkitt**

①与 **EBV** 感染密切相关。而 *p53* 基因突变可见于 25-50%患者、常见于 EBV 阴性者

注意：与 EBV 密切相关的有**鼻咽癌、Burkitt、传染性单核细胞增多症、CHL、NK/T 淋巴瘤**（比伯穿 CK）
经典的霍奇金淋巴瘤

②类型（抬头星星差、散了回家了：颌骨、星空现象预后差、散发性回盲部）

地方性（**非洲儿童**最常见）	**颌骨** Burkitt淋巴瘤等高度侵袭性NHL,恶性程度高
散发性	**回盲部**形成腹腔巨大肿物 回盲部淋巴组织丰富
免疫缺陷性	淋巴结、骨髓



③**小无裂**细胞恶变而来（小无赖）

④**满天星/星空现象**（瘤细胞间有胞质丰富的反应性**巨噬**细胞）→**预后差**
VS 双表达、双打击在弥漫大B出现后提示预后差

⑤Burkitt 的肿瘤细胞若侵犯血液、骨髓即 ~~**ALL-L3**~~ 型 Burkitt白血病
Burkitt的肿瘤细胞是成熟细胞,急淋是以原始早期幼稚细胞为主(矛盾)

⑥Burkitt 对化疗非常敏感、单独用化疗即可治愈生长分数高的对化疗敏感,eg小细胞肺癌

《外科学》：单独用化疗可治愈的有大细胞淋巴瘤、Burkitt 淋巴瘤、胚胎性横纹肌肉瘤、侵袭性葡萄胎、绒癌、小细胞肺癌、ALL、睾丸精原细胞瘤、中枢神经淋巴瘤（大伯培养小林高中）
滋养细胞疾病

6.**T** 细胞来源的 NHL

（1）栗子：T 淋巴母/前体 T/T-ALL、**皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征**、**间变性大**、**扭曲性/曲折核**、NK/T、恶性组织细胞增生症（T 像蘑菇又像 J、扭来扭去真可恶）