（2）皮肤 T

①蕈样肉芽肿病 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩

（但不是平时说的炎性肉芽肿）

②侵犯血液即 Sezary 综合征

③**脑回状**细胞核、**Pautrier 微脓肿/鲍氏小脓肿**

（ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

蕈样霉菌病




图 12-11　蕈样肉芽肿病

真皮内肿瘤性淋巴细胞侵入表皮，形成 Pautrier 微脓肿。




图 12-10　鼻型结外 NK/T 细胞淋巴瘤

A. 患者鼻部巨大溃疡；B. 肿瘤大片坏死，残余异型淋巴样存活细胞。

（3）间变性大：儿童、青少年多见

注意：NHL 中儿童、青少年多见的是间变性大、地方性 Burkitt、淋巴母/前体/ALL（小孩见伯母）

（4）NK/T：**EBV** 感染，**鼻腔**受累为主（nose）

注意：NHL 中**多不累及淋巴结**的是 NK/T、地方性 Burkitt（NB 看不起淋巴结、直接以结外器官受累为主）


三、霍奇金淋巴瘤 HL

（一）临床表现

①以不明原因发热起病：多为年龄较大的男性，腹膜后淋巴结常受累

②少数呈周期性发热：多为年轻的女性，常伴瘙痒（大肚男看小姐姐定期发 sao，口诀仅记忆）

《诊断学》：周期热/回归热/Pel-Ebstein 热：高热期与无热期各持续数天后反复交替出现（挥霍）



		化疗+放疗
NHL	化疗为主	惰性I、II期
HL	III、IV	I、II

（二）化疗+放疗

①I、II期：化疗+放疗

②III、IV期：**化疗为主**（**ABVD** 阿霉素/多柔比星+博来霉素+长春碱+达卡巴嗪 hello everybody）。**维布妥昔单抗**（BV）是靶向 CD**30** 的抗体偶联药，对于III、IV期 HL 患者 **BV-AVD** 方案有更好的生存获益

③**CD20⁺加用利妥昔单抗/美罗华（R-ABVD）**

小结：　儿童VIP

ALL	VP、DVP、DVLP。**中枢白血病**还需鞘内注射甲氨蝶呤，**睾丸白血病**还需双侧睾丸局部放疗
AML	**M_3 型**-全反式维甲酸 ATRA+砷剂+蒽环类；**除 M_3 型**-IA、DA、HA 买益达哈
CML	酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼 BCR-ABL(酪氨酸激酶)融合基因
HL	ABVD、BV-AVD hello everybody
NHL	CHOP
MM	VD、RD、MVP 不适合美发